




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3618/A Vol. 3







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3618/A Vol. 3



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3618/A Vol. 3





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3618/A Vol. 3


3618<sup>(3)</sup>A

A. XVIII. P

1208

LIBRERIA ALDO MANUZIO  
VIA BUSTANA  
REG. N. 612  
BUSTA  
CAT. N.





# EPITOMES

Omnium Galeni

PER GAMENI OPE

RVM, VNIVERSAM IL-  
LIVS VIRI DOCTRINAM.

& methodū, quā accu-  
ratissimè continētis,

## SECTIO QVARTA.

PER ANDREAM LACVNAM

*Secobiensem, Doctorem Medicum, atq; ex sacro*

*Militum Sancti Petri apud Urbem collegio,*

*Auratum Equitem, summa fide*

*atq; studio collecta.*

CAVTVMEST PONTIFICIA, CÆSAREA,

& Christianissimi Regis, Augustissimiq; Senatus

Veneri autoritate & decreto, ne quis impunè

hoc opus aut cudat, aut ab alio excusum,

quā à Hieronymo Scoto,

exponat venale.

VENETIIS M D XLVIII



42599

F. H. T. O. M. E. S.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

VENETUS M. D. XLVII



ILLVSTRISSIMO ET REVEREN-  
 disimo D. D. Petro Pacheco, Gienensi Episcopo,  
 atq; S. R. Ecclesiæ Senatori Vigilanti-  
 mo, Andreas Lacuna, Secobiensis,  
 Doctor Medicus, Miles San-  
 cti Petri. S. P. D.



I VT corpus erectum sortitur  
 homo, sic animum ad sublimia  
 erigeret, neutiquā caducarum (ut  
 solet) rerum, teneretur admira-  
 tione, Pater Obseruandis. sed per  
 petuò & Diuina suspiceret, et as-  
 siduè in eorum exerceretur medi-  
 tatione. Cæterum quum ita sit natura cōparatum mor-  
 talibus, ut pars quidem uicti, ac ueluti captiui ducti à  
 suis cupiditatibus, illis tantum inferuiant: pars autem,  
 adeò ignaui, stupi<sup>t</sup>iq; sint, ut animam habeant, nec ne,  
 ignorent penitus: contingit sanè, ut perpauci eorum sur-  
 sum aspicere queant (lux enim lippos maximè offēdit)  
 sed omnes fere humi serpāt, instar crocodilorum. Id quod  
 certè est in causa, ut si quādo uideant canem transilientē  
 per circulum, aut tripudiantē simiam, aut deniq; fœdissi-  
 mum Scythā supra funem saltātem, uniuersi, sui ipsorū  
 obliti, confertim ad id genus spectacula cōfluant: atq; ea  
 quidem admirentur stupefacti: negligent autem & asper-  
 nētur cōditoris illius nostri opera: quæ si, ut decet, expē-  
 derentur, omnium spectatorum animos in maximā admi-  
 rationem sui, cōmendationemq; cōuerterent. Nam ut im-  
 præsentiariū præteream ordinatas illas orbium celestium

aaaa ij



lationes, constātiſsimos ortus syderum, uicissitudines tēporum, animaliumq; generationes & incrementa, quæ captum humanū superāt: de ijs autem differam, quæ indies calcantur pedibus: quid obsecro admirabilius possit unq̃ contingere, q̃ ex erucæ, nasturtij, aut alio uix perceptibili semine, oriri herbam bicubitalem? ex nucleoq; aliquo exiguo, nasci prodigiosæ magnitudinis arborē? Etenim postea q̃ semē in terram, ueluti in matricem quandā, coniectum est, attracti humoris copia intumescit, intumescensq; rūpitur, ac duo de se emittit germina: unum quidem, quo terræ adhæret, ab eaq; sibi alimentū sugit: quæ est radix: alterum uerò, quod solem uersus, à quo uiuificatur, erumpens, ab uno caudice in uarios tādē ramos diuaticatur. Atq; hic sanè plantarum est ortus: quas quidē uniuersi Philosophi & Medici, animatas esse dixerunt, neq; id iniuria: q̃ nimirum animantium ritu gignantur, crescant, uiuant, atq; senio absumantur. Primò si quidem sunt molliusculæ, ductilesq; & tractabiles, ut infantes. Dein processu tēporis adoleſcunt, suisq; articulis roborantur. Postea uerò iam consistentes, ubi crescere destiterunt, & renituntur trahenti, & solida fructuum ubertate pinguescunt: donec tandem concedentes naturæ, hominum instar senescunt, atq; fatiscentes dehiscunt. Reperitur etiam, ut in animalium generibus, sic sexus uterq; in stirpibus. Discernitur autem à fœmina masculus, q̃ folia huius prius germinent, folijsq; fœminæ sint minora. Quòd si masculus adeò coniunctus sit fœminæ, ut folijs mutuò sese contingāt: aut si ex flagrantia masculi portio aliqua ad fœminā, uentorum beneficio, puenit, ipsius



*foeminae fructus cito ad maturitatē perueniunt. Sunt au-  
tem stirpes ut cæteris rebus omnibus longē amœniōres  
& iucundiores uisu, sic earum usus mortalium uitæ mul-  
tis numeris necessarius: utpote à quibus non modò alimē-  
ta ipsa, sed etiam medicamenta, quibus utimur ad profligandos morbos, multaq; alia pertinētia ad uitæ cōmodi-  
tatem ꝑficiſcantur. Vnde nō immeritò Marcus Curius,  
Lucius Quintius Cincinnatus, Marcus Valerius Corui-  
nus, Cyrus Persarum Rex, aliq; Viri grauissimi, allecti  
plantarum amœnitate, plurimum agriculturæ indulse-  
runt. Quum igitur undecim cōmentarios Galeni de uiri-  
bus medicamentorū simplicium: septem, de compositione  
pharmacorum secūdum genera: ac deniq; decem alios de  
compositione medicaminum iuxta singulas nostri corpo-  
ris partes (in quibus non modò uniuersæ dotes, ac facul-  
tates plantarum, sed uaria etiam morborum genera, co-  
rumq; absolutæ curationes exaggerantur) superioribus  
diebus ad Græcorū exemplarium fidem restituissem, re-  
stitutosq; cōtraxissem in methodū ut breuiorem, sic mul-  
to studiosis aptiorē, statui equidem hos ipsos uigintiocto  
cōmentarios, Naturæ thesauros quosdā opulētissimos,  
tibi, Antistes Reuerendissime, nuncupare: idq; non ut ex  
hac ipsa dedicatione aliquid splendoris accederet tuæ Cel-  
situdini, quæ iam pridem ob insignem prudētiā, uariā  
eruditionem, raram incredibilemq; Clementiā, ac deniq;  
summā pietatem, conciliauit sibi omnium bonorū ani-  
mos, atq; extra omnē ingenij aleam est posita: sed ut tui  
nominis fulgore illustrati, inirēt multo maiorem gratiā  
eruditorum hominū: sub tuoq; patrocinio, ueluti sub cly*



peo Aiacis, delitescentes, non tam facile impeterentur à  
uirulentis quorundā morsibus, quibus alienæ famæ de=  
trahere, & exercitium, & summa uoluptas est. Siquidē  
quum olim summi Imperatores & Principes, aduersus  
impendentes fluctus & tempestates fortunæ, cōmuniren=  
tur literis: nūc ingenuæ artes et disciplinæ, ut tutò pro=  
dire possint (Proh dolor) fautoribus & Mecœnatibus  
egent. Cæterum si. T. C. hasce nostras lucubrationes de=  
fendendas suscepit, nulla inuidia, aut calumnia, in nos  
quicq̃ moliri poterit. Quòd si quæ barbarorum ac sophi=  
starum cohors (hi nāq; præcipui sunt, infestissimiq; bona=  
rum disciplinarū hostes) accedat propius, ut faceffat no=  
bis negotium, cōfestim in pedes se conferet, uel solius no=  
minis tui fulmine perterrefacta. Adeò siquidē heroicæ  
illas ac nondum satis laudatas Virtutes tuas, quadam se=  
ueritate, grauitateq; prudentissima adornas (quod pas=  
sim de te omnes prædicant) ut non minus tetræ ac flagi=  
tiosis hominibus, terrori ac formidini sis, q̃ ingenuis om=  
nibus admirationi. Quibus quidē rebus adductus Diuus  
Carolus. V. Imperator, Tridentinæ synodo te unū inter  
alios omneis præfecit, ut singulari sapientia tua, Eccle=  
siæ causam tuereris: sibi nimirum persuadens, te præsen=  
te, nihil transactum iri, quod non pium, non æquum, non  
sanctum, non deniq; uniuersæ Christianæ Reip. maximè  
salutare futurum esset. Quam prouinciam adeò alacri=  
ter suscepisti: eaq; fide et pietate suā pacem, religionemq;  
Ecclesiæ restituendam curasti, ut. S. D. N. P. III. P. M.  
te inter Purpuratos illos Patres censuerit tandem annu=  
merandum: sentiens haud dubiè se non minus accessu tuo



illustraturum Senatum illum Patrum Amplissimorum:  
quæ exornaturum Amplitudinem tuam tam splendida, tamque  
iusta pietatis tuæ, atque integritatis corona. Quocirca Il-  
lustrissimi illi, Reuerendissimique, omnes collegæ tui, sum-  
mo desiderio tenentur uisendæ tuæ Celsitudinis, in eaque  
suos pascendi oculos: sed inter omnes præcipue Illustris-  
simus et Reuerendissimus D. D. Franciscus à Bouadilla  
et Mendoza, Cardinalis Cauriësis. meusque Mecænas  
maximus. Qui quidem tuarum uirtutum præco, ut est stu-  
diosissimus tui, iam uellet ut moram rumperes, quo lice-  
ret sibi ac cæteris frui isto conspectu tuo, splendoreque illis  
tam exoptato. Cui nec potuissem equidem (quod certo  
scio) rem unquam gratiorem facere, quam si hosce labores meos,  
futuros ceu testimonium quoddam arctissimæ illius ne-  
cessitudinis, quam inter uos mutuò alitis, consecrare tuo  
numini: nec poterit Tua Celsitudo, quam si ipsos singulari  
suo patrocínio dignetur. Deus, Op. M. Amplitudinem  
istam tuam, Antistes Obseruandis. diu nobis quam florētis-  
simam seruet, ut tum pietas, tum religio, tum bonarum  
literarum studia, sub tali coryphæo et protectore inua-  
lescant. Vale. Venetijs. Ex ædibus Illustrissimi et  
Sapientissimi Viri, D. D. Ioannis Furtadi à Men-  
dozza, in hac Rep. Oratoris Cæsarei  
Vigilantissimi. XV. Cal. Maias.  
M. D. XLVIII.

# INDEX COMMENTARIORVM

qui in hac sectione quarta habentur : nominaq;  
Doctissimorum uirorum, quorum uersio=  
nibus sumus usi & adiuti.



E SIMPLICIVM medica=  
mentorum facultatibus, lib.  
xi. Theodorico Gerardo in=  
terprete.

De compositione medicamento=  
rum secundum genera, lib. vij.  
Ioanne Guinterio Andernaco

interprete.

De compositione medicamentorum secundum partes,  
lib. x. ~~Ioanne Guinterio~~ **309** interprete.

De theriace ad Pisonem, lib. I. Ioanne Guinterio Ander=  
naco interprete.

De Antidotis. lib. II. Ioanne Guinterio Andernaco in=  
terprete.

De ponderibus & mensuris, libellus, Andrea Lacuna,  
Secobiensi, authore.



# G A L E N I P E R G A

## M E N I D E S I M P L I C I V M M E D I C A M E N T O R V M

Facultatibus liber Primus.

### C A P. I.



Edicamentorum simplici-  
cium facultates exquisitè  
cognoscere, quum ad ua-  
riorum compositionem,  
tum ad inuentorum op-  
portunum usum, admo-  
dum necessariū est. Por-  
rò medicamentum omne  
id dicimus, quod alterare  
nostrā naturam potest: si-  
cuti nutrimentum, quicquid substantiam augere. Re-  
fertur enim utrūq; ad aliquid. At uerò medicamētum  
simplex, et ipsum per oppositionem ad cōpositum nū-  
cupatur. Estq; id quod secundum naturam suam, syn-  
cerum est. At facultas, causa quædam est effectrix:  
eaq; partim actu, ut calefaciendi in igne; partim potē-  
tia, siue futuro tempore: quali nimirum calefacit pyre-  
thrum. Quum autem singulis medicamentis propria  
quædam effectrix facultas insit, aut purgatoria, aut uo-  
mitoria, aut alterius generis alia: nosq; alibi demon-  
strarimus ex calido, frigido, humido & sicco, corpora  
uniuersa conflare, certè facultatum effectricium essen-  
tias (de quibus neq; inter Medicos, neq; inter Philo-  
sophos conuenit) tum in alijs omnibus, tum in medi-  
camentis, has ipsas qualitates statuemus.

Tomus IIII.

A a a a

Simpliciū me-  
dicamētōrū co-  
gnitio ad quid  
conferat.

Medicamentū  
quid.

Nutrimētum  
quid.

Medicamētum  
simplex quid.

Facultas quid.  
Facultas ē du-  
plex, actu. s. &  
potentia.

Medicamētis  
singulis ppria  
quædam facultas  
inest.

Essentię facul-  
tatū sunt quali-  
tates ex quibus  
corpora cōstāt



2 GAL. PER. DE  
CAP. II.

Facultatis iudi-  
candæ experi-  
mentū sumēdū  
ēē ab ea re ad  
quā dicitur.

Aqua frigida  
calfacit ex ac-  
cidētī ut cali-  
da sepe refri-  
gerat.

Calida et frigi-  
da facultate, q̄  
dicantur.

Examine iudi-  
candæ quid  
requiratur.

Tenuiū et cras-  
sarū partiū, q̄  
dicant esse me-  
dicamenta.

Aquā esse ad  
vitā maxime  
necessariam.

**I**N primis autem ac maximè sumendum est iudicā-  
dæ facultatis experimentum, ab ea re ad quam di-  
citur. Nam quam uim in homine aliquod medicamen  
habet, in alio animali eandem nō necessariò sortiētur.  
Proximum est, ut quod ex accidētī est, distinguatur ab  
eo quod primariò & per se. Nam aqua frigida calorē  
quandoq; reuocat, cutem refrigerando, contrahēdoq;  
ad quod sanè consequitur reuocatio caloris. Rursum  
calida quoq; ipsa refrigerat sæpenumero, digerēdo ex  
calfacientem humorem. Quæ igitur admota corpori-  
bus nostris, primariò ac p se excalfaciūt, ea sanè facul-  
tate dicuntur calida: si uerò contrā, refrigerēt, frigida: nō  
autē q; alba uel rubra sint, tali facultate sunt prædita.

CAP. III.

**E**T enim quod ab initio ad finem usq; dum appli-  
catum est, magis semper calfacit, aut refrigerat, id  
non ex accidenti, sed ex sua natura est tale. Danda au-  
tem opera est, ut quodcunq; medicamen in iudicium  
uocare uelis, diutius hēreat applicitū, omnisq; sit alie-  
næ tum frigiditatis, tum caliditatis expertus: ne natiuam  
facultatem illius ascititia adulteret qualitas. Porro  
quædam tota substantia in sese mutuo & agunt, et pa-  
tiuntur: quædam una duntaxat, aut duabus qualitati-  
bus. Ad hæc, alia quidem tenuium partium sunt: alia  
crassarum: tenuium quidem, quæ facilē in tenues com-  
minui partes possunt: crassarum uerò, quæ contra.

CAP. IIII.

**S**I igit primò aquam, quæ & cōmunissima uniuersis  
homīnibus, tam sanis q; ægris est, & ad uitam  
maximè necessaria, nec frigidam insigniter, nec cali-  
dam, corpori temperato applicueris: dein ijs quæ na-  
tura sint intemperata: tertio, quæ aliquo affectu tenē-  
tur: temperato quidem admota, plusculo tempore om-  
nino ipsum refrigerabit: intemperato uerò, citius qui-



S I M. M E D. F A C. L I B. I. 3

dem refrigerabis id quod frigidius natura fuerit: tardius autem qđ calidius: semper tñ refrigerabit. Quum uidelicet talis existens, nequeat reuocare calorē, quē admodum summē frigida: quę si quadrato, aut iuuenilis corporis naturę pauculo fuerit tempore admota, caloris molietur reuocationem. Sin aliter utaris, semper refrigerabit: id qđ etiā facit admota ijs qui simplici laborant affectu. Nam ubi affectus compositus fuerit, contingit aliud primariò à medicamento fieri: aliud ex accidētis: ut licet cernere in phlegmone, quę calidę copiosęq; fluxionis est soboles. Siquidem quę modicē excalescunt pharmaca, dum superfluitatem euacuant, id quod affectum est, protinus frigidius efficiūt. Aqua itaq; potabilis utrobique uidetur frigida: id quod nō licet de ijs asserere, quę sulfureę, bituminosę, atq; nitrosę existunt. Immo uerò neq; marina ipsa, prius qđ ascititium frigus summum acceperit, admodum refrigerare conspicitur. Ergo quę exactē ac syncerē aqua est, omnis alterius substantię mistione uacans, ea necessariò ex sua facultate est frigida. Si qua uerò per bituminosa, sulfurea, nitrosa, aut aluminosa loca distillās, aliquid secum eius substantię absterferit, mista iam ea est, non autem exactē aqua. Quod si etiā ipsi aquę potabili igneam aut essentiam, aut qualitatem adieceris, sic etiam quodammodo compositam illam effeceris. Quinetiam aqua limosa, quali apud Ægyptum utunt, composita quadatenus est: sed ea per fictilia uasa optimē percolata, qđ purissima efficitur.

C A P. V.

**I**udicatur autem aqua gustu, uisu, & olfactu. Siquidem gustu est pura, si omnis qualitatis expers uideatur. Visu, si syncera & pellucida fuerit. Sic nec odoratu, ullam prę se ferre qualitatem debet, ut sunt quędam prauitatis extremę, quę aut aciditatem, aut acrimoniam, aut faldinē, aut putredinē pręferunt. Igi-

Aaaa ij

Aqua summę frigida i qbus calorē reuocet.

Aqua potabilis frigida existit.

Aqua ois syncera est naturaliter frigida.

Aquę mixtę quę sint.

Aqua limosa apud Ægyptū utuntur.

Aqua debet iudicari gustu uisu, & olfactu.



Elemētum pu-  
rū minime re-  
peri.

tur aqua, quæ absq; his est omnibus, ut ad naturā cer-  
tē, ne ipsa quidē adamussim syncera fuerit, sicuti neq;  
aliud ullum sensibilibium elemētorum, sed ut ad sensum  
& usum, syncera est. Quæ itaq; examinanda ueniēt me-  
dicamina omnia, omnis extraneę qualitatis ualentis q;  
aliena sumpto. **C A P. VI.**

Aqua oīs dul-  
cis refrigerat.  
Ceratū humi-  
dū ablutū fri-  
gida, calidos  
omneis affe-  
ctus refrigerat

**Q**uod autem omnis aqua dulcis manifestō refri-  
geret, hinc discas licet, quōd si cerā oleo liqua-  
ueris, humidūq; ceratum confeceris, ac postea ipsum  
refrigeratum, largiori q; affusione frigide ablutum ad-  
moueris, ualenter eos qui febre urunt refrigeret, si hy-  
pochondrijs supponatur: nec non omnem phlegmonē,  
herpetes, carbunculos, erysipelata, phygethla, & bre-  
uiter omnes calidos morbos: id quod non continge-  
ret illi per aliquam nuper dictarum aquarum, quæ cali-  
dis aduersantur affectibus, calidæ nimium quum sint.

#### C A P. VII.

Aqua potabi-  
lis sola est hu-  
mida.

**C**Aeterū q; aqua quoq; potabilis sola sit inter p-  
positas humida, ex eadē disces methodo. Nam si  
ulcera supra modum sicca, hac irriges, statim admodū  
humida & mollia reddentur, quum aliæ aquæ uniuersæ  
ulcera desiccant: nōnullæq; etiam ob acrimoniam  
exasperēt. Quin etiam sitiētī, dulcis aqua remedio est:  
cæterę uerō, acerbiores etiam sitim relinquunt. Tum  
aqua inter cutem laborantibus aduersissimū est & po-  
culum & lauacrum aque dulcis. Salsarum uerō, nitro-  
sarum, sulfurearum, bituminosarumq; omnium, sanē  
perutile. Imitari autem potes, sicuti marinam, sic alia-  
rum quamlibet, substantia uidelicet admista, quæ in  
quaq; uincere cernitur.

#### C A P. VIII.

Aquæ natura.

Aquā summe  
humectare.

**A**Quę igitur propria natura humida & frigida est.  
Cæterū summē quidem humectat, siue tepida,  
siue temperata ea sit: non autem calfacit summē, nisi  
quę extremē ferueat. Quōd si corpus aliquod eucratū,



# S I M. M E D. F A C. L I B. I.

calida moderatè perfundas, in ipso quidem pfusionis  
tēpore, calidius simul, atq; humidius efficies: paulo ue-  
rò post, id seipso euadere frigidius, non tamen siccius,  
conspicies. Nam tãetli humores qui in uasis, alijs q; cō-  
munibus spatijs sunt, per id genus perfusiones, uniu-  
si exhauriant, ipsa tamen uasorum corpora, & uniu-  
sum genus carnosum seipso humidius redditur. Qua-  
le exēplum, quāuis ratione diuersa, licet uidere in seni-  
bus: qui quum genuinas partes, q̃s adolescentes, magis  
siccas sortiantur, pluribus tamen excrementis redun-  
dant. Hanc itaq; humectandi uim solam, nuncq; aqua  
deponit. Neq; enim siue feruens sit, siue etiam extreme  
frigida, partem cui affusa fuerit, sicciorem efficit: quāq;  
ob euaporationem quæ à calida perfusione excitari so-  
let, perfusa particula nonnullis longè sicciior uideatur,  
quum præsertim uapor, humor sit extenuatus.

## C A P. I X.

**N**Ec uerò usq; adeò absurdum fuerit, quod facile  
in ignem uertitur, id calidum facultate putare.  
Vnum quippe ex ijs quæ facultate talia dicuntur, est id  
quod ex propria eius quod dicitur materia, tale est fa-  
cultate. Vt si quid facile in ignem uertitur, id non actu,  
sed facultate est ignis. Nam hoc quod est facultate, ex  
aduerso ei diuiditur, quod est actu: sicuti & quod est p-  
se, huic quod ex accidenti contingit.

## C A P. X.

**A**T quibus consilium est, tutò à rebus extraneis,  
ad corpora transire animalium, uidere primùm  
debent, an tenuis sit essentiæ, an crassæ, quod exploran-  
dum uenit. Secundò, an sibi continuum, densumq; ac  
solidum: an interuallis interceptum, an rarum.

## C A P. X I.

**E**Orum autem quæ in confesso est facultate esse ca-  
lida, nullum omnino apparet nos calfacere, prius  
q̃s in tenuia sit cōminutum. Nam si quis piper integrū

A a a iij

Aqua semper  
humectat.

Senes p̃tibus  
quidem solidis  
sunt sicci, ex-  
crementorū au-  
tem copia hu-  
midi.

Vapor humor  
ē extenuatus.

Ignis potentia  
est, quod facile  
in ignē uertit̃.  
Facultate ali-  
quid, ex aduer-  
so dicitur ei  
quod actu.

Calida potesta-  
te, ut nos calfa-  
cere possint,  
debent prius i  
tenuia commi-  
nui.



Piper calfacit.  
Ignis omnium  
tenuissimus &  
calidissimus ē,  
ob idq; facile  
penetrat.

Caliditas no-  
stra crassæ est  
essentiæ.

Calfacientia  
corpus, ab eo  
initium caloris  
assumere.

cuti inspergat, nullam planè caliditatem percipiet: si ue-  
rò pollinis instar cuti inspergatur aut linguæ, excalfa-  
ciet utiq; ac potissimum si fricueris. Quare multa qui-  
dem facultate sunt calida, facileq; in ignem uertuntur,  
quæ nos tamen haud facile excalfaciunt. Ignis siquidē,  
ut qui omnium tenuissimus & calidissimus sit, mini-  
mo negotio penetrat illa, atq; uincit. Nostra autem ca-  
liditas, præter q̄ quod crassæ est essentiæ, halituoia q;  
adeò existit infirma, ut ægrè quod contingit permutet.  
Quare nihil eorum quæ calfacere nos uidentur, perin-  
de ut ignis calfacere potest, sed tanquam materia quæ  
accenditur facilè. Siquidem mutationis principium à  
nostra caliditate accipiētia, ut calami aridi ab igne, nos  
contra recalfaciunt, & ueluti partes fiunt quædam na-  
tui caloris; ut ignis illi. Quare mirandū nō est, si quæ-  
dam medicamenta primæ q̄dem mutationis principium  
à nostro calore nacta, inde iam pergāt, eum quoq; qui  
mutabat, uincere & superare.

#### C A P. XII.

Corpus uniuersum  
esse transpirabile.

Medicamenta  
oīa quo pacto  
ī corpore suas  
uires exerceāt,

PORRò cutis omnis in primo statim ortu sibi conti-  
nua quum sit, tēporis spatio pertunditur, sic ut uni-  
uersum corpus fiat perspirabile, arteriæq; ipsæ (quæ  
in cutis meatus, quemadmodum uenæ, aperiuntur) un-  
dequaq; se dilatantes, per poros attrahant, non aerem  
modò, halitumq; sed quicquid etiā trahi facilè potest,  
ac præ tenuitate sua, motum ipsius spiritus consequi.  
Quam obrem quicquid piperis ad exactissimum fue-  
rit redactum pollinem, uerisimile est, simul cum am-  
biente aere, ab ipsis arterijs attrahi, protinusq; à calore  
natiuo alterari, idq; tum ob paruitatem, tum ob ingeni-  
tam ut à calore alteretur aptitudinem. Quod quidem  
si semel illi insit, per totum corpus, temporis progres-  
su, perlatum, ipsum recalfaciet; prius tamen calfaciens  
sibi proximiores particulas, Vnde liquet, crassorū nul-  
lum, prius q̄ ad unguem comminuatur, neq; ipsum à



# S I M. M E D. F A C. L I B. I. 7

nostro corpore quicquā perpeti, nec rursus in nos posse agere. Quod uerò in pipere adduximus, exēplum idē licet ad alia transferas, siue ea calefaciendi, siue etiam refrigerandi facultatem sortiantur.

## C A P. XIII.

**C**onsyderandum autem est, non solū crassarū ne sit partium, an tenuium, explorandorum medicamentorum substantia. uerū etiam rara ne an spissa, densaue. Voco sanē rarā, cuius partes inanibus spatijs sunt interceptę. Vbi igitur spatijs eiusmodi multis, quę plena semper sunt aere, corpus fuerit distinctum, facilius q̄ spissum accenditur; etiam si calidius illo non fuerit. Nam qui in ijs spatijs continetur aer, primo statim ignis occurſu accenditur, atque inflammatur (aer enim accensus est flamma, quemadmodum terra, carbo) unā uerò secū corpus uniuersum accēdit. Sic itaq; calamos aridos ignis exurit celeriter, tametsi minus alia substantia calidos, idq; ob meatuum multitudinē, quos prius aer occupabat, quorum argumentum summum, calamorum leuitas est. Nam siccum natura corpus, leue esse alioqui non posset. Quęcunq; autem fistulosa sunt, multumq; uacui obtinent, pondere existunt leuia. At calamus à nostro corpore ægre calſieri potest, q̄ essentię sit crassę. Si igitur alicuius medicamenti substantia tenuis sit & continua, eandem in nos naturam ostēdet, quam prius in ignem: sin autem rara sit & crassa, fieri poterit, ut ab igne quidem alteretur per faciliē, non tamen à calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

## C A P. XIII.

**Q**uamuis aqua ipsa tenuis substantię sit, non tamen ob id ex sua natura nos calfacit, nec proprium est ignis nutrimentum, sed potius extinguit illum, ut quod illi sit aduersissimum. Nec mirum si cum igne tum calidissimo, tum siccissimo pugnet aqua, fri

Rara quę sint.  
Rara q̄ spissa  
cur accendant  
facilius.

Flāma est aer  
accensus.  
Carbo est terra  
succensa.

Fistulosa omnia  
sunt leuia.

Aqua igni aduersissima, nimium frigida & humida.

Aaaa iij



Oleum cur ob  
scure nos cal-  
faciat.

Aqua feruens  
simul cū oleo,  
citius q̄ illud  
absūmitur.

Calfaciēs actū  
et potētia, unū  
quodq̄ dupli-  
citer dicitur.

Concreſcentia  
in glaciē faci-  
lius, tēperamē-  
ti sunt frigidio-  
ris, si vtrōq̄  
eadē consisten-  
tia inſit.

Tenuia corpo-  
ra prōpte inca-  
leſcūt, atque re-  
frigerantur.

Ignis non con-  
gelatur.

gida & humida exiſtens. Porro oleum, tametſi in flam-  
mam uertatur facile, non tamen admodum celeriter,  
nec manifeſtē nos calfacit, ob lentorem ſubſtantiæ, quo  
tenaciter inhæret ijs, quæ ſemel contigit: neq̄ ab am-  
biente facile aut extenuari, aut augeri ualēs, nec prom-  
ptē intus in corpus tranſumi. Aqua uerò, & celerrimē  
in halitum ſoluitur, & expeditē digeritur. Quod ſi in  
idem uas coniectam aquam, oleumq̄ decoquas, prior  
aqua abſumeretur. C A P. XV.

V T autem calfacientium, aliud eſt ſimpliciter cali-  
dum, ut ignis: aliud exuperantiā, ut qui in nobis eſt  
calor: ſic eorum quæ facultate ſunt calida, aliud quidē  
ad id q̄d primò & abſolutē eſt calidū: aliud uero ad id  
q̄d per exuperantiā reſertur. Non ergo quod citius ac-  
cendit, protinus ad nos ſimpliciter apparet calidius.

## C A P. XVI.

S Ed neq̄ citra limitationem, ex eo q̄ aliquid in gla-  
ciem cogatur, debemus frigidum eſſe colligere.  
Nam in ijs quæ eandem habent aut tenuitatē aut craſ-  
ſitudinem conſiſtentia, quod ocuus à frigore conge-  
latur, temperamenti eſt frigidioris. Si uerū alterum ſit  
tenuius, puta exempli gratia, uinum: alterum craſſius,  
ut oleum: non eſt neceſſe aut citius, aut magis concre-  
ſcere quod eſt frigidius: niſi frigiditatis exceſſus, q̄ huic  
ineſt, exceſſum craſſitudinis, quæ ineſt alteri, ſuperet.

## C A P. XVII.

E St autem refrigerari, frigidam qualitatem recipe-  
re: at congelari, dureſcere eſt præ frigore. Quæ-  
cunq̄ igitur corpora tenuis eſſentia ſunt, promptē tū  
incaleſcunt, tum refrigerantur: at non æquē congelan-  
tur: ut aer, & ignis. Nam hic planē non congelatur: il-  
le autem, nempe aer, non perinde ut uitrum, pix, cera,  
reſina & bitumē: cuius quidem, tametſi calidiſſimum  
ſit, terrenitas tamen craſſitiesq̄, ad congelationis cele-  
ritatem adiuuat. Porro aquam quæ celeriter & incale-



sceret, & refrigeraretur, meritò leuissimā esse dixit Hip-  
pocrates. Nam quanto tenuior fuerit, tātò pati erit prò-  
ptior. Atqui quæ tenuior est, minimum habet limi ter-  
restris. Non ergo absolutè ex materiæ passionibus ad  
ignē, conijcere eius ad nos facultatem oportet: quum  
multò securius sit hoc iudicium, quo ad nostrum cor-  
pus quippiam examinamus. Quòd lac simile nō sit,  
nec undequaq; sibi simile, coagulatio indicat, qua sero-  
sæ partes à caseosis facilè separantur. In uniuersis etiā  
liquoribus, qui à fructibus exprimuntur, crassum de-  
fertur quippiam, quod spatio temporis subsidet: uoca-  
turq; fæx in uino; in oleo autem amurca. In aceto uerò  
est eiusmodi quipiam: ac forsan ipsum est, quod caloris  
est particeps. Nam quod frigoris, id quod tenue est. At  
acetum maiori ex parte frigidius est, q̃ calidius.

## CAP. XVIII.

**P**erperam igitur faciunt, qui usq; adeò calidum esse  
acetum pronunciant, ut cauterio illud assimilent:  
quum tamen nec tantam sensu percipiamus in aceto  
caliditatem, nec ipsum crustas, instar cauterij, excitet.  
Constat siquidem ubi per cauteria consilium est, san-  
guinem sistere, crustam relinqui haud exigua, quæ ue-  
luti operculum sit corporibus sanguinem profunden-  
tibus. Ac proinde illis cauteria planè candentia appli-  
camus: quæ haud quidem q̃ calfaciant, sed q̃ urant,  
atq; subiectis partibus operculum, quā Græci uocant  
escharam, relinquunt, fluentem sanguinē supprimunt.  
Itaq; acetum, haud perinde ut crusta facientia medica-  
menta, sed potius ut astringentia citra crustam, sangui-  
nis fluores cohibet: qua ratione non excalfacere, sed re-  
frigerare potius ipsum existimandum est.

## CAP. XIX.

**S**i uerò idiotam aut plebeium aliquem (nam horum  
in istiusmodi rebus icorruptum est iudiciū, q̃a nul-  
li dogmati seruiliter sunt addicti) temperato aceto ex

Aqua q̃ dicat̃  
leuissima.

Lac non esse  
simile.

Fæx.  
Amurca.  
Acetum maio-  
ri ex parte fri-  
gidius q̃ cali-  
dius, exilit.

Cauteria san-  
guinem suppri-  
munt, q̃ relin-  
quāt escharā.

Acetū, qua rō-  
ne fluentē san-  
guinē sistat.

Idiotarū iudi-  
cium cur incor-  
ruptum.



Acetū est frigidum, q̄q̄ calorū particeps

Acetū ardorē a thapsia excitatū, sua refrigeratione restinguit.

spongia fouerimus, dein autē interrogauerimus, nū calorem an frigus percipiat, fatebit̄ quidē se, primō sanē frigus percipere: postea autem, nempe spōgia sublata, sensim nascentis in parte quādā caloris phantasiā sentire. Vnde perspicuum est, omnino quidem frigidum esse acetum, obtinere tamen quendam calorem, qui acrimoniæ ratione per accidens successu temporis corpora calfacit; nisi fortē ubi laxus ac doloris expers tumor infestat. Si quis etiam illo ab illata thapsia utat̄, ardor aceto restinguitur: nō q̄ acrimoniam & mordacitatem obtundat, ut oleum atq̄ rosaceū, sed q̄ euidenter refrigeret. Quare nisi molesta facultatis asperitas illi inesset, non alio utendum ad refrigerationem foret.

## C A P. XX.

Aceti tēperatūram non lōge a mediā distat

**Q** Vum autē aliq̄ ob acrimoniā ipsius, calidissimū esse acetum contendant: aliq̄ contra, maximē frigidum, quod putent ipsum grumos cōstringendo dissoluere, uerisimile est, id iuxta mediū consistere. Quippe si longē ab extremorum utroq̄ distaret, nō tanta incidisset de facultate ipsius controuersia.

## C A P. XXI.

Neutra dici tripliciter.

Acetū qua rōne dicat̄ neutrum  
Rosaceū qua ratione dicat̄ neutrum.

**Q** Via uerō quæ neutra sunt, dicuntur tripliciter, secūdum diuisionem Herophili, partim amborum extremorum participatione: partim neutrius: partim nunc illius, nunc huius: mihi sanē tum acetum, tum etiam rosaceū, utriusq̄ extremi necessitudine, esse neutra uidentur: & q̄ nunc quidem sensibilibiter calfacere, nunc refrigerare cernantur.

## C A P. XXII.

Aeris tenuitas unde iudicet̄.

Ignē cōm non esse tenuem.

**Q** Uod uerō ad aerem spectat, iudicatur eius tenuitas, ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Ceterū si ea ratione ignis sit tenuis, haud omnis ignis tenuis existimabitur, quum æs & ferrum fiat ignis, non tamen q̄ antea tenuius. At flammæ, quum aliud sint ignis genus, re uera tenues existūt. Quocirca non om-



SIM. MED. FAC. LIB. I. 11

nis ignis est tenuis, nec quicquid tenue, protinus & ignis fuerit. Nam pruna ignis quidem est & non tenuis: & aer tenuis, uerum non ignis.

Tenuia oia nō esse ignem.

CAP. XXIII.

**Q**uocirca minimè concedendum arbitror, acetum, quod mordax & tenue sit, calidum continuo esse. Nec enim quicquid mordax fuerit, id & calidum est: fortè uerò, nec quicquid mordax fuerit, & tenue.

Mordacia oia non eē calida.

CAP. XXIIII.

**E**orum igitur medicamentorum quæ uehementer aut refrigerant, aut calfaciunt, non sunt facultates ambiguæ. Verum ea de quibus dubitare cōtingit, neutra omnino esse, necesse est. Pleraque autem, ut ad sensum simplicia, expugnātibus facultatibus constant: ob quas quidem fieri potest, ut acetum uim illam obscure calfaciendi, quam ostendit, sortiatur, existens alioqui tenue, refrigeratorium, atque exiccatorium medicamentum. Etenim quidam efflorescere rubor in partibus ab acetum

Neutra eē de quibus dubitari cōtingit.

Aceti facultas

CAP. XXV.

**C**eterum non sat est generaliter uires medicamentorum cognoscere, quod hoc uidelicet calfaciat, illud autem refrigeret, nisi etiam ipsarum facultatum excessus & gradus, accuratissimè didicerimus. In qua quidem cognitione, tum artificialis simplicium usus est constitutus, tum ratione proficiscens ac methodo compositio: ipsorumque compositorum recta usui accommodatio.

Facultatū medicamentorum excessus & gradus discendos esse.

CAP. XXVI.

**P**erperam autem superioris seculi homines à compositis orsi medicamentis, eorum quæ in illa ingrediuntur medicamentorum simplicium uires diiudicabant. Quum non liceat rectè composita ipsa cognoscere, prius quàm simplicia sigillatim examinarimus.

Cōposita cognosci nō posse, simplicibus ignoratis.

CAP. XXVII.

**A**tque hi quidem, quum citra iudiciū simpliciterque



compositis omnibus facultatibus fidem habent, uel Empiricis ipsis reprehensionis locum & occasionem exhibent.

## CAP. XXVIII.

Sensus cur nō  
sint cōtēnēdi.

**Q**uum autem non aliunde ignem calidum esse, ac glaciem frigidam cognoscamus, q̄ ex sensu ipso, omnino stupidi sunt, qui sensus esse cōtēnēdos existimant.

## CAP. XXIX.

Oxycrati vi-  
res.

Aquā ab ace-  
to deduci per  
vniuersum cor-  
pus.

Aqua uino p-  
mixta, q̄ sola,  
cur efficacius  
restingat sitim

**P**orrò æstiuo tempore oxycrati potu, quidam pla-  
nè refrigerantur, atq; sitis expertes permanent. At  
nondum constat, an id aceti causa contingat. Dixit  
tamē aliquis, aquam, tardioris distributionis quum sit,  
ab aceto, tanq̄ uehiculo, duci digeriq; in uniuersas par-  
tes. Sic etiam si cum uino bibatur aqua, sitim efficacius  
extingui, q̄ si sola. Refrigerationem itaq; sitisq; sana-  
tionem ab aqua prouenire, ut quæ frigida & humidaq;  
naturæ sit: cæterum adminiculo esse, ac ueluti alas illi  
ad omnes corporis partes permeandas, tum uinum, tū  
acetum: quæ ipsa nequaq; frigida sunt & humida: alio-  
qui ad restinguendam sitim, præstaret ea sola, q̄ cum  
aqua, exhiberi. Porro ut à uino apparet homini semp  
sitim incrementum, sic ab aceto epoto, interim quidem au-  
geri, interim uerò sedari.

Vini semper  
ad auget sitim

## CAP. XXX.

Sitis unde exo-  
riatur.

Acetū cui siti  
remedium sit.

Oxycratū ex  
aqua & aceto  
constat.

**Q**uum igitur sitis, partim humoris inopia, p̄tim  
caloris copia proueniat: neq; à sicca dispositio-  
ne prouenientem sitim, neq; à calida & sicca, epotum  
sanare unquam potest acetum. At si quando in unum  
coeant humiditas atq; caliditas, eiusce sanè sitis, acetū  
medela optima existit. Siquidem humectare nequit: at  
refrigerare, non instrenuè. Verum siti, quæ ex compo-  
sita affectione, uidelicet calida & sicca, nascit̄, compo-  
sita medela est oxycratum, quod ex aceto cōstat tenuiū  
partium, atq; refrigerante: & ex aqua, quæ non modo



refrigerat, sed humidorum etiam omnium est humidissima. Nihil enim aqua est humidius.

## CAP. XXXI.

**P**er se autem solum, quod iudicandum est, expende re oportet, tum in sanis temperatisq; corporibus: tum etiam in intemperatis: ac præterea in ijs qui alicui sunt morbo obnoxij. In temperatis quidem, ut supra: in intemperatis autē, sicuti dixit Hippocrates. Naturis picrocholis utilissimum esse acetum: at melancholicis aduersissimum. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectu: si mistum alicui, necessum est, id cui miscetur, temperatura sit medium. Siquidem quod medio coniunctum fuerit, ipsum eorum quæ perficietur, existet causa. Quare si acetum simplici cerato commisceas, cerato ipso longè frigidius medicamen effeceris: eritq; tibi id remedium uel optimum, ad erysipelata, phlegmonas, herpes, & carbunculos. Sin autem quod mistum est, tanq̃ simplex expēdas, hallucinaberis. Nam quemadmodum ærugo neq; carnem producere, sed ceratum quod illam recipit, sic ulcerum glutinatorium, non acetum, sed oxycratū est. Quippe acetum per se, ulcera erodit & mordicat.

## CAP. XXXII.

**I**am uerò, quum liceat ex astrictorijs complura offendere, quæ minimè sanè conglutinent: sicuti ex conglutinantibus, haud etiā pauca, quæ minimè astringentia uidentur, falluntur q̃ absurdissimè, qui astrictoria omnia conglutinare, conglutinantia omnia astringere proficiuntur.

## CAP. XXXIII.

**M**iserè etiam hallucinantur, qui astringentia omnia refrigerare dictitant: quum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quæ ualenter astringunt, tantam assequuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant.

Aqua humidorū oīum est humidissima.

Medicamenta q̃ iudicare uolumus, qualiter expēdē oporteat.

Acetum biliosis esse utilissimum, aduersissimum melancholicis.

Ceratum simplex aceto ablutum, contra tumores calidos optimū esse p̃sidiū.

Oxycratū uulnera glutinat.

Astrictoria oīa haud quæq̃ conglutinare, neq; glutinantia oīa astringere.

Astringentia cū haud quæq; refrigerare.



Dioscoridem  
suggillat Ga-  
lenus.

Caprillus adeps  
contra suc-  
cos itesina ero-  
dentes, cur sit  
salutare p̄diciū  
Astringentium  
opus.

**H**erodotus autem & Dioscorides, q̄ medicamen-  
ta quædam profluuijs alui, atq; dysenterijs mede-  
antur, ob id astringentia ea esse colligunt: quum tamen  
ne minimum quidem astrictiōis sortiātur, sed potius  
rarefacientia & laxantia sint. Nam exempli gratia, ca-  
prinus adeps, omnibus quæ & gustu & facultate sunt  
astringentia aduersissimus est: ijs tamen quæ acria &  
mordacia per aluum fluunt, manifestè efficaciterq; au-  
xiliatur: q̄ scilicet concresecat facilè, inūgaturq; intesti-  
nis, ac plurimo tempore inhærens, illa demulceat, &  
foueat Quum uidelicet condensare, cōstringere, & cō-  
stipare, opus sit astringentium.

## CAP. XXXV.

Tāgibiles qua-  
litates.  
Visui quæ sub-  
iiciantur.  
Gustui q̄ subii-  
ciantur.

**V**Naquæq; sensibilibium natura, priuatim subiecta  
est, tactui quidē caliditas, frigiditas, durities, atq;  
mollities: albedo uerò, nigredo, atq; ut summatim di-  
cam, uniuersum colorū genus, uisui: amaritudo, dulce-  
do, austeritas, acerbitas, aciditas, salsedo, acrimoniaq;  
gustui. Planeq; demens uideatur, si quis gustu colores  
iudicare tentet, aut sapores uisu, similiterq; & de alijs  
sensibus. Siquidem tactu iudicandæ sunt differentiae  
tangibiles: auditu audibiles: odoratu odorabiles. Om-  
nis autē inuentionis demonstratiōisq; principia sunt,  
quæ sensui atq; intellectui euidētia existunt.

## CAP. XXXVI.

Saporū diui-  
siones ex doctri-  
na Platonis.

**P**orrò Plato in Timæo, sapores (quos Græci χυ-  
μὸς appellant) duos primū assignat, eosq; ut spe-  
ciei eiusdem, sic rōne maioris & minoris inter se diffe-  
rentes. Quorum sanè alterum austerum, alterum acer-  
bum, qui ex illius intensiōe procedit, nominat. Secū-  
dam speciem facit, eorū qui illis opposita sunt, nitro-  
forum uidelicet, salforum, & amarorū. Et in his quoq;  
amarus ex nitroso prouenit intensiōe. Salsus uerò, aut  
nitroso imbecillior est, aut astrictiōis quoq; assumēs



aliquid. Deinde à Platone acris expositus est: mox acridus: postremo dulcis. At à Theophrasto additus est unctuosus, quem nimirum omisit Plato, ut qui ad gustum nihil attineret.

## CAP. XXXVII.

**E**Xponere autē hos sapes exactē, impossibile est: quandoquidem neq; aliam ullam sensoriam passionem: eum tamen qui tali sensu cōmunicat, recordari fuerit possibile. Igitur quando quod linguæ nostræ fuerit ad motum corpus, uehementer desiccat, contrahit, & in multam profunditatem usq; illam exasperat, sicuti pira syluestria immatura, & corna, eiusmodi omne appellatur acerbum: ab austeris tantum intensione diuersum. At quod astringens uocamus, idem uidetur significare quod austerum, aut etiam cōmune esse genus tum huius, tum etiam acerbi. Quæ uerò linguam, dum contingunt, non contrahunt, neq; constipant, sed detergunt potius & abluunt, etiam si astringentiū quippiam permistum habeant, hæc omnia salsa cognominamus. At quæ his etiam magis detergunt, ita ut etiam molestē exasperent, amara uocantur. Porro quæ mordicāt, roduntq; idq; cum ualida quadam caliditate, dicuntur acria: sin hæc absit, acida: cæterum hæc fermentandi quoq; uim obtinent. Rursus, quæ ueluti inungūt atq; implent, in statumq; suum restituunt exasperatas ac ueluti erosas linguæ particulas, hæc, si cum uoluptate manifesta cōtingant, dulcia: sin hac sine, pingua uocantur. Quòd si ex calido, frigido, humido, & sicco, coeuntibus, uniuersa constent, uerisimile profectò est, dictarum quamq; qualitatum, ex horum etiam miscella conflare.

## CAP. XXXVIII.

**V**erū non quale unumquodq; ex se sit, & ad totā naturam, sed quale secundum corpus nostrum, consyderamus. Alioqui nec acetum, nec marina aqua

Unctuosum saporem nihil attinere ad gustum.

Sapores exacte exponere esse impossibile:

Acerba quæ. Astringēs esse cōmune genus austeri & acerbi.

Salsa quæ dicuntur.

Amara quæ.

Acria quæ. Acida quæ.

Dulcia quæ. Pingua quæ. Sapores oēs ex miscella quatuor qualitatum primarum nasci.

Medicamenta singula taliadici qualia erga nos sunt.



Experientia est  
certissima iudi-  
catrix faculta-  
rum q̄ medica-  
mentis insunt.  
Impuros aīos,  
prius esse a pa-  
ralogismis pur-  
gandos, q̄ ve-  
ra doctrina i-  
buendos.

nos exiccare possent, sicuti nec sicca dici, quum utriq̄  
illorum sit actu humidum. Ceterum si nos exiccare ap-  
pareant, sicca dicentur, ad nos uidelicet, & nostram na-  
turam, parē siccandi uim obtinentia: de cæteris q̄ qua-  
litatibus idem est ferendum iudicium. Quare faculta-  
tum omniū quæ medicamentis insunt, experientia erit  
certissima iudicatrix. Quam qui relinquunt, nō solum  
falsa pro ueris ducūt, sed tractationis etiam utilitatem  
destruunt. Idcirco prius delēdi sunt dispungendi q̄ om-  
nes paralogismi à discentium animis, q̄ in uera disci-  
plina imbuantur. Nam quemadmodum corpora im-  
pura, quāto magis nutries, tanto magis lædes, sic quo-  
que si impuris animis nutriētes sermones offeras, nō  
modò nihil prodis, uerū etiam magnopere obfueris.

## G A L E N I P E R G A

### M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamentorum facultatibus. Lib. II.

#### C A P. I.



Rationem solā  
esse nobis cō-  
munē cū Diis.  
Sensus referen-  
dos non esse.

ON desunt qui nobis, mortales quī-  
simus, à sensibus auspicandum esse  
contendant, ad facultates omnes exa-  
minandas: in illis tamen perpetuò im-  
morandum nō esse, sed ad partem di-  
uiniorem accedendum, nempe ratio-  
nem. Sensus quippe & animantibus inesse rationis  
expertibus: rationem autem solam, hominibus esse cū  
Dijs cōmunem. Qui sophistæ non sentiunt, si à sensi-  
bus recedendum sit, demonstrationis primordia futu-  
ra esse longè incertiora, quā ea quæ demonstnan-  
da ueniunt.

#### C A P. II.

E Quidem optarim nullas non res clarè sub sensus  
nostros



nostros cadere, nec quicquam esse quod illos fugeret. Hoc enim pacto nihil ambiguum unquā aut anceps foret. Verū quoniam illos quedam effugiūt, rationem ipsi superinducere conandum est: sic tamen ut nec cōfusa, nec infinita colligamus, sed ante omnia, nominū significata diligenter definiamus: deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separetur. Irridendi autem meritō sunt, qui de olei aut rose colore nimis anxie ratiocinantur, quum rebus ipsis uarie uti liceat, de illisq; periculum facere. Ac tales mea quidem sententia, perinde factitare uidentur, atq; ij qui ex aliqua imagine cognoscere quempiam conātur, quem etiam uiuum intueri, maximē illis est licitum.

## CAP. III.

**T**Ribus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas temperatura esse calidas, q̄ sint rubræ. Primum, q̄ non demonstrata hac propositione, omnis ignis rubet, conuertere ex hac aliam, uidelicet omne rubrum est ignis, tanquam ueram conantur. Secundō q̄ nesciunt, propositiones quæ ex mutuō ueris conuertuntur, non autem simpliciter conuertentes, ueras existere. Tertiō, q̄ etiā si mutuō conuerterentur, non tamen omne quod colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa conuersione sequatur, sed rubrum omne esse ignē: id quod minimē inuestigamus. Eodem errore tenentur, qui ex odoribus, medicaminum facultates conijciunt. Nec enim quicquid bene redolet, calidū est: nec quicquid calidum est, bene olet. Quin etiā nec si quid graueolens est, calidum etiam fuerit, nec si calidum, etiam graueolens. Sic nec si quis quicquid grauiter oleat, frigidum dicat: nec si quicquid frigidum sit, olere grauiter, uerum dixerit. Siquidem calidorū innumera sunt, partim bene olentia: partim grauiter: partim neutra: atq; frigidorum similiter. Quāquam quid calida dico, ac frigida, cum dicere debeam nos calfacientia, & re.

Tomus IIII.

B b b b

Ambiguū nihil esset si oīa sub sensus caderēt.

Ratio cur interponēda sententiis.

Rosas q̄ rubræ sint, calidas esse dicētes, quōtupliciter peccēt

Propositiones q̄ ex mutuo ueris cōuertuntur, sunt ueræ.

Odores nō indicant facultates medicamentorum,



Calidum mul-  
tipliciter dicitur  
Hō nō absolu-  
te, sed per exu-  
perantiam cali-  
dus dicitur.

Color non sat  
est ad iudican-  
das medicami-  
num vires.

Sophistæ vtun-  
tur inductioni-  
bus et exēplis.

Inductio q̄ exē-  
plū validior.

Olei effectus  
uarii.

Oleo incocta  
reddunt, sicca.

Oleum oculos  
mordicat.

Oleum aluum  
subducit.

Oleum insecta  
perimit.

frigerantia? Etenim aliud est facultate calidum; aliud actu. Et huius quod actu calidū est, aliud absolutē dicitur calidum; aliud per exuperantiam; aliud ad symmetrum sui generis; aliud ad quiduis obuium collatum. Homo autem non absolutē calidus, quemadmodum ignis, sed exuperantia calidus dicitur: quia maior in eo portio calidi sit, quā frigidi. Ergo & quęcūq; ad hūc modū dicuntur calida potestate, illum dicuntur excalfacere, facileq; de ipsis iudicium sumitur per experientiam solam, cui adiūxeris paucos quosdam epilogismos. Quare neq; à calore, neq; ab odore, neq; à cōsistentia, aut huius generis aliquo, de medicamentorum facultatibus est opus ratiocinari.

### C A P. IIII.

**T** Aceo sophistas minimē quidem rationibus scientificis uti, sed aut inductionibus, aut exēplis. Differt autem ex exemplis quippiam suadeas, an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, unū, aut duo generis eiusdē affert: aut certē planē paucula, plerisque cæteris preteritis. Qui uerō ex inductione, omnia comprehendere nititur, quæ per experientiam sunt cognita. Quare talis inductio uehemēs est, ac plurimum persuadet.

### C A P. V.

**Q**uod uerō ad oleum spectat (quo de multa Archidamus citra demonstrationē atq; ineptissimē prodidit) quæ in ipso coquuntur omnia, sicca & friabilia efficit, contra quā in aqua contingit: quæ uerō sunt illo imbuta, magis propriam humiditatem conseruant, quā si eo madidata non essent. Quin etiam scillæ & urticæ morsus oleum persanat: & quum reliquum uniuersum corpus demulceat, tantūm oculos mordicat, nec non guttur exasperat. Subducit autem aluum: lassitudines tollit: ueturq; inuictos à frigore, atq; lera emollit, insectaq; animalia perimit. Quorū omnium causam



reddere debuisset Archidamus. Porro coci oleo tum carnes, tum pisces, interim dum assantur, oblinunt, q̄ siccæ, adustæq̄; extimæ eorum reddantur partes, si assentur citra talem unctiōem. Athletas etiam oleo gymnastæ inungunt, q̄ præsentem quidem lassitudinem soluat; occurrat autem futuris; ac breuiter frictiōem tum æqualem, tum mitem efficiat, corpusq̄; ad motus futuros præparet.

Oleum lassitudinem lenis.

## CAP. VI.

**A**T Archidamus non solum quæ in multis perspicuè apparent contemnit, sed hac etiam parte iure taxandus est, q̄ dicat meliorem esse frictiōem siccā, ea quæ cum oleo adhibetur, quia corpus durius & siccus ijs qui inunguntur, euadat: mollius autem ijs qui fricantur sicci. Falli præterea mihi in hoc uidetur, q̄ similiter affici putet tum ea quæ in illo coquuntur: tum eos qui fricantur. Neq̄ enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepidum, aut feruens, sicuti neq̄ aquam ipsam. Nam quî obscuro simile fuerit, herbas in oleo feruente coquere, ac exercitantiū corpora oleo temperato fricare. Etenim si quis uelit expendere oleum, ab omni prius aliena qualitate (à qua semper propria obscuratur) ipsum liberum reddat, atq̄ ita demum ad explorandum se accingat.

Archidami opinio cōuellitur.

Olei uires qualiter expēdendæ. Qualitatem propriam ab aliena obscurari.

## CAP. VII

**P**Ræparare oleum solemus, non aliter atq̄ aquam: nempe prius excalfacientes, ac deinde in aquā mergentes summè frigidā. Quòd si etiam fons in ipsum cū strepitu decidat, uasculo cui inest oleum, ante diligenter occluso, magis quoq̄; ac magis ita reddetur frigidū. Multum item frigefeceris, si præcalfactum ita in puteū demittas, ut aquam contingat. Ac sic oleum reddimus frigidum: \* cōtrario autem modo, calidum. Quo sanè utimur in refrigeratis corporibus, in alueum olei calidi demittentes, quibus pars quæpiam obstupuit, aut qui

Olei refrigerandi ratio.

Olei p̄fusio calidi, quibus cōueniat.

Bbbb ij



Oliua.

Olea.

Oleum simpli-  
citer & p̄ abu-  
sum dici.

tremuli sunt, aut conuulsione, aut tremore, aut motus  
sensus ue oblesione tentant̃. Porro fructus ex quo pre-  
mitur oleu, oliua nūcupatur: & arbor, olea: atq; hoc q-  
dem simpliciter & primariò oleum dicit̃: reliqua autē  
omnia per abusum & translationem.

### C A P. VIII.

Olei differētię  
complures.

**C**æterū ueri olei plures sunt differentię. Secun-  
dum ætatem quidem, quū aut recens est, aut æta-  
te uigens, aut inueteratum. Secundū præparationis mo-  
dum, quum simplex atq; impermixtum fuerit, aut præ-  
paratum cum sale. Secundū fructus diuersitatem, quū  
is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum in-  
ductam arte alterationem, quum ut ab initio fuit, sic re-  
linquitur: aut candidum redditur.

### C A P. IX.

Experiri q̄ &  
quomō medi-  
camēta debeat  
mus.

**E**xperiri autē solū oportet, quę impermixta sunt,  
& ab omni extranea qualitate aliena: eaq; primū  
in optima corporis constitutione: deinde in intempera-  
tis: demū in morbis simplicibus.

### C A P. X.

Oleum lassitu-  
dini confert.

**A**t nonnulli Medicorum, non solū in exploran-  
dis medicamentorum uiribus hallucinantur, ue-  
rū etiam in opinionibus quas habent de affectibus.  
Nām oleum q̄ lassitudinis remediū sit, omnes p̄pemo-  
dum consentunt: cæterū quis affectus sit lassitudo, non  
consentiunt: ac proinde secundum ipsorum doctrinā,  
nihil certi de olei facultate colligi potest.

### C A P. XI.

Oleū expers  
salis, et salsum  
qua rōne sub-  
ducant aluum.

**N**ec uerò parum interest, an inīciat̃ in uētre pi-  
tuita scatentem oleum expers salis, an quod plu-  
rimum accepit salis, in uentrem purum. Vtrūq; enim  
aluū subducit, facultatibus tamen diuersis: nempe il-  
lud quod sale uacat, in pituitoso uentre per lubricitatē:  
quod uerò salem habet, in puro, per acrimoniam, per-  
inde ut muria, & marina aqua. Idcirco sanē hoc rader,



alterum non radet.

## C A P. XII.

**N**onnunquam autem mordicationes ex accidenti quod saluginosum est, sanauerit, unà secum educens acres & mordaces humores, pinde ut cætera omnia quæ abluunt. Sed nō statim ubi immissa sunt id genus medicamenta morsus sanāt: quin potius tunc etiā magis exasperant. Siquidē euacuationis, haud mistionis ratione, sanationē moliuntur. At ceratum ex rosaceo & adipe infusum, sæpenumero morsibus cōtinuò succurrit, idq; cōmitionis ratione. Oleum etiam solū, sed dulcissimum, idem frequenter præstitit: sicuti certē adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratū ex oleo dulci. Nos autem sæpenumero quibus ex frigore torquebantur dolore interna, iniecto oleo calido liberauimus: atq; ubi maius esse frigus coniecimus, addidimus & anethum: si uerò adhuc etiam maius, rutā quoq; et bitumen. Cæterum occurrunt interdum quædam affectiones permistæ, ex intēperie uidelicet atq; mordicatione: in quibus consueuimus nos anethinum, aut rutæ oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adsit, saltē gallinaceo, aut aliquo aliorum, aut cera mordacitatis experte, qualis nimirū est lota. Vnūquodq; autem medicamentorum temperātium, ubi ualentius euasit humoribus mordicantibus, morsum eorum retundit. Verūm si aut ualētioribus facultatibus, aut multis, paucum permistum fuerit, unà & ipsum corrumpitur, alitq; cacochymiam. Quamobrem protinus euacuandi sunt, qui ab ijs quæ temperandi naturam habent, exasperantur.

## C A P. XIII.

**S**ic sanè lac frequēter simul atq; sumptū fuerit, alijs sacescit, alijs in nidorem uertitur, prius q̃ probè cōcoctum, corruptionem temperet. In quibus utiq; primum cacochymix pars euacuari debet: atq; inde su-

Bbbb ij

*Saluginosa  
ex accideñi nō  
nūq̃ mordica  
tiones sanant,*

*Dolentibus in  
testinis q̃ so  
leat opitulari.*

*Cera elota est  
mordicationis  
expers.*

*Vacuandos p  
tinus esse, q̃ ab  
iis q̃ tēperandē  
naturā habēt,  
exasperantur.*



mendus chondrus, & ptisana, & lac, & alia, quæ ubi probe fuerint confecta, conferunt ad boni succi generationem. Porro ptisana, ex sua propria natura, boni quidē est succi: uerū interdum, unā cū his succis, qui excitant mordicationes, corrumpitur, atque ipsum augeat symptoma.

## C A P. XIII.

**Cacochyma**  
qua rōne mor-  
dicationes fa-  
ciunt.

**Mordicationi-**  
**bus cibi apti**  
qui sint.

**Lenientia per**  
**se, ab iis quæ ex**  
**accidēti id fa-**  
**ciūt quatuor i-**  
**ndiciis distingui**  
**posse.**

**Lenientia inter-**  
**dū a cacochy-**  
**mis uicta, mor-**  
**dacia reddunt**

**C**æterum cacochyma, non temperando, sed id quod mordicat educendo, mordicationes sanant. Ac proinde, donec uacuentur, hominem, mordicare non desinunt: & insuper euacuata, in partibus asperum sensum relinquunt, aliud medicamen desiderant: quod non faciunt quæ boni sunt succi & dulcis, cuiusmodi existit chondrus, lac, atque ptisana, quæ in id genus affectibus & edenda præbemus, et per sedem injicimus, ubi aut melle, aut quopiam eiusmodi, quod infestabat extersimus. Quo tempore opportunus est, & adeps, & ceratum dulce, & oleum dulce. Quatuor itaque indicibus, quibus possis quod per se leniens est distinguere, ab eo quod per accidens, facile cuiusque talium medicamentorum facultatem inuenies. Primum indicium est, an statim mitiget, an non. Secundum, an simul cum lædentibus euacuetur, an non. Tertium an asperitatem quandam in corporibus ipsis relinquat, an non. Quartum, an non ita affectis commodum utileque uideatur. Nam quum nec protinus mordicationem sanat, nec intus leniendo remanet, molestamque asperitatem parti affectæ relinquit, quam, si denuo offeratur, exasperat, argumentum est rodentis, ac mordicantis ipsum esse naturæ: ex accidenti tamen quandoque morsus sanare. At quod continuo mitigat, & nullam excretionem prouocat, sed nec exasperat dum intus manet, imò exasperatorum medela existit, ipsum quidē natura bonum est, uerū interdum à cacochymia quæ ipsum alterat, corrumpiturque, mordax efficitur.



**L** Auanda porrò est nō modò cera, sed pix, resina, & oleum, omniaq; breuiter, quæ cal fieri & fundi quum possint, aquæ misceri nequeunt. Singula igitur modicè calfacta in uas latioris orificij & magnum, cuiq; insit aquæ copia qualitatis expertis, infundito. Dein tundito, et frangito, manibusq; impellè subigito. Postea effusa priori aqua, rursus quod abluitur exal faciens, in aliam æquè synceram aquam inijcito: rursusq; in aliam, et aliam, donec aqua nullam ex eo qualitatem recipiat: quod quidem gustu datur cognoscere. At si quæ sunt lapidosa & dura, ut cadmia & æris squama, & æs ustum, ea cōminuētem exactè in tenuia plurimūm terere in aqua fotana & purissima oportet, idq; sæpius aqua priori effusa, aliaq; denuò instillata, donec nihil in ea innatet, maneatq; aqua prorsus à cōtriti medicaminis qualitate immunis. Sic itaq; abluta omnia quæ elui possunt, expertia mordacitatis redduntur. Ac præter id sanè, oleum etiam candidius reddit. Mitius tamen id uerberari, q̃ alia, debet, ne uidelicet adeò ipsi aquæ misceat, ut ægrè postea secerni possit.

## CAP. XVI.

**O**leum autem quod immaturum non fuerit (hoc enim astringit) nec preparatum sale, nec recens, ac ueluti etiam nū feruens, ad hæc adamussim lotum, id neq; epotum, neq; infusum, excitabit mordicationē. Quòd si guttur ad tussis impetum prouocet, non ideo mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad tussim incitat: non tamen quicquid ad tussim incitat, existit mordax & acre: quū & pingua mouere impetum ad tussim appareant. Sequitur itaq; si quid non cieat ad tussim impetum, id haudquaquē mordax existere: non tamen perinde constiterit, quicquid ad tussim impetum moueat, cōtinuò mordax esse, nec si categoricas, nec si hypotheticas cōficiamus propo-

Lauanda q̃ sint  
medicamenta  
et quomodo.

Lapidosa ab-  
luendi ratio.

Abluta reddi  
mordacitatis  
expertia,  
Oleum ablutū  
candidius reddi

Oleū om̃i ha-  
cinū astringit.

Tussim excita-  
tia non esse ne-  
cessario mor-  
dacia.

Tussim mini-  
me prouocaria  
esse mordacia  
non possunt.



sitiones: quod scilicet ex duabus uniuersalibus affirmatiuis, nihil concludi in secunda figura possit, nec conclusio ex necessitate sit uera.

## CAP. XVII.

**Sternutationis  
usus.**

**Tussis usus.**

**Tussis causæ.**

**Potionis desil-  
lare semper ali-  
quid in pulmo-  
nes per arteriã  
asperam.**

**Succis planta-  
rum oibus du-  
plex excremen-  
tum inesse.**

**Olei partes.**

**N**atura hominibus sternutandi uim indidit, ut per-  
sidio ipsius, quod in naribus infesta molestaque sunt,  
propulsarent: tussendi uero, ut quæ in gutture. Contin-  
git autem hæc affectio dupliciter: aut resiccata, exaspe-  
rata uel, quæ in arteria est membrana: aut à delato cor-  
pore, inæquali reddita. Hinc siue panis micula, aut alte-  
rius cuiuspiam edulij, nobis inuitis, in spiritus meatum  
decidat, tussire adigimur: seu si bibentibus affatim ip-  
sius potus quippiam eò influat, similiter ad tussim cõ-  
pellimur. Percolatur tamen per asperam arteriam per-  
petuò in pulmonem ipsius potus tam exile quippiam,  
ut protinus ab instrumentis raptum, perfacile quocumque  
distribuatur, nec animal ad tussim irriter. At ubi uel id  
ipsum plusculum, uel aliud quodpiam seu liquidum, seu  
solidum corpus, per asperam deferret arteriam, iam in-  
de tussire est necesse, donec à spiritus uehementia mo-  
lestum id excutiat. Mordacia itaque gutturis exaspe-  
ratione, oleosa uero & pingua, illitu inæqualitatem, &  
ad tussim impetum faciunt. Spiritus siquidem, in emi-  
nentia quadam impingens, efficit inæqualem concus-  
sionem in gutture, ad tussimque animal prouocat. Cete-  
rum non eo inficias, ex oleis esse mordicantia pleraque  
qualia tum salsa, tum recentia uidentur: atque hæc quidem  
non propria essentia, sed quod omnibus plantarum succis  
geminum excrementum insit, alterum crassius, tenuius  
alterum. Quæ ambo quum reperiuntur etiam in oleo,  
ad concoctionem & discretionem, tempus sanè postu-  
lant. Procedere uero tempore, quod crassum quidem  
est, nuncupatum amurca, subsidit: quod uero tenuius &  
ueluti aquosius & ipsum compositum quodammodo  
est, ex acri scilicet essentia, & tenui serosa.



**C**æterum serosum istud rufi coloris est, à crasso il-  
lo scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum, tū  
minimè mordax, tum candidū sua natura existit. Qua-  
propter ubi tenue hoc excrementū secretum fuerit, can-  
didius & dulcius reddetur. Separant autem ipsum, aut  
insolantes oleū, conchisq; aut tollentes in altum; aut uas-  
culis in quibus est oleum, calidos subijcientes cineres:  
aut oliuatum nucleos, aut frumentum circa ipsa appo-  
nentes: aut deniq; medicamenta in uasa ipsa injciētes.  
In summa, quod aqueum est, consumunt: reliquum ue-  
rò reponunt. Tale igitur oleum, si salis expers, lotumq;  
sit, medicamentorum omnium minimè mordax erit, ma-  
ximeq; humectat et mollit, si nec summè frigidum, nec  
calidum applicetur. Porro cui injectus sal est, nonnulla  
quoq; necessariò mordacitas inest. Frictio itaque ex  
oleo, magis q̃ sicca, lassitudinem tollit: emollitq; cor-  
pora, cohibens occludensq; quicquid è nobis foras ef-  
fluere est natum: haud quāq; digerens & exiccans.

C A P. X I X.

**Q**uæ autē ex oleo sit frictio, prorsus æqualis exi-  
stit: inæqualis uerò quæ sicca. Cutim siquidem  
per siccam frictionem manus coadducit, ac ueluti du-  
plant, uiolenterq; ac præter naturam complicant. De-  
inde ubi non amplius prior ueluti duplicatio labentes  
sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atq; ad con-  
tinuum reuellitur: manus autem semel ac uno impetu  
in alteram cutis partem transeunt, inferiorē transgredi-  
ipsum duplationis partem: ac proinde inæqualem, du-  
ram, & laboriosam talem frictionem sentimus. Quod  
si læuis lubricaq; exactè sit cutis, nec duplicari facilè  
poterit, nec inæquabiliter admittere ipsos manuum de-  
cursus. Quare externo aliquo medicamēto indiget, qd  
rugas impleat, manibusq; lubricitatem conciliet: quas  
ad res oleo nihil aptius inuenias.

Oleum repur-  
gandi ratio.

Olei dulcis na-  
tura & vires.  
Frictionis ex  
oleo usus.

Frictionem ex  
oleo quidē q̃-  
lem, sicca uero  
inæqualē.

Oleū frictio-  
nis accom-  
datissimū esse.



Oleum experi-  
undum esse in  
hominibus.

**Q**Uum autem liceat in hominibus de ipso oleo pe-  
riculum facere, nescio equidē qua nam occasione  
ducti complures ueteres, ad diuersa alia uertuntur, ut  
illius facultates explorent.

## CAP. XXI.

Experiendi rō-  
nes diuersæ.

Medicamenta  
q̄ experiiri vo-  
lumus, debent  
eē aliēq̄ qua-  
litaris exp̄tia.

Oleū calfacit  
quidē, sed non  
euidenter ad-  
modum.

Oleū quibus  
sit noxiū flu-  
xionibus.

Oleum videt̄  
calorem parē  
eis quibus ap-  
plicat̄ accēdet̄

**A**T recta experiundi ratio, in primis quidē ea est,  
quæ in corporibus sit temperatis: dein ea quæ in  
intemperatis: mox, ut sæpenumero antea monuimus,  
quæ in simplicissimis sit, hoc est calidis, frigidis, humi-  
dis, atq; siccis affectibus: distinguētibz semper nobis  
id quod per se sit, ab eo quod ex accidenti. Curandum  
etiam est, ut oleum de quo experimentum sumit̄, alie-  
næ qualitatis sit expers: id quod est in omni medica-  
mento obseruandum. Si igitur ita oleum adhibeas, ma-  
nifestē comperies, refrigerarē ne, an sit calfacere natū.  
Atq; hæc quidem summa est rationis. At opus ipsum  
quod perficitur, experientia cōmonstrat. Nam qui ar-  
dore tenentur, tantum abest, ut à calore liberentur, ut  
etiam magis & æstuent, & processu tēporis calidiores  
euadant. At algētibus, ex olei inūctione, perspicua nul-  
la aut noxa, aut utilitas conspicietur. Ex quo liquet, cal-  
facere quidem ipsum, non tamen admodum, nec eui-  
denter, ut resina, pix, & bitumen, quæ uidelicet sponte  
fluunt. Nam quæ sicca sunt, ut eis inūgi non possumus,  
sic nec simplicia, nec sponte nata medicamēta existūt.  
Cæterū in ardoribus, si salis sit expers oleū, perfun-  
daturq; frigidum, nonnullum sanē solatium adfert. In  
erysipelatis autem, sicuti in omnibus quæ à pura bile  
sunt fluxionibus, quantūuis sit frigidum, uel maximē  
legdere est natum. Quæ uerò ex sanguine sunt misto cū  
bile, eas fluxiones minus aliquātulo affligit: uideturq;  
calorem parem eis quibus applicatur, accendere: quā-  
do quidem modicē calida, calfacit mediocriter: immo-  
dicē autem illa quæ magno ardore æstuant.



**I**gitur medicamenta omnia quæ facultate dicuntur calida, caloris sui à nobis accipientia principium, partim similiter nos recalfaciunt; partim ualētius. Atq; ex ijs sanè quæ nos æqualiter recalfaciunt, oleum esse mihi uidetur: ac proinde nec conuulsiones, nec tremores, nec sensum tum difficilem, tum deperditum magnopere aut iuuare, aut lædere potest: nisi ascititiū sibi compararit calorem. Tunc siquidem plurimū prōderit. Vnde meritō ueluti materia quædam cæterorū medicaminum fuerit. Nam si frigida illi commisceas, frigidum efficietur qđ mistum erit: si uero calida calidū. Quippe quod ex media tēperie est, utrisq; summis inseruit. Porro non calfacere oleum hac ratione quis dixerit, qđ caliditatem quam reperit, non augere, sed conseruare uideatur.

Medicamenta facultate calida quomō nos calfaciant.

Oleū est ueluti materia reliquorū medicaminum. Medium tēperie, utrisq; extremis inseruit.

## CAP. XXIII.

**C**alfacere itaq; nos dicuntur, & quæ energia, siue actu, sunt calida, ut ignis: & etiam quæ potestate. Hæc tamen partim alimenta sunt: partim medicamenta: partim tegumenta. Sed & calidum actu est, quod simpliciter calidum est ut ignis: & quod per exuperantiam, ut animal: & quod ad sui generis symmetrum comparatur, & quod ad quiduis obuium. At quod potestate dicitur, primo quidem distinguit ab eo, quod ex accidenti est. Deinde totidē habet significationū differentias, quot actu calidum. Etenim quum sit ueluti quidam apra materia ei quod est actu calidum, partim ad ea quæ absolutē calida nuncupantur, partim ad ea quæ per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis, aut speciei deniq; & ad obuium quoduis collatū, ppria fuerit materia. Quocirca quū ea calida quæ ad hominem referunt expendimus, ut alia omnino omitantur, æquum existimamus.

Calfacere nos quæ dicantur. Calidum facultate, & actu, utriusq; quotupliciter accipiat.

## CAP. XXIII.



Oleum multi-  
fariam dicitur  
nos calfacere.

Vestimenta a  
nobis calfacta  
nos recalfaciunt  
Olei cū vesti-  
mentis collatio.

Oleū et vestes  
nō pprie nos  
calfaciunt, sed  
obfistentia fri-  
gori.

Similia corpo-  
ra a se mutuo  
nullā mutatio-  
nem accipiunt.

Medicamenta  
quemodo nos  
calfaciant.

Oleum corpo-  
ri illitum, calo-  
ris & sudoris  
effluxū, phibet  
Oleo ungerdi  
qui sint, & qui  
minime.

**A**ccidit autem fortassis oleo, ut tanquam alimen-  
tum nos excalfaciat, ubi intrò in corpus assumi-  
tur: quum probatis medicis quibusdam uideatur, sicut  
ex cibis, ita ex oleo fieri corpori appositionem. Accidit  
etiam illi, ut tanquam medicamen, sit mediū inter nos  
calfacientia et refrigerantia: tum ut ipsum nos ueluti te-  
gumentum excalfaciat. Nam quemadmodū uestimen-  
ta à nobis excalfacta, nos excalfacere cōsueuerunt, ita  
& oleum. Et quemadmodum illa excalfaciente corpo-  
re calidiora minimè euadunt, ita quoq; neq; oleum.  
Mediæ siquidem aeris nos ambientis temperaturæ si-  
milis est tum qui à uestimentis, tum qui ab oleo profi-  
ciscitur calor. Quam ob rem tum uestimēta ipsa, tum  
oleum, calfacere nos non propriè, sed per abusum di-  
cuntur, quòd frigori obfistant. Quemadmodū si duos  
æquè temperatos adolescentes, qui contingantur mu-  
tuò, sese dixerimus calfacere, tametsi haudquaquē excal-  
faciant, sed duntaxat arceant frigus ambientis. Quæ  
enim similia undequaq; corpora sunt, à se mutuò nul-  
lam mutationem accipiunt. Respondet itaq; calidiori  
aeri pyrethrū, & piper: moderato autem oleum & pin-  
guitudo: actu tamen aeres sunt calidi: potētia uerò, me-  
dicamenta. Siquidem à nobis accipientia excalfactio-  
nis principium, partim nos recalfacere sunt nata: par-  
tim plus: partim minus. Oleum igit ex genere eorum,  
quæ æquè recalfaciunt nos, existēs, duplici ratione ut  
excalfacere uideatur euenit, q̄ nimirum instar uestimē-  
ti, aut munimenti illinatur: & q̄ meatus infarciat, pro-  
hibeatq; foras effluere magnam uaporosi intus calo-  
ris partem. Hac ratione, quos largius sudare uolumus,  
non protinus ijs ab initio admoemus oleum. Verūm  
eos quidem qui morbo laborarūt, ubi sudare incepe-  
rint, tum excalfacto pfundimus: eos uerò qui etiam nū  
laborant, ubi abundè iam satis sudauerint. Porro sanis



quavis occasione exhaustis, inungi et ante sudorem p-  
mittimus. Verum quibus cruditas inest, aut corpus la-  
borat plethora, his neq; in balneo inungi cōcedimus.

C A P. XXV.

**Q**uemadmodum inter calfacientia & refrigeran-  
tia, sic oleum mihi inter humectantia nos, & sic-  
cantia mediū esse uidetur. Atq; humectat quidē aqua:  
exiccat uerò tum laurinum, tum cedrinum oleum. At  
expers qualitatis alienæ oleum, talem seruat nostram  
temperiem, qualem scilicet accepit: uaporosas omnes  
expirationes uel maximè prohibens. Quòd si plusscu-  
lum membra oleo frices, comparabis ascititium calo-  
rem: qua ratione lassos nō parum iuuabis, q̃ uidelicet  
in minutos corporis meatus pingue ingrediatur, ac sic  
quæ durata sunt molliat: & q̃ acrem & subtilem hu-  
miditatem, quæ latebat sub cute, per halitum digerat.  
Nam quum in lassitudine similes quidem animalis  
partes siccantur, spatiola autē uacua, tenui, acri, & mor-  
dace humore impleantur, ea certè corpora remedijs in-  
digent q̃ & siccitatē irrigent, & humorem acrem discu-  
riāt. Cui negotio aqua per se sufficeret, si inherere pos-  
set corporibus. Quia uerò facilè diffluit, ob id nimirū  
illi cōmodissimè oleum miscetur: maxime q̃; ex utroq;  
frictio auxiliatur siccis equalibusq; corporibus: quum  
ipsius olei ratione diutius aqua adhærescat. Quare hu-  
meccantium et exiccantium, sicuti calfacientium atq;  
refrigerantium, oleū ueluti materia existit. Nam si exic-  
canti cōmisceas, totum effeceris exiccans: sin humectā-  
ti, & ipsum humectās, ac plerunq; magis q̃ anteā red-  
dideris: ut in aquæ exēplo docuimus. Quum itaq; om-  
nibus quæ sibi commiscantur subseruiat oleum, recta  
ratione ueluti omnium materia existit: nam licet eorū  
necessariò propriam actionē retundat, ac minuat, non  
tamē utilitatem: imò est ubi eā quoq; adaugeat. Quip-  
pè contusa cum oleo aqua, magis auxilio est lassitudini

Oleū esse me-  
diū inter hu-  
meccantia & sic-  
cantia.

Oleū talē ser-  
uat nostrā tem-  
periem, qualē  
illam accepit.

Lassitudini di-  
scutiendæ qua-  
lia requirātur  
remedia.

Frictio ex hy-  
drelæo cur sic-  
cis corporibus  
auxiliatur.

Oleū est alio-  
rū medicamen-  
torū materia.



bus, q̄ si esset sola: non sanè quod intendatur uiribus,  
sed q̄ ijs quibus opus est, diutius inhæreat.

## C A P. XXVI.

**Q**Uod autem nisi mediam habeat temperiem id  
quod ea quæ primariò affectibus auxiliantur,  
ueluti deuinciet, sepe numero ipsorū repugnabit actio-  
nibus, generatim quidem ex ipsa rerum omnium na-  
tura: speciatim autem, ex medicamentorum historia  
licet addiscere. Etenim generatim, quoniam id quod  
miscetur, si in contrarium retrahat, admisti sibi facul-  
tatem medicamenti uincere interiri poterit, & in alte-  
ram planè speciem id quod ex ambobus miscetur,  
transferre. At speciatim, sic etiam id ipsum cogno-  
sces. Nam si excalfacientium resiccantiumq; medica-  
mentorum cuipiam aquam miscere uelis, non modò  
nihil eorum quæ agere nata est, fieri uidebis, sed om-  
nino obscuratam esse, perindè ac si admista non esset.  
Omnino ergò constat mediam obtinere temperatu-  
ram debere, quod utrisq; extremis tanquam materia  
inseruiet. Quem in ordinem si oleum statuas, utiq; ni-  
hil peccaueris.

Mediū esse de-  
bere, q̄ utrisq;  
extremis ē  
futurū materia

## C A P. XXVII.

**Q**Uum igitur oleum ueluti media quædam mate-  
ria sit medicaminum calfacientium atq; refrige-  
rantium, constetq; tantūm ex oleo & rosis rosaceum  
(quod saltem exactum & simplex est) utiq; & ipsum  
talis temperaturæ fuerit, qualis rosarum succus exi-  
stit. Quare illos qui adustione tentantur experieris ab  
eo refrigerari, protinusq; aliquam utilitatem perci-  
pere: qui uerò refrigerati sunt, omnes lædi. Non  
tamen ualida in ipso apparebit refrigera-  
tio, sed quæ in primo refrigerantium  
gradu collocari mereatur.

Rosaceum ex  
oleo et rosis cō-  
ficietur.

Rosacei tēpe-  
ries est qualis  
succo rosarum  
inest.

Rosaceum in  
primo gradu  
refrigerat.



31

# G A L E N I P E R G A M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamentorum facultatibus. Lib. III.

C A P. I.



**C**ORPORVM unumquodq; aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum, et dicitur & apparet, interim quidē ex sua natura, hoc est primario, & per se: interim autem aduentitia qualitate assumpta, quod est per accidens. Porro eorum quæ propria sua natura calida aut frigida, aut humida, aut sicca dicuntur, quædā actu siue energie talia existunt: quædam potentia. Sed & eorum quæ actu dicuntur, aliud quidem absolutè est calidum, frigidum, humidum, siccum, ueluti elementa: aliud excessu, ut homo, equus: aliud ad symmetrū, seu generis sui, seu speciei: ut leo cum homine cōparatus, homo autem etate florens cum puero: aliud ad quiduis obuium, ut Dion ad Theonem. Quin & corpora quæ potentia talia aut talia dicuntur, unumquodq; ut ad id quod est actu relatū dici necessariō monuimus: id quidem quod facili accēditur, ad id quod actu est absolutè calidum: hoc uerò quod alia calfacit, ad id quod per exuperantiam.

Calidum, frigidum, humidum, siccum, quorum modis unumquodque eorum dicat.

C A P. II.

**I**N eo igitur corpore periculum est sumendum, ad quod unumquodq; tale & est & dicitur: à cæteris autem recedendum. Elementa namq; huiusce tractationis, in primarum quatuor qualitatum, uidelicet caliditatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis cognitione consistunt. Porro alimentum à medicamento differt, quod hoc quidem alteret in qualitate: illud autem substantiæ corporis assimiletur.

Alimentum a medicamento quo differat.



Alterationes  
sunt duplices.

Medicamento-  
rum vires sub  
quibus continen-  
tur alterationi-  
bus.

Qualitates spe-  
cificæ quæ sunt,  
& cur sic di-  
cantur.

**V**erum quum duplices sint in genere alteratio-  
nes, aliæ specificæ, quæ propriè sanè & primariò  
dicuntur alterationes: aliæ uerò quæ contundunt & cō-  
trahunt corporis nostri particulas, quas utiq; per abu-  
sionem potius quàm propriè alterationes cognominant: in  
primo sanè genere, contineri vires medicamentorum  
censemus. Nec enim quicquid mutari ex specie in speciem  
possit citrà exsiccationem, refrigerationem, humectationem,  
& resiccationem: etiam si constringatur, con-  
tundatur, conuulneretur. Dico autem mutari ex specie  
in speciem, ueluti quum ex pane fit sanguis: aut ex hoc  
caro. Itaque non ab alio quàm à calore, frigore, humiditate,  
siccitateque specificas alterationes singuli corporis  
affectus accipiunt. Qua ratione quatuor ex qualitates  
elementares, primæ & specificæ nominantur. Earum  
igitur, quam unumquodque medicamentum in mistu-  
ra pollentem sortiatur, inuestigamus.

## CAP. IIII.

**Q**uum autem totius naturæ respectu bifariam  
unumquodque dicatur calidum, frigidum, humi-  
dum, atque siccum, partim absolutè, ut singula elemen-  
torum: partim per exuperantiam, ut homo equus, &  
bos, minimè profectò nos Medici inuestigamus, an in  
aqua marina humidi simpliciter plus sit quàm sicci (id  
enim clarè cōspicimus) sed an corpus humanū facul-  
tate sua equaliter resiccare ualeat. Cuius sanè rei sume-  
mus periculum, si eam admoueamus corpori, per fo-  
menta aut emplastra: id quod ex accidenti, ab eo quod  
propria medicamenti ui proficiscitur, distinguentes.

## CAP. V.

**C**æterum quod per exuperantiam dicitur, id Phi-  
losophi accipiunt dupliciter: aut enim secundum  
substantiæ molem: aut secundum qualitatum effectū.  
Atque hi quidem calidum uincere in omnibus plantis,  
pronunciant



pronunciār, ob incrementa earū & germinationes id iudi-  
cātes. Quibus sanè, quū de tota natura scrutētur, rectē  
hec & similia alia dicunt; Medicis autē nō rectē. Siqui-  
dem nulla planta, q̄ planta sit, calida dici debet, sed q̄  
hominem calfaciat. Sic enim & salamandram, & cicu-  
tam, ad hominē frigida esse dicemus: qua ratione sunt  
alia omnia etiam diiudicanda. Nam cicuta non modō  
sturnos nō refrigerat, et enecat, uti nos, sed alit quoq̄,  
ob idq̄ nimirū etiam et calfacit. Insunt quippē omni-  
bus rebus amicitiae quædam, & qualitatum pugnan-  
tiæ. Præterea quod familiare est, promptissimè assimi-  
latur: quod uerō contrarium, ad internitionem ducit,  
tum animalia, tum plantas. Cæterū familiaritates il-  
læ, à totius substantiæ proprietate exoriuntur. Porro  
quum acetum & rosaceum nos primariō & per se re-  
frigerent, nemo ea calida dixerit.

## CAP. VI.

**Q**uod applicitum nobis uidetur actu esse calidū  
eodem gradu quo nos, aut ex cōtactu similiter  
calidum redditur, id ex media est temperie, nobiscum  
collatum: ac per se etiam calidum secundum exuperan-  
tiam, quemadmodum nos. At si quid nōdum adeō ca-  
lidum est sicut nos, nec tale admodum redditur, id tem-  
perie humana frigidius est, quantumcunq̄ in eo cali-  
ditas exuperet: ac proindē admotum, nostrum calo-  
rem minuet.

## CAP. VII.

**E**A autem est cōmunis alterabilium corporum om-  
nium natura, uti in se agant & patiantur admota:  
quodq̄ minus est calidū, à magis calido calidius red-  
datur: quod uerō magis calidum, à minus calido remit-  
tatur. Nā id uel ex ipso tactu clarissimè discas. Etenim  
eadem subindē illi tum calida, tum frigida esse uiden-  
tur: calidiori quidem facto, frigida: frigidiori uerō cali-  
da. Quæ sanè causa est, ut in balneis quidem frigida ui-

Tomus IIII.

Cccc

Salamādra est  
frigida respe-  
ctu hominis.  
Cicuta sturnos  
alit & calfacit  
Cōsensus quos-  
dam & discre-  
pantias quali-  
tatū inesse unī-  
uersis rebus.  
Familiaritates  
unde exoriant

Media tēperie  
pōitū, quomō  
cognōscatur.

Alterabilium  
omnium natu-  
ra, quæ sit.



Urina cur ap-  
paret nobis fri-  
gida in balneo.  
Putealis aqua  
cur apparet ri-  
gentibus frigi-  
da.

Tactū debere  
esse ab oī alie  
na qualitate i-  
munē, si sensibi-  
lia sit recte iu-  
dicaturus.

Medicamento-  
rum facultates  
in quē modum  
examinantur a  
medicis.

Rosas rosarū &  
succū, euidenter  
refrigerare.

Oleū esse me-  
dium temperie.  
Rosaceum eē  
ex primo refri-  
geratiū ordine

Rosarū succus  
tepidā quandā  
caliditatē pos-

deatur nobis urina, foris uerò calida: quum tamē sem-  
per ipsa reddatur tepida. Similiter dum rigemus frigo-  
re, aquam ex puteo profundissimo hauſtam, calidā iu-  
dicamus: quæ eadē nobis in balneo, aut balneū egref-  
ſis, apparet frigida. Itaq; tactum calidi frigidiq; digno-  
ſcendi normam ponentes, atq; eius diſpoſitioni cuius  
iudiciū omne tribuentes, meritò ſanè crebro fallimur:  
ut qui quod haud ex ſe eſt frigidum, id frigidum eſſe di-  
camus: quod uerò calidum ex ſe non eſt, id calidū pro-  
nunciemus. Abſolutè autem et urina, et aqua putealis,  
qualis ad nos optimè temperatos, atq; ab aliena qua-  
litate immunes uidetur, talis proſectò & eſt, & dici  
etiam poteſt.

## C A P. VIII.

**Q**Uum igitur nec an abſolutè unumquodq; ca-  
lidum ſit, ut ignis: nec an per exuperantiam, ut  
ſanguis: nec deniq; an cum ſymmetro ſui generis aut  
ſpeciei collatum, cōſyderare nobis propoſitum ſit: ſed  
an ad hominem ſit tale uel tale: nec ruruſum ad hūc, tan-  
quā id quod ad aliquid aliud comparatur: ſed an ad-  
motum ipſi, eam partem quam tetigerit, reddat aut ca-  
lidiorem, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut ſiccio-  
rem: crtē in experientia omnis iudicandi et dignoſcen-  
di conſiſtet ratio: per quam nimirū docemur, & roſas  
exēpli gratia, & roſarum ſuccū euidenter refrigerare.

## C A P.

## IX.

**S**Iue enim in ijs qui inculcata ſanitate fruuntur, ſiue  
in ijs qui laborant ſimpliciſſimo affectu, uidebitur  
tibi planè oleum quidem in media temperie exiſtere:  
quod uerò componit ex ipſo roſaceum, ex primo eſſe  
ordine refrigerantium. Siquidem roſarum ſuccus frigi-  
dioris naturæ eſt q̃ oleum: ſed non ita multò, quum te-  
pidam quandam in ſe caliditatem poſſideat. Eiuſdem  
cum illo ordinis eſt, quod ad calorem quidem tepidū  
attinet, linospermon: ab eo tamen haud minimū tenui-



tate relinquitur. Nam rosarum succus est exquisitè tenuis essentia; pinde quàm celerrimè arefcit, odores quàm aliorum unguentorum exoluit. Est & chamæmelum tenuitate quidè, rosæ per simile: calore uerò, ad olei uires magis accedens, homini tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudini, ut si quid aliud, in primis confert: dolores quàm; sedat. Præterea tēsa remittit & laxat; mediocriter dura emollit, constipata quàm; rarefacit. Ad hæc febres quæ citra uisceris inflammationem infestant, concoctas discutit, ac dissoluit; & potissimum quæ ex cutis dēfite & humoribus biliosis proueniunt: ob id quàm; Soli à sapientissimis Ægyptiorum est cōsecratum. Est autem hypochondrijs gratissimum. Quibus etiam lini semen est gratum: minus tamen quàm chamæmelum, quum & minus calidum sit, & essentiæ crassæ. Cæterum ad ascensus, augmenta quàm; inflammationum, chamæmelo rosaceum præfertur: quum hæc tepida caliditate cum leui astrictione indigeāt. In principio siquidem, quæ refrigerant, atque astringunt; per incrementa uerò tepida, & mediocriter constringentia: at in uigore ac statu inflammationum, quæcunque tum moderatè calfacere, tum laxare possunt, magis cōpetūt: sicuti in declinationibus, quæ ualenter calfacere quàm; & discutere.

## C A P. X.

Cæterum quæ mediæ tēperaturæ sunt, & quæ utrāque in partem declinant leuiter, interim calfacere uidebuntur, rursus quàm; refrigerare: interim talia seruare corpora, qualia in principio acceperūt. Nec mirum sanè, quum aqua tepida, urina quàm; in balneis quidem frigidæ: argentibus uero, calidæ appareant. At rosaceum, oleo quidem, minus: succo autem rosarum, magis existens calidum, refrigerat sanè exustos, id quàm; suæ caliditatis tepore: argentes uerò, paulatim etiam excalfacit: qui effectus etiam caloris est tepidi.

## C A P. XI.

C c c c ij

fidet, odoresque aliorum unguentorum exoluit.

Chamæmeli facultates inuulgnes.

Chamæmelum Soli ab Ægyptiis est consecratum. Linospermon.

Inflammationes qualia medicamenta desyderent.

Urina uidet in balneo frigida

Rosaceum refrigerat & calfacit diuersa corpora.



Reducenda ad  
tēperie, nō me-  
diocritia, sed cō-  
traria, & quæ  
æque a medio  
recedāt, p̄fidia  
postulant.

Eucraton.

**Q**Uocirca si aut refrigerantibus medicamentis, aut calfacientibus rosaceum indideris, sicuti nec magnoperè obfueris, ita nec admodū profueris. Nam caliditas tepida, nec est sufficiens quæ refrigerata sunt lædere, nec eadem curare potens. Siquidem quod curari debet, tanquam quod ab immoderatione ad symmetriam reducitur, non id quod probè tēperatum sit postulat, uerū id quod contrariam habet temperaturā, & æquè recedētem à media. Etenim si quod curari desiderat, multò frigidius sit, necessariò oportet quod ipsum curabit, multò etiam calidius existat: sin paulò frigidius, paulò etiam quod curabit calidius erit: ac de ceteris intēperaturis, pari iudicio. Porro si exquisita utamur nominum appellatione, quod medium in singulis est, id eucratum, siue temperatum dicemus: quod autē ab huius excedit modo, si ad calidius quidē, tum plus, tum minus calidum: sin ad frigidius, plus minusq; frigidum: nec de alijs alia ratione. Quandoquidem igitur corpora humana, tum ijs quas ab ortu nacta sunt temperaturis, tum ijs quas ab ætate postea acquirunt, tum ijs quæ ex uitæ consuetudine adueniunt, plurimū inter se differunt, ab ijsdem cā medicamentis uariè alterentur necesse est.

## C A P. XII.

Tēperatū me-  
dicamen quod  
dici debeat.  
Gradus viriū  
medicamentorū  
quomō inueni  
endi sunt.

**M**edium ergo horum mihi quempiam intelligas, qui & natura sit temperatus, & moribus & consuetudine conuenienti, hanc ipsam eucrasiam tueatur. Deinde hos tres optimæ temperaturæ scopos concipiens animo, secundum corpus illius, ueluti secundum regulam quandam, uires omnium medicamentorum explores. Quodq; similem illius temperiei caliditatem accedit, temperatum uocetur, etiā si uel maximè excalfacere senem refrigeratum uideatur. Quod uerò calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, illud quidem calidum, hoc uerò uocetur frigidum. Esto autem ipsorum



excessuū ordo, ad frigidum quidem, primus, cuius esse dicas rosaceum: secundus, cuius sit ipsa rosa: post hūc tertius & quartus, quo ad sermone ad frigidissima p-  
tigerimus: nempè cicutam, succum papaueris, mādra-  
goram, hyoscyamū. Rursum ad calidum, anethum q-  
dem, & fœnum græcum, prima; secūda uerò deinceps,  
tertiaq; & quarta, donec ad exurentia peruentū sit. Ad  
eundem modū in medicamētis humectantibus & exic-  
cantibus est ineundum iudicium.

Rosam esse fri-  
gidam in secū-  
do excessu.

## C A P. XIII.

**V** Erūm omnia propemodum medicamenta, licet  
sensu simplicia appareant, natura tamen compo-  
sita sunt, diuersissimasq; in se facultates possidet, excer-  
nendi, sistendi, incrassandi, extenuandi, atq; alias id ge-  
nus uniuersas oppositiones. Nec mirum id esse debet,  
quum uni eidemq; medicamento, uim calfaciēdi & re-  
frigerandi esse appareat: aut exiccandi, humectandiq;.  
Quæ primæ efficacissimæ uirtutes nisi hoc pacto com-  
plicarentur, haud sanè quæ ex illis sequuntur, similiter  
complicatæ forent. At si nos ipsi rhu succum melli mi-  
sceamus, quod ex ambobus conficitur, astringendi si-  
mul & abstergerendi uim possidet: sicuti & cohibendi  
uentris, atq; laxandi. In lacte autem duas esse faculta-  
tes, nempè sistendi uentrem atq; euacuandi, non item  
concedimus: tametsi caseus quidem secretus, uentrem  
sistat: serum autem resoluat.

Medicamenta  
ppemodū oīa  
esse cōposita,  
cōtrariasq; in  
se facultates  
fortiri.

Caseus sistit  
ventrem.  
Sera aluum  
laxat.

## C A P. XIII.

**Q**uod uerò et brassica duas easq; cōtrarias in se  
se facultates obtineat, neq; id quidē promptē  
concedimus. Nam tametsi succum eius planè aut solū,  
aut ex melle purgare cernamus, attamen quoniā quod  
reliquum est, edere minimè possumus, astrictoriū esse  
id diffidimus. Quāq; si bis ter uel quater elixam, ip-  
sam brassicam edamus, cōperiemus sanè, succum eius  
qui in aqua fuit relictus, purgare: ipsam uerò uentrem

Brassicæ bis  
ter uel quater  
elixam, ipsam  
autē  
supprimere.

C c c c iij



Gallorum veterū  
ius ventrē sub  
ducit, caro au-  
tem cohibet.

Aloe lota aut  
nihil aut parū  
purgat.

astringere. Eadē est ratio in beta, lente, atq; in ijs quæ testa pro cute integuntur: ac breuiter in omnibus ferme illis, quibus sapor aut acris, aut falsus, aut nitrosus inest. Gallorum etiam ueterum ius, uētre subducit, tametsi caro eundem sistere possit. In æris autem squama, sicuti duplex qualitas, ita gemina quoq; facultas inest; nam & astringit & mordicat: cæterū si intra corpus sumatur, purgat quidem uētre, uerū non cohibet. Quippè uincitur eius astringendi facultas, ab acri purgatoriaq; potentia, quemadmodum si rhu scum scāmonix cōmisceas. Sic enim cum mali cydonij carne, aut cum alio quopiam eorum quæ & astringentia et grata uentriculo sint, non pauca purgantium medicamentorum dum mista exhibentur, gustum quidem fallunt: at effectu solo quid ualeāt cōmonstrant. Persæpe siquidem lingua à materiæ uicta est copia: at actio, pro facultatis robore, uiribusq; perficitur. Itaq; quum substantia exigua quidem, sed ualidis prædita uiribus, mista alteri substantiæ plurimæ, eidemq; imbecillæ, corpus ingreditur, gustum quidem fallit: attamen effectū, q̄ illa, efficaciorē exhibet. Porrò si ab aloe quod purgat, ab eo quod est astringēs, eluatur (id quod ueri potest, per exactam lotionem) tunc certē aut debiliter, aut planē nihil purgabit: id quod usu etiā uenit æris squammæ, æriq; uiso. Iam uerò ipsius quoq; qualitatis medicaminosus sapor, primo statim gustu, facultatis misionem demonstrat. Nam si unica semper qualitas, unicuiq; gustu astringentium medicamento inesset, haud sanē inter ipsa alia esui apta, alia medicaminosa existerent: sed tantū intensiōe aut remissionē astrictiōis differrent. At non ita res habet: quū uideamus æris squāmam malo cydonio astringētem minus, gustu tamē eo longē insuauiorē existerē: quā gustus absurditatem proficisci: à uehementia astrictiōnis, dicere id quidē non possumus. Si itaq; ut astrictio,



ita etiam astringens unum perpetuo esset, sane unum quoque perenniter eius esset opus. Verum quum praeter astringentem insuper alias qualitates, neque paucas, sortitur, semper quidem omnibus illis agere: sed evidentius alias per aliam, nempe uincit: idque ut ad corporis cui admotum est affectionem. Astringens igitur hac ratione, non est ei quod purgat contrarium: quamquam si quis illa esse contraria statuatur, nihil inde absurdum sequetur. Etenim in rosae succo, aliud quidem grauissimum est, amurcae & faeci proportionale; aliud leuissimum, & ipsum proportionem respondens flori in quoque succo supernatanti: aliud tertium, quale est quod in musto feruet: ad haec quartum, ipsum uidelicet purissimum, ac sincerissimum, cuius haec tria excrementa existunt. Euenit autem alios quidem succos aut acescere, aut corruptos putrescere: sola uero, oleum, mel, & uinum, in longum tempus durare. Quare nec per ebullitionem, nec per secretionem in alijs succis, has excrementorum differentias inuenire perspicuum licet: uerum protinus ab initio coctione quadam illis est opus, aut saltem ali cuius perdurantis succi mistura. Nam sic rosae succum melli miscetes, aut totas rosas ei immergentes, reponimus. Quum autem rosa non astringens modo, sed etiam dulcis atque amara gustanti appareat, satis aperte ostendit, se habere illorum succorum quatuor miscellam. Quin etiam uel ex hoc tantum, quod non extreme astringat, aliorum quoque saporum misturam intelligere in ea possemus. Quippe si solus sapor austerus illi insit, summus itidem fuerit: quo modo si sola corpori cuius caliditas summa inesset, id ignis utique foret: at si non summus, sequitur quod neque etiam solus. In uniuersum enim contrariorum mistura, summitates ipsas frangunt.

CAP. XV.

**A** Tque in similaribus quidem corporibus calor, frigiditas, siccitas, & humiditas, particulares differ-

Cccc iiij

Astringens non esse contrarium purganti.

Rosae partes quatuor ternae.

Succos alios acescere, aut co putrescere, sola autem oleum, mel et uinum in longum tempus durare.

Rosarum succum afferendi ratio.

Rosae succum seruandi ratio.

Summitates fragunt contrariorae mixturae.

Similium inter se ac dissimilium differentiae unde nascantur



Lingua secundum diuersas partes a diuersis saporibus qualitatibus afficitur.

Lipyrice feb.  
Hepialis feb.

Saporibus qualitates afficiunt reliquas etiam partes, ut lingua, licet non perinde ab iis percipiuntur.  
Lingua cum sensum habet exquisitum.

rentias efficiunt: in dissimilaribus uero acrimoniis, siccitates, austeritates, acerbitates, dulcedines, amaritudines, falsedines, aquositates, & pinguitudines. Quare unumquodque corporum similiarium, hoc est, quæ non ex diuersis substantiis constant, in ipsis partibus non multas, sed unam ex his qualitatem obtinet: quod uero totum est dissimulare, complures. Quarum hæ quidem astringunt: hæ laxant: alia aliam facultatem ostendunt, sic ut omnes quidem lingua partibus diuersis, per contactus ratione, afficiant: affectio tamen ipsa, ex eo quod primo affectum est, in totam eam quam celerrime diffundatur. Cuius simile in tranquillis aquis uidere licet. Nam si in duas eius partes duos conieceris lapides uno eodemque tempore, non sane duos efficient circulos, qui mutuò per sese ferent, contrariosque cernes in quauis ipsius aquæ particula motus. Quod si unum pedem in calidam, alterum uero in frigidam simul demittas, haud dissimile habebis etiam exemplum. Quippe in totum corpus utriusque affectionis motus peruadit, contrariique inuicem sibi occurrunt: id quod etiam euenire autumno in lipyriis, & hepialis febribus, nisi quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisque affectus oritur. Si uero parem absynthij portionem melli exquisitam commistam, lingue imponas, simul dulce & amarum, quod ex ambobus mistum fuerit, uidebitur: quum non alio tempore mellis saporē lingua ipsa sentiat: alio autem absynthij, sed utrumque simul. Quemadmodum igitur ab alijs lingua afficitur, ita necesse est quaque aliarum corporis partium, ab eis similiter affici: etiam si qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiēdo, aut non patiēdo, ab alijs linguam differre est putandum, uerum eò quod ipsam similiarium affectuum, ob exquisitam sentiendi facultatem, nihil latere possit. \* Ad quod sane non nihil ipsius conducit raritas: sic enim succi facilius penetrant. Porro si solano & anthemide alicui parti simul applicitis, neque



ita densa, dura, tensa, liuidaq; reddatur, ac si solo usus solano esses: neq; adeò rara, mollis, tepida & rubens, ac si anthemide sola usus fuisses: sed dictorū mediam accipere affectionē particula conspiciatur, consentaneum certè est, utrūq; medicamentum secundum suā facultatem esse operatum: ac p̄inde particulam ipsam eodem tempore contraria simul perpessam fuisse. Igitur quemadmodum mirum non est, \* si à medicamentis compositis contrarij simul affectus corporibus infligantur, ita nec si à simplicibus: quum & ipsa sensui quidem simplicia appareant: natura autem composita sint. Siquidem quemadmodum nos in ijs quæ indies cōponimus, sic natura in simplicibus ipsis, contrarios temperare succos consuevit: quorū sanè actiones, si pari facultate & portione ipsi in mistura coeant, euadent similes: si dispari autem, diuersæ. At uerò, ut astrictio quidem una res est, ita astringens, duplex. Aliud quippe summum existit, ut alumen & galla: aliud autem, quod astrictionis sit particeps, ut pirum, uinum, et rosa: nam huius minimum est id quod astringit: quare medela existit inflammationum.

## CAP. XVI.

**R**osaceum uerò (utpote cuius natura olei rosęq; in medio est) in inflammationum augmētis, hoc est in illarum medio, optimum est præsidium. At oleum commodum est, ubi inflammationes maximè uigent. Etenim per initia repellere cōprimereq; influxus oportet: in uigore autem, ita per halitus digerere, ut morsus absit: at in incrementis, repellere simul ac digerere. Vtrūq; autem rosaceum præstare potest. Nam præter q̄ q̄ tenuium est partium, leuem quandā astrictiōnem sortitur, nimirum inter oleum & rosam existens medium. Quippè medium omne ex cōtrarijs mistum existit, ijs q; totis per tota contemperatis, aut p̄ exiguas particulas, sensum effugientes eorum quibus admoūē

Simplicia medicamenta affectus contrarios gignere nō est mirū cū natura composita sint.

Astringēs duplex.

Rosaceum quoniam cōueniat inflammationibus. Inflammationū curatio.

Rosacei fortas.

Mediū omnium contrariis sum existit.



tur. Etenim quæ magnopere austera, acerbæq; sunt, primo statim contactu superficiem densantia, humorem ingredi prohibent. At quæ modicè astringunt, cæterum plurimum in se continent essentia tum tenuis, tum tepida, tantum abest, ut præ astrictione ingredi altius corpora admota prohibeant, ut etiam ab ea, magis scilicet impellente, iuventur. Quæ autem penitus tenuia calidæq; sunt, magis digerunt humores ex corporibus quibus admouentur, quàm alios ipsa apponant. At quæ frigida sunt & essentia crassioris, omnino nullum introducere humorem queunt. Quæ itaq; humida, tenuia, et modicè astringentia sunt, ea inter omnia humectantia efficacissimè humectant.

Humectare q̄  
possint emulū  
efficacissimè.

Calor innatus  
ad quid condu-  
cat.

Frigida & de-  
leteria medica-  
menta, cur ci-  
tius, magisq; i  
calidis naturis  
uim suā exerāt

Qualitates oēs  
tradātenus in  
limutuo agūt  
capis ab assi-  
do stillicidio  
luatur,  
stadius cerā  
secando hebe-  
cit.

## C A P. XVII.

**A**D hæc autem omnia, nō mediocriter confert innata nobis caliditas, & intrò ad sese attrahens, & comminuendo extenuans. Hinc est q̄ frigida deleteriaq; medicamēta, utputà cicuta, papauer, hyoscyami semen, mandragora, & alia id genus, citius magisq; in calidis naturis uim suam exerant. Nam quū sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigerent, necessum sanè est, ut intrò comminuta ingrediantur: id quod ex sua natura præstare nequeunt, crassa & inepta ad motum quum sint. Quare ascititiam caliditatem requirunt, quæ in minuta extenuet, ac ueluti manu ducat in subtiles meatus. Itaq; si quando ea absit, cunctant, in maioribus hærentia meatibus, in ipsisq; fluctuātia arterijs & uenis, temporis spatio aliquid perpetiuntur. Siquidem qualitates omnes quadantenus in sese agūt. Nā et lapis ab assiduo stillicidio excavaat, gladiusq; cerā secando hebescit. Quādiu igit solidæ partes (à quibus perficiuntur actiones) à refrigerantibus medicamentis nondum refrixerint, tandiu animans superfit, est necessarium: refrigerari autem nequeunt, prius quàm illa subierint proprios harum meatus, id quod sua ex natu



ra non possunt. Deducit quippè succos, ut causa quidē primaria, arteriarum attractio: ut secundaria uerò & materialis, ipsorum tenuitas: qua destituta quum sint, frigidiora & crassiorum partiū medicamenta, ijs opus habent, quæ præbeant. Cæterum corpora frigidiora, tractum arteriarum imbecilliorē possident, medicamentorumq; substantias cōminuere nequeunt: proinde medicamenta ipsa cunctari est necesse, processuq; temporis tum immutari, tum concoqui: quod solet succus lactucæ. Qui si integer ad cor perueniret, nō secus ac cicuta perimeret. Hæc igitur & similia, nisi celeriter perimant, nullius tandem effectus redduntur. At quæ aut erosione aut putredine enecāt, ijs ut tempore uires acquirant, accidit: quū temporis spatio putrescant omnia, eoq; magis, quo fuerit humidior atq; calidior locus. Meritò ergo fit, ut quæ frigore suo noxam inferūt, ijs actionis celeritas ad perniciē proficiat: quippè quæ alioqui spatio excoacta, uim per quam agebant, deperdant. At quibus in putredine actio consistit, ijs tempus actionē adauget, quoniam et putredinem. Nullum autem animal interire potest, nisi cor ab agendi munere cesset; at fieri ut cesset non potest, citra maximam intemperiem. Cicuta itaq; hominem è medio tollit, tum ob meatuum amplitudinem, calorisq; multitudinem, tum ob ualidam arteriarum in attrahēdo uim, usq; ad cor ipsum perueniens. Sturnos uerò ob causas contrarias haud enecat, ut putà quum & retineatur, & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui, præparariq; à corde patiat; quemadmodum & in ipsis lactucis accidit, quæ moderate quidem sumptæ, alunt hominē: si uerò quispiam expressum earum succū largiter hauriat, non secus proculdubio morietur, q̃ qui aut cicutam, aut papauer sumpserint. Ad eundem quippè modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit: sturnos autē tarditate ipsa, nutrit. Sin autem

Succi a quibus deducantur per corpus.

Lactucæ succus, si integer ad cor perueniret, nō secus ac cicuta perimeret.

Deleteria quæ putrefaciendo enecāt, quomō ab iis differāt, quæ sua extinguunt frigiditate

Interire nullū animal posse, nisi cor a munere agendi cesset. Cicuta cur minime sturnos enecat.

Lactucæ succū liberaliter sumptum, esse letalem,



Vetula quædā  
Atheniēsis ale-  
batur cicuta.  
Cōsuetudo est  
adscititia natu-  
ra.

exiguū quippiam sumatur, mortē homini haudqua-  
quā inferet: id quod anus illa Atheniensis experimen-  
to docuit, q̄ ab exigua cicutę portione auspicata, nullo  
detrimento ad permagnam progressa est copiā; adeō  
consuetudo uidetur esse adscititia natura.

## CAP. XVIII.

Necātia frigo-  
re, nō genere,  
sed sola quāti-  
tate dicunt le-  
talia, cōtra q̄  
ea q̄ putrefaci-  
endo aut ero-  
dēdo iterimūt.

**E**orum ergo medicaminū quæ frigore interimunt,  
nullum genere letale est, sed sola quātitate: quum  
si exigua portione sumantur, mortem non inferant. At  
in erodentibus, putrefaciētibz, & calfaciētibz, haud  
ita res sese habet. Ad hæc, quemadmodum frigida me-  
dicamenta, nisi calorem offendant ualidum, qui cōmi-  
nuat atq; deducat ipsa, non perimunt, sic si quod com-  
minuit deducitq; multo ualentius fuerit, deuincet pr-  
sus, mutabitq; , ac alimento ut sibi sit medicamen-  
tum, efficiet.

## CAP. XIX.

Medicamenta  
calida & frigi-  
da a nobis su-  
munt iuitium  
aētionis suę, ac  
pinde potesta-  
te dicunt talia  
Cicuta si cum  
modico & mi-  
nime generoso  
uino bibatur,  
o yus perimit  
Vinum uetus,  
generosumq; ,  
& calidū, auxi-  
liū ur uenenis  
refrigerantibus  
Vinū refrige-  
ratis oibus uti-  
le, quale nā eē  
debeat.

**Q**uoniam igitur medicamenta refrigerantia quadā-  
tenus à nobis accipiāt suā refrigerandi uim, sicut  
et calfaciēdi calida (neq; enim quicq; moliri possent,  
absq; corporis patientis auxilio) iure potestate dicunt  
frigida. Nam ut actu nos refrigerent, nō prorsus ex sese  
obtinēt. Ea propter meconium & cicuta, si cum mo-  
dico eoq; minime generoso uino bibantur, ocyus qui-  
dem interimunt. Si quis uerò papaueris succum, quā-  
tus interficere potest, hauserit, ac etiānum tamē super-  
sit, huic largē epotum uinum uetus generosumq; & ca-  
lidum auxiliabitur. Cæterū quod tenui pellucidaq;  
substōtia est, colore uermiculo aut flauo, odore gratū,  
quodq; multam aquæ misturā postulat, id tum admo-  
dum excalfacere est natum, tum facilē undiq; per cor-  
pus uniuersum deferri. Tale ergo natura uinum, ætate  
uetus, multum, atq; impermistum, non modō perfri-  
geratorum omnium, sed eorum etiam qui aut ex oris  
uentriculi, aut cordis dolore, animi deliquium patiun-



tur, præsentanem remedium existit.

## C A P. XX.

**A** Teorum medicamentorum quæ erosione atque putredine interimunt, pleraque sanè perinde ut illorum quæ potestate dicuntur calida, actu etiam calida existunt, sed iccirco nos fugiunt, quoniam aut ipsi plurimum habemus caloris, aut crassa est ipsorum substantia. In balneo quippè urina nobis uidetur frigida, quemadmodum argentibus, hyeme, aqua putealis, calida: cæteris autem frigida. In summa enim, pro suo unumquodque affectu, admota consuevit sentire corpora. Sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici aceruum immiseris, luculenter calorem percipies. Sin calidam, nequaquam. At si columbino stercorei accumulato, potissimum columbarum sylvestrium, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, fori, chalcitis, ærugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis aceruatis manum altius injicias, protinus uidebuntur excalfacere. Ceterum si bolum ex eis unum acceperis, cuius extrema superficies ab ambiente fuerit refrigerata, meritò nulum percipies calorem. Quam ob rem fieri etiam potest, ut quæ respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, ea secundum alterum animantium genus calida esse actu uideantur.

## C A P. XXI.

**Q**uæ igitur nos contactu per putredinem aut erosionem enecant, ea recta quidem ratione, deleteria humanæ naturæ toto genere existimantur: non ut refrigerantia, quantitate duntaxat. Hæc enim interdum uincuntur & nutrimentum animali redduntur: putrefactientia autem, uel si sumantur portione minima, omnino tamen corrumpunt, quod uidelicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humiditateque putrescant: calidus autem humidusque sit sanguis. Proinde longo etiam post

Quisq; p suo  
affectu admo-  
ta consuevit sen-  
tire.

Deleteria hu-  
manæ naturæ  
quæ sint.

Putrefactientia  
uel si sumantur  
portione mini-  
ma, corrumpunt  
animal.



tempore à quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quæ crassa terrenaq; essentia sunt prædita.

## C A P. XXII.

Erodentia.

Cātharidas cō  
mode misceri  
diureticis.

Alexipharma-  
cis commode  
misceri iterdū  
letalia.

Cātharices ue  
sicā exulcerāt.

**I**nterdum autem ipsa erodentia medicamēta adeò exigua sumuntur, ut excerni cum excrementis possint, prius q̃ iniuria corpus efficiant. Interdum etiam qui illa sumpserit, opportunis remedijs usus, asseritur. Nam ubi grauis ab ijs noxa illata est, malū ipsum sisti nullis prælijs potest. Ceterum cantharides medicamentis diureticis commodè permiscuntur, sicuti alexipharmacis alia pleraq; letalia. Feruntur enim alioqui sponte sua per urinam ad uesicā cantharides, ac sic rodendo illam exulcerant, nisi ubi copia modica induntur. Ex quibus patet, quæcunq; frigiditate interimunt, si exigua sumantur, nutrire corpus posse: at quæ putrefaciendo, nequaquam: quum naturæ humanæ aduersentur.

## C A P. XXIII.

Medicamētis  
multas diuersi  
generis imistas  
esse substantias.

Purgantiū me-  
dicamētorum  
discrimina.

Purgantiā, ubi  
a natura uincu-  
tur, talē gignūt  
humorem, qua-  
lē ducitura erāt

**V** Tigitur in alimentis mistos esse uarios sapores diximus, sic in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias facile, si consyderes granum cnidium solum hoc à cnico differre, q̃ plurimum habeat caliditatis. Porro attractio quæ in ipsis cernitur, à qualitātū proprietatibus, quæ sunt in substantijs, perficitur. Idcirco purgantium medicamentorum ubi fortè purgatione frustrantur, quædam præter quàm q̃ noxam corpori nullam inferunt, etiam alimentum corpori præbent: alia uerò in corruptionem ac uenenum uertuntur. Omnino siquidem medicamentum purgans, uel cum uno saltem humorum, qui in nostro corpore sunt, similitudinem habet; non autem perpetuò mista est uis uirosa. Quamobrem nec perpetuò, licet non purget, iniuria afficiet, uerū & concoctionem admittere, talemq; producet humorem, qualem erat natum educere.



**P**leræq; itaq; attractiones fiunt qualitatis familiaritate: ac proinde singulæ animalis particulæ familiarē sibi alimentum attrahunt: ad quam sententiam sequitur medicamenta purgantia familiaria esse purgandis humoribus: quodammodo efficaciora, ualētioraq; sicuti magnes ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat, reperiaturq; in ferri fodinis, eiq; specie magnopere sit per similis: uerum fortior est quodammodo, ut attrahere sit aptior, quàm trahi. Cnicus etiam (quē carthamum uocant) colore quidem pituitæ similis, calore illâ superat, sic ut trahere q̄ trahi sit prôptior. Ad eundē modum granum cnidium, si quando à corpore nostro uincatur, uice purgationis alimentum efficitur: ueluti ueratrum semper coturnicibus. Verū enim uerò quoniam attractiones, substantiarum similitudine fiunt, necessum est, ut si quod purgatur pituita est, id quod trahit sit non pituita, sed pituitosum. Differt siquidem similitudo ab identitate.

## CAP. XXV.

**A**d hæc purgantium medicamentorum quædam iam a cū possident idoneam ad attrahendum similitudinem: quædam ab animantis illam corpore accipiunt. Præterea in unoquoq; medicamento, permixti similibus sunt alij succi dissimiles, qui partim quidē medicamētosi sunt: partim minimè. Quare ubi purgationem haud assequuntur, quædam in perniciem: quædam in alimentum uertuntur.

## CAP. XXVI.

**C**æterū ubi purgās pharmacum usq; adeò inualuit, ut in uasorum ad uentrem pertinentium osculis mordicationem apertionemq; multam relinquat, assidueq; irritans, conuellensq; corpora, uasorū facultates dissoluat, uacuationes immoderatæ contingunt: ita ut si quod pituitam educit medicamentum

Purgantia medicamenta esse familiaria purgandis humoribus.

Magnes ferro est specie similis, eo tamē fortior.

Cnicus est pituitæ similis.

Veratrum alit coturnices.

Attractiones fieri substantiarū similitudine. Similitudo differt ab identitate.

Purgantiū medicamentorum differentia.

Vacuationes immoderatæ quā & quomō accendant.



Sanguinē va-  
cuari omnium  
ultimū, ceu na-  
turę familiaris-  
simum.

exhibitum fuerit, prima quidem omnium ipsa euacue-  
tur: dein flaua bilis: mox atra: quarto deniq; loco san-  
guis. At si quod flauam bilem detrahat, pituita conse-  
quetur, post quam atra bilis: quartus demum reddetur  
sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam qui-  
dem primam eliciet: post quam, flauam: dein pituitam,  
ac omnium ultimō sanguinem, tanquam ex inanimis  
uasis effluentem: ut quæ summa iam imbecillitas occu-  
pet, quæq; ad extremam osculorum apertionem perue-  
nerint. Ex quibus manifestum est postremum in imo-  
dicis purgationibus uacuari humorem qui familia-  
rissimus est: aliorum autem singulos, prout crassi exi-  
stunt, aut tenues.

## C A P. XXVII.

Vasorę resera-  
tio, imbecillasq;  
vnde accidat.

**Q**Uum igitur uascula non amplius in se contine-  
re succos possint, & oscula eorum reclusa fue-  
rint, neq; irritare medicamētum desinat, nec possit am-  
plius familiarem succum attrahere, necessum est reli-  
quos quoq; , quo diximus ordine, sequi. Fit autem  
orificiorū apertio, ob medicamenti uiolentiā, ob  
quam uidelicet mordicatio etiam puenit.

Vasorum autem imbecillitas, tum ob

ingentem defatigationē, tum ob

intemperātiā, quæ imo-

dicas purgationes

præcedit.

Galenī




49

# GALENI PERGA

## MENI DE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber IIII.



CONSTAT igitur uniuersas corporis partes perpeti afficiq; ab alternantibus qualitatibus, quemadmodum lingua afficitur: sed passionum sensum non exactè percipere: at linguā ob pfectionē quā habet sensus, posse naturas earū omnium dignoscere: tamen si passionum similitudinem inuenire sit etiam in alijs partibus uniuersis, ac precipuè in exulceratis: Quandoquidem cutis duritas densitasq; prohibet, quo minus foris incidentiū facultates intrò in carnem penetrēt.

### CAP. I.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est: Ulceribus frigidum mordax: tamen si cuti prius q; exulceraretur, mordax nequaquam esset. Porro quæcunq; frigus contingit, eorum & contrahat, & condenset, & constringat substantiam, primumq; tenues tum excrementa humiditates, sicuti ex oculis lachryma, ex naribus mucus, necesse est: postea uerò etiam mordax appareat, licet alia ratione, q; in calido. Nec enim erodendo quod continuum est, sed diuellendo, mollemq; substantiam in arctū contrahendo, ac breuiter ipsius partis continuitatem per diuulsionem soluendo, molestū, ac mordax est frigidū. Cæterū ut in his protinus contractionis condensationisq;: sic in illis quæ calore suo mordicant, dissolutionis & fusionis sensus percipitur. Ad hæc in refrigerantibus quidem, utcūq; tardior est atq; cunctantior mordacitas: in excalfacientibus ue-

Vicibus frigidū mordax.

Frigidum quæ ratione sit mordax.

Tomus IIII.

D d d d



Mordicantium  
alia sunt facul-  
tate calida, alia  
frigida.

Cōdensare ma-  
teriam frigidi  
semper est pro-  
prium.

Liquare est p-  
prium calidi.

Aer accēsus fit  
flamma.

Terra accensa  
fit pruna.

Ignis gñā sunt  
Flāma & pruna.

Aqua esse sic-  
ca nō potest.

rō q̄ celerrimē pēnētrat. Quam ob rem medicamīnū mordicantium, alia sanē calida facultate, alia necessariō sunt frigida. At quæ moderatē calida sunt, quæq; temperata potius q̄ calida dici deberent, ut poculum atq; balneum, dum mediam temperiem sortiuntur, nobis grata & amica existunt. Funditur enim p̄ ea, quod in corporibus nostris constiterat atq; concretum fuerat, unde animantibus uoluptas maxima oritur. At si quis in eis immoretur diutius, sensim quidem et ipsa molesta euadunt, idq; non q̄ mordicatione infestent, sed, quod! substantiam nostram, soluentia digerentiaq; deliquium animi, ac tandem mortem inducant. Quæ autem his calidiora sunt, secāt, distrahuntq; substantiam: quare necessariō mordacia uidentur, ut tum aqua feruens, tum ignis. Igitur subiectam materiā contrahere, condensareq; frigidi semper est proprium; fundere autem atq; liquare, calidi: utriusq; uerō immoderatus aucti, communis est mordicatio. Verūm quæ iam summa frigiditate, aut caliditate absunt, minimē cutē mordicant. Plurimum autem ad id genus affectiones facit essentia medicamētorum uel tenuitas, uel crassitudo. Siquidē frigida quæ tenuium partium sunt, quū magis in profundum transeant, uehementius mordicant. Calida uerō quæ crassarum sunt partium, quoniam plus ulcerant, uehementius iccirco affligunt. Tenuiorum itaq; partium aer est: crassiorum terra: medium eorum tenet aqua. Sed aer accensus fit flamma: terra autem pruna: at aqua, uehementem sanē caliditatem recipit, sed nec flamma nec pruna, propter innatā humiditatem, efficitur. Siquidem flamma & pruna, ignis sunt genera: ignis autē omnis, calidus est & siccus: at aqua sicca ut sit, fieri nequit. Nullum autem est adeō calidum pharmacum, ut flamma, aut pruna, aut aqua ferueat. Procedit tamen usq; ad uestionē ipsa medicamentorum caliditas, ubi in crassa consistit essen-



SIM. MED. FAC. LIB. IIII. 51

ti. Quæ uerò subtilium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calfaciunt dūtaxat. Est ubi mordicent, non tamen urant.

C A P. II.

**P**orro quæ celeriter in tenuia soluantur, tenuiū dicuntur partium: quæ id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ea soluantur, calor animalis, cui applicantur, est causa: quod in tenuous crassas uel partes cōminuantur, id à propria natura obtinent. Quocirca refrigerantium medicaminum ea quæ crassarū sunt partium, mordicare nequeunt, quia extimam cutis superficiē penetrare non ualeant. At quæ tenuium sunt partium, maximeque si in æqualem temperiem sortiantur, ualenter mordicant. Sed supra demonstratum est in æquabilia esse propemodum omnia: ubi ostenderemus & in uino, et in oleo, quatuor reperiri succos diuersos, iūsummaque; uniuersa medicamēta facultatibus contrariis cōstare. Enim uerò acetum, tametsi ingenitam uini caliditatem amiserit, ex putredine tamen sibi aliā adeptū est. Quippè uinosę uini partes, dum ipsum in acetū trāsfit, refrigerantur: at aqueum recrementum putrescens, ascititiā caliditatem acquirit, ueluti quæ putrescunt omnia: sitque acetum quiddam ex cōtrariis facultatibus mistum, partim refrigerantibus, partim calidis, sicuti uistorum lignorū omnes cineres, qui ex adustione non nullas partes igneas conseruāt, quas macerati postea solent in aquam deponere. Hanc enim aquam marine & murię per omnia correspondentem, uulgo Lixiuū appellant. In uniuersum autem, quod tantum est acidum, quicquid id fuerit, planè frigidum est, eoque uti cōtra omnes calidos affectus commodissimè poteris: ut omphacii succo. Qui quidem quū omnino acidus sit, perfectè etiam refrigerat, uniceque ardoribus prodest, inimicus affectionibus frigidis, quemadmodum omnia exquisitè refrigerantia. Ea autem quæ quum acida

Tenuiū et crassariū partiū quæ esse dicantur

Mordicari quæ ualeant.

Medicamenta omnia facultatibus cōstant cōtrariis.

Acetum ex cōtrariis facultatibus cōstat.

Lixiuū.

Acida omnia sunt frigida, quatenus acida sunt Omphacii facultas

Dddd ij



Acida frigiditas, tenuiū est partium.

Astringens frigiditas crassa est partium.

Sensus quo patet exercet de beamus.

Emplastica medicamenta quæ dicantur.

Emplasticon natura duplex

Olei partes.

sint, habent etiam saporem quendam acrem permistū, qualis planè inest aceto, haud dubiè nonnihil caliditatis possident. Verūm si frigiditati astrictio coniuncta sit, aliud est frigiditatis genus. Quippè acida frigiditas tenuium est partium: at astringens, crassarum.

### C A P. III.

**N**on igitur sola ratione per methodos logicas nos exerceri oportet, sed exercere etiā sensum in saporibus singulis: quod fiet, si omnia ea sedulo experiamur lingua, quæ unamquāq; qualitatem præ se ferunt manifestissimam. Ut si acrimoniam cogitatione cōplecti uelis, in allio, cæpis, atq; his, similibus, ea sæpè gustando, te exerceas oportet. Sin astrictionem, in galla, rho, & similibus. Si amaritudinem, tum in nitro, tum felle. Si qualitatem saporis expertem, in aqua immuni ab omni qualitate ascititia. Nam hinc exorsus, promptius ad aliorum obscurorum omnium saporū cognitionem peruenies.

### C A P. IIII.

**S**in autem qualem præbet sensum aqua planè omnis qualitatis uacua, talem in re aliqua sicca inuenias, ea nimirum mediam cōstitutionem sortietur: aut certè ad frigidius paululum inclinabit. Quòd si talis, quum sit in caloris & frigoris differentia, in super consistentiam nata sit siccam, terrestris sit, ac citra morsum desiccet, est necesse. Atq; huius generis medicamenta omnia medici appellant emplastica.

### C A P. V.

**D**vplex autem est emplasticorum natura: altera exactè terrea & sicca: altera uiscosa quidem omnino, sed ex aqua & terra, & plerumq; etiam aere, commista, sicuti oleum dulce. Hoc siquidem ex aerea, terrea, aqueaq; essentia constat. At oui albumen, ex iisdē quodāmodo, sed magis terreū est oleo. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoq; est: & suillus,



## SIM. MED. FAC. LIB. IIIL. 53

adeps. Nam tauri: & hirci pinguedo, acrimoniam & multam, & igneam possidet: bouis item, ouisq; adeps acris existit. Porro anseris & gallinacei calidior est pinguitudo, & siccior q̃ suum: necnon subtiliorum partium, & minimū terrestres, sicuti & auum omnium. Quæcunq; ergo pinguedines nondum ullā nactę sunt acrimoniam, emplasticam & illinendi poros possidēt facultatem: eamq; tantō efficaciorē, quātō sicciores, magisq; terrenę fuerint. Huiusmodi enim est cera elota, quæ ex melle tum aquosiore, tum minimē mordaci conficitur.

Adipis differentie.

Cera elota est emplastica.

## CAP. VI.

**A** Stringentia porro terrena sunt & crassa corporis consistentia: qualitate uerò frigida. Acida autem, tenuitate pollent corporis, sed perinde ut astringentia refrigerāt. Etenim arborum fructus, quotq; nobis, ubi maturauerunt, dulces apparent, nuper enati, acerbi sicq; sunt consistentia: progressu uerò tēporis, humidiores redduntur, acquiruntq; ad acerbicatem, aciditatem quādam: quam exuentes sensim, postea dum perficiuntur ac maturescunt, dulces euadunt. Sunt qui non in arboribus, sed postea q̃ repositi aliquandiu fuerint, dulcedinem indipiscantur. Alij non interueniente aciditate, paulatim in dulcedinem transeunt. Omnes tamen coquuntur & maturescunt calido: quod quidem duplex existit: alterum nempe & proprium, & cuiq; in genitum: alterum externum, à sole uidelicet, sed nature ipsorum conueniens & familiare. Si igitur quā initio acerbi essent, tempore maturescentes dulcescunt, sequitur ex calore ipsis prouenire dulcedinem: acerbicatem uerò, aciditatemq; ex frigore. Ad hæc etiam, initio quidem lignosi quum sint, necnon sicci & acerbi, postea uerò humore adueniente reddantur acidi, palam est, saporem acerbum acido magis terrenum existere. Quin etiam, si ab acerbo sapore manifestè linguam cō-

Astringentium natura.

Acidorum natura.

Fructuum sapor.

Fructuum differentie.

Fructus oēs coquunt, et maturescunt calido. Calida duplex

Acerbus sapor acido magis terrenus existit

Dddd ij



*Acerbus sapor  
est frigidus.*

*Acerbi & aci-  
di saporis di-  
fferentia.*

*Astringens oē  
exquilitate, esse  
frigidum.*

trahi, siccari, asperariq; contingit (quæ unius frigidita-  
tis sunt opera) liquet planè frigidum esse saporem acer-  
bum. Quoniam uerò inæquabiliter etiam desiccatur (id  
enim est quod exasperat) fuerit utiq; omnino etiam ter-  
renus: nam aqueus, omnia æquabiliter penetrat. Præ-  
terea, uelox quidem acidorum saporū transitus in par-  
tibus sit sentientibus; acerborum autem tardus: tum  
acida quidem in alto magis agere apparent: in superfi-  
cie autem acerba. Quæ omnia, crassarum esse partium  
acerba indicant: acida uerò tenuium. Ceterum utraq;  
dicuntur astringere, tum quæ acerba sunt, tum quæ au-  
stera: sed in maioris minorisq; ratione differunt. In-  
sunt autem ipsis medicamentis qualitates complures,  
non diuersæ modò, sed pugnantes etiam, atq; interim  
subcontrariæ. Quare ubi astringentium, exempli gra-  
tia, diligenter explorare actionem contendis, ea tantū  
disquiras, quæ gustui exquisitè acerba uidentur, nul-  
lamq; saltem manifestam habent qualitatem admistā.  
Quæ quidē ubi nactus fueris, tū in optima sanorū cor-  
porū constitutione, tū in affectibus simplicissimis, de illis  
facies periculum. Nam si corpus sanum manifestè cer-  
natur refrigerare, & calidis proferat affectibus, intrepidè  
sanè poteris, de astringentis ipsa, q̄ refrigeret, pronuncia-  
re. Sin contra appareat, taleq; medicamen acerbum in  
illis conspicuam caliditatem inducat, calidum natura  
putandū est, in cæterisq; saporibus pari iudicio expe-  
riundum. Ego uerò, etsi facultates medicamentorum,  
uel citra sapes, sola experientia noscunt, usus tamen  
prædicta methodo, omne exquisitè astringens, frigidū  
perpetuò comperi: nonnullaq; modicè dulcia, aut ama-  
ra, aut acria, simul cum astringentis sum expertus etiā  
apertè refrigerantia. Item quæ astringunt pariter atq;  
acida sunt, ea quoq; manifestè refrigerare experientia  
didici. Sola uerò dulcia omnia pro dulcedinis modo,  
protinus etiam calorē cōtinent. Quocirca eorum quæ



## SIM. MED. FAC. LIB. IIII. 55

admodum dulcia sunt, nullū omnino est frigidum. At amara omnia, calidam possident facultatem.

## CAP. VII

**A**lterus igitur sapor, exolutus acerbus est. Quū autem corpus acerbum, terreum sit atq; frigidū, tripliciter necessariō exoluitur: nempe aut incallescens, aut humescens, aut utrunq; simul perpetiens. Si ergo incalescat dūtaxat, solidā dulcedinem contrahet, qualis castaneis inest. Sin tātū humescat, si quidē ea crassum sit partium, et aquea humiditas, austerum euadet: sin uerō aëria, acescet. Si pariter humescat et calfiat, humiditate quidem aquea, in dulcedinem: aërea uerō trāsibit in pinguitudinem. Ac sanē secundum propositarum qualitatū misturas, uarias fructus mutationes sortiuntur. Cæterū acerbus ad extremū perseuerat fructus ilicis, arbuti, fagi, & corni. Acerbus simul & dulcis, myrti fructus est, piri agrestis, & roboris. Austerus una & dulcis palmarum fructus. Pinguis exaltet, tum fructus, tum succus oleæ.

## CAP. VIII.

**Q**uicūq; ergo fructus oleosi dūtaxat sunt, edēdo nō sunt, & dulces. Quibus uerō alterascentibus amaror aduenit, nō edi nō possunt. Quippē amarū omne edi nequit, taleq; efficitur à caloris excessu. Verū dulce omne calidū est, nec immodicē calorem nostrū exuperat, sed inter limites se continet fundentis, leuigatis, mollientis. Quum autem qdam sint quæ una: quædam quæ duabus in sese qualitatibus & agunt & patiuntur: quædam uerō etiā totis substantiis suis: in horum certē numero medicamēta non pauca ponuntur: sicuti & nutrimenta uniuersa: quorum duplex est genus. Siquidem quædā sunt pingua, ut ipsa pinguedo: quædam dulcia, magis minus ue: ut omnia illa quibus nutrimur.

## CAP. IX.

Dddd iij

Dulcium esse  
nullū frigidū.  
Amara omnia  
calida.  
Acerbum cor-  
pus exolui tri-  
pliciter.  
Acerbitatis in  
alias qualita-  
tes mutatio.

Saporum diffe-  
rentiæ in variis  
fructibus.

Fructuū qui nō  
sunt uesci, & q  
minime.  
Amara edi ne-  
queunt.  
Dulcis saporis  
natura.

Nutrimētorū  
duplex genus.



Nutrimētū oē  
esse dulce.  
Nutritio quid.

Nutrimēta eē  
mediocriter  
calida.

Iucundum esse  
duplex gener.

Dulcedo a mo-  
derato calore  
provenit.

**E**st tamen & pingue ipsum, & quicquid nutrit, dulce. Nam quum nutritio euacuati repleto sit: quod euacuatum autem est, familiare & benignum esset; certē etiam id quod nutrit, familiare, iucundū, & amicum sit est necesse: ac proinde calidum modicē, re spectu illius quod nutrit. Sed in hoc non parua est maioris minorisq; ratio: quandoquidem nec ad cibos accedimus exactē secundum naturam affecti. Corpus siquidem eorum qui cibos appetunt, sit dūtaxat inanitū oportet, si absoluti futuri sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores. Nam si prāter id calidiores q̄ conueniat, aut frigidiores euaserint; non solūm quæ nutriāt, uerū etiam quæ refrigerent aut calfaciant, postulabūt. Quocirca cibi quoq; illis aliās aliq̄ iucundiores uidentur. Nam quum duplex sit genere iucundum: alterum quod impleat id quod uacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum: alterum quod medeatur ei quod alteratū est, id quod medicamentum existit: euenit utiq; cibis, ubi non modō uacuatis exhibētur corporibus, sed etiā qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent: ut cibi scilicet, et ut medicamenta. Quamobrem nec eduliorum nec medicamentorum una est animaribus oībus species: siquidē p̄ sua unaquaq; familiari substantia simul et affectione, tū delectant, tū iuuant ab utrisq; Sed si hæc sic habent, id qd in cibis minus erit dulce, minus quoq; erit calidum: quod dulcius, tantō nimirum erit calidius, quantō uidelicet dulcius: sin ad immodicum recidat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam apparebit amarum.

# C A P. X.

**E**tenim ut à moderato calore bifariam cuiq; corpori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio & insito calore dulcia, partim uerō ascititia: ad eundem modum amara. Alia nāq; sunt, quæ suapte natura exalfaciunt: alijs autē id accidit ab acquisitio ca-



lore accensis. Porro dulcia omnia proxime accedunt ad naturam eorum quibus apparent dulcia: idque aut proprio calore, ut mel: aut acquisitio, ut sunt omnia que ab igne preparantur. At mustum non suo modo, sed etiam ascitio calore dulce esse uidetur. Siquidem haud parum ueluti ardoris ex solari calore tum acinis, tum alijs inest fructibus: a quo id quod illis aqueum ac ueluti semicoctum inest, ad concoctionem ducitur. Nam ex quibuscunque pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum feruescere deprehendes: tanto tamen feruoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diuersitas. Cæterum ubi quod semicoctum erat, transmutatum iam fuerit, euanueritque is qui excitabat feruorem calor, iam tum denique synceræ succorum proprietates cernuntur, propriaque uinorum natura agnoscitur. Iam uero, quæ inueterantur uina, omnia calidiora redduntur: ac primum quidem quandam dulcedinem acrimoniamque asciscunt: quæ uero prius inerat illis astrictio, austeritasque, tempore ipsam deponunt. Dein rursus acrimonia crescente, dulcedinem indies abijciunt, paulatimque amarescunt. Vnde constat dulce esse calidius austero, sicuti & dulci amarum. Atqui si uerum est dulcedinem puenire a moderatione caloris, patet astrictiorem a frigido uincente perfici.

## CAP. XI.

**V**T igitur uinum acerbum, tempore dulcius primum: mox acrius amariusque: ultimò uero planè amarum naturaliter redditur: ad eundem modum quod ueluti rigorem præter naturam perpessum est, protinus acidius efficitur: ac si prorsus refrigeret, acescit penitus. Præterea quod in uindemia ipsa per assiduam pluuiam, aliena humiditate fuerit imbutum, leui occasione acescit. Contrà uero accidit ijs quæ talia quum sint, igni admouentur: nam & protinus, & progressu temporis dulciora reddunt: tandemque si perdurauerint, alijs

Dulcia proxime accedunt ad naturam eorum quibus talia uidentur.

Mustum.

Succum cuiusvis pomi feruescere, ut mustum.

Vina uetera, calidiora.

Dulce est calidius austero. Amarum esse calidius dulci. Astrictio a frigido oritur.

Vina igni admouita, dulciora reddunt.



Maturatio fru-  
ctibus: eibus a  
solari calore p-  
uenit,

Aceti facultas

Omphaciū &  
acetum in qui-  
bus differant.

Acetū magis  
refrigerat q̄  
mel calefaciat

Fructus oēs in  
primo sui ortu  
esse acerbos.

similiter amarescūt. Quum itaq; omphax sit acida, uua  
uerò dulcis, ac fructibus omnibus maturatio à sola-  
ri calore proueniat, planum est, imperfectius & frigi-  
dus esse quod acidū: perfectius uerò & calidius, quod  
dulce fuerit. Cæterū diuersis uiribus acetū atq; suc-  
cus omphacis constant. Nam acetum proprio quidem  
uini calore, est frigidum: ascititio autem, contractoq;  
ex putredine calidum. At omphacis succus calorē non  
habet: ac proinde nec acrimoniam. Præterea ompha-  
cis succo acetum tenuius est. Quamobrem frigiditas q̄  
ab aceto infligitur, excellit eam quæ procedit à succo  
omphacis, idq; & uehemētia, & mistione. Nam tam-  
etsi succo omphacis, ne minima quidem caliditas ille:  
aceto autem acrimonia quædam excalfaciens: hæc ta-  
men satis non est, ad superandam ab aciditate proue-  
nientem frigiditatem: sed potius ueluti sternens uiam,  
atq; aperiens meatus, illius celeritatem promouet. Ca-  
liditas siquidem quæ à præcedēte acetī acrimonia ori-  
tur, protinus à frigore insequētis aciditatis extinguit,  
ita ut multò maior ex aceto frigiditas percipiatur. Ad  
hæc autem si pari mole acetum melli permisceas, acetī  
frigiditas superabit mellis caliditatē: eoq; magis, quo  
fuerit maior acetī copia. Quod si multò plus mellis q̄  
acetī indideris, parem calorem atq; frigiditatem in ea  
mixtura comperies. Siquidem multis numeris acetum  
plus ab ijs q̄ moderatè sunt calida, ad frigiditatem rece-  
scit, q̄ mel ad caliditatem. Porrò omphacis succus, qui  
& ipse (ut omnes fructus i primo sui ortu) est acerbus,  
ad ardentia hypochondria longè p̄stantior est, q̄ ace-  
tum: q̄ nec uiolentam, nec ferientem, nec mordaci ca-  
lori iunctam frigiditatem sortiatur.

# C A P. XII.

Porrò q̄ uina quædam inualida Vere atq; æstate  
acescāt: quodq; uehemētius mota in meridianisq;  
locis reposita, idem etiam patiuntur: contrà uerò hye-



## SIM. MED. FAC. LIB. IIII. 19

me atq; uersus aquilonem defossa, integra & secundū suas uires seruētur, nonnulli à calore nasci aciditatem existimarunt. Se autem ij falsos esse deprehendent, ubi uiderint non calida & uetera uina, sed quæ principio sunt frigidiora, sic per calorē acescere.

## CAP. XIII.

**P**er simile autem quid uinis accidit, quæ natura frigidiora aquosioraq; sunt, quale flāmis exiguis & Imbecillis. Quippè si eas ad feruidum solem exponas, prorsus obscurari, aut etiā extingui conspicias. Quod si ualido etiam flatu concutias infirmā, ac paruam flāmam, citius illam extinxis, q̄ inauxeris. Natura enim infirma ualidum nec motum, nec calorem sustinet. Ceterū multis in locis fortiora uina, ex industria cōmouēt & transportant, nec non soli exponunt, & calfaciunt, ac deniq; ad meridiē obuertunt cellas, ut citius sic maturescāt & potui idonea euadant. Nam quod multo tēpore alijs, hoc ijs quæ sic excafacta sunt, breuissimo accidit. Quemadmodum igitur exercitia ualida et sol, calida & robusta corpora, etiā ualidiora efficiunt; prosterunt autem, digerunt, & refrigerant quæ non sunt eiusmodi: sic uina natura calida, motus ueluti uentilās, sol excafaciens, flammæq; iuxta ardentes, celerius cōcoquunt; quæ uerò frigidiora & aquosiora existunt, eorum arguūt omnia id genus imbecillitatem, celeriusq; perpeti cogūt, quæ alioqui post passura essent; quum nimirum res quælibet in propria natura seruetur calore proprio: corrūpatur autem ab imoderatione extrinseca, non minus caloris, q̄ frigiditatis.

## CAP. XIII.

**I**N uniuersum autem aciditas nascitur calore quidē mutante, non autem uincente siue alimentum, siue medicamentum: quemadmodum uidere est in acidis ructibus, qui à semicoctis cibis oriūtur. Quod autem opus sit calore alterante, argumēto sunt lac, & prisanæ

Vinorū q̄ nam  
accescant.

Flāmulas extingui a feruido sole.

Infirma natura ualidum nec motū, nec calorem sustinet.

Vina calida quibus concocquantur celerius

Calore proprio seruantur singula, corrūpuntur contrario.

Aciditas unde oriatur.



Acidi sapor  
funt essentia si-  
mul tenuis &  
frigida.

Acidus sapor  
syncerus i oxa-  
lide & oxyla-  
patho reperiit.

Generationes  
omniū corpo-  
rū ex quatuor  
elementis con-  
stare.

Similium faci-  
liorem esse tra-  
situm in se in-  
uicem.  
Linguae facul-  
tas.  
Linguae cur plu-  
res nervi tri-  
buti.

Dulcedo ē cō-  
munis omniū  
quæ nutriunt.

succus, quæ tempore æstiuo citius acescunt q̄ hyeme.  
Quum enim sapor acidus sint essentia simul tenuis &  
frigida, quemadmodum constitutio Borealis, nasci cer-  
rè sine calore nō possunt: sicuti nec ille ipse aer: ac pro-  
inde licet frigidi sint omnes sapor acidus, nullū tamen  
eorum quæ extremè refrigerādo enecant, acidum est.  
Exploranda porrò acidus saporis natura est, in oxalide  
& oxylapatho, ut in quibus reperiatur maximè synce-  
rus & simplex. Etenim quod propriè in saporibus ap-  
pellatur acidum, à sola lingua percipi potest, sicuti &  
acre: ceterum quod utriq̄ est cōmune, nempe morda-  
citas, etiam à tactu sentitur. Porrò ex quatuor elemen-  
tis impari mistura coeuntibus particulatim omniū cor-  
porum constant generationes. Ex ea autem imparita-  
te perficiuntur proprietates corporum particularium.  
Quippè ex elementorum inæquali mistura, plātarum:  
ex plantis autem, animalium proprietates oriūtur. Ac  
transeunt sanè quædam protinus in se mutuo: nōnul-  
la mediantribus alijs: ueluti terra in triticum, hordeum,  
& alia id genus: rursus horum singula in carnem hu-  
manam: quum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossi-  
bile, transiliendo eam quæ in medio est mutationem.  
At eorum quæ in sese mutuo transeunt, quædam cele-  
rem: quædam diuturnam alterationem obtinent. Ve-  
rū quæ maximè sunt inter se similia, celerē: quæ dis-  
similiora, tardiorē. Lingua igitur exactissimo sensu  
prædita, omnes qualitates dijudicat, nec non familiaria  
& similia, ab ijs q̄ sunt contraria discernit. Cuius usus  
gratia in hanc solam particulam complures nervi inse-  
runtur: quum in aliarū singulas inseratur aut unus tan-  
tū, aut alter, nec is magnitudine insignis. Quū igit̃  
quædam naturæ nostræ magis sint familiaria: quædā  
minus: atq̄ hæc quidem temperamento huic: illa autē  
illi: necessariò plures qualitates ipsius gustus existunt.  
Cæterum omnium quæ nutriūt cōmunis dulcedo est:



quandoquidem quicquid nutrit, necessario plus aut minus sit dulce oportet. Quæ uerò nō nutriunt, ea, aut non dulcia, aut salsa esse, est dicendum. At uerò id quod cuiq; rerum familiare est, unum est: nam & natura eius est un: aque autem aliena, complura: partim plus, partim minus à substantia eius dissidentia. Porro quæ dulcia simul & acerba sunt, ea crassioris essentia sunt, & temperaturæ frigidæ. Quæ acida simul & dulcia, tenuiora sunt q̃ acerba, refrigerant tñ & ipsa. At amara, calida sunt, sed acria his calidiora. Nutriūt ergo hæc omnia, si iunctam habeant dulcedinem. Per se autem nullum dictorum nutrit: quorum saporum mistiones, minimè quidem fiunt subito, sed in alteratione consistunt. Nam ijs quæ à natura mutantur, sensim fiunt alterationes. Sicuti igitur quod est summè dulce, aptum esui est: quod uerò exquisitè amarum, ineptum esui: ita quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem, uerū minus q̃ dulce. Eadē ratio est in cæteris qualitatibus: si quidem præter dulcem, nulla nutrire potest. At elementa multò sanè etiam minus nutriunt, nullamq; gustui qualitatem offerunt.

## CAP. XV.

**S**ed quemadmodum edulia quæ nutriendorum naturæ quàm simillima sunt, ea & dulcedinem præ se ferunt, nec ullam præparationem requirunt: sic quæ temperaturam nacta sunt remotiorem, alia condimentis, alia coctione, alia utroq; indigent. Etenim condimenta, quum ex se edendo non sint, suauitatem tamen ijs quæ per ipsa præparantur, conciliant: quòd illa reducant ad medium. Apparet etiam natura calidi, quibus admota fuerit, ea celeriter alterare, atq; in aliam mutare speciem. Quædam tamen suauiora, quædam insuauiora igni applicata redduntur: sicuti & quædam longo tēpore: quædam minimo, ut coquant, indigent. Etenim quæ nutriendorum corporum tēpore,

Familiarē cuiq;  
esse unicū, aliē  
na autē, plura.

Acria amarīs  
calidiora.

Elementa nec  
nutriunt nec ul  
lā gustui quali  
tate offerunt.

Condimentorū  
vſus.



Alimenta intē  
perata, quomō  
conigenda.

Humorum qui  
ī corpore sunt,  
sapores.

Mel quibus in  
bile vertatur.  
Mel plusculū  
igni admotum  
amaricat.

Mel temporis  
spatio amare-  
scit.  
Lac nūq̃ ama-  
rum effici.  
Lac ex tribus  
substantiis con-  
stat.

raturis similia sunt, ea uel citra coctionem, aut præpa-  
rationem, iam dulcia apparēt. Quæ uerò dissimilia exi-  
stunt, omnia insuauia sunt, anteq̃ præparentur. Atq̃  
ea quidē quæ nimis calida sunt, frigido corrigi debent:  
quæ uerò impensē frigida, calidorum mistura obsonio-  
rum, & igni. Ad eundem modum humiditate, quæ ter-  
rea sunt & sicca: siccitate, quæ humidiora sunt q̃ expe-  
diat. Maximam eorum, quæ dicta sunt, faciet fidē, quæ  
in ore fit transmutatio. Nam qui plusculū sustinuerunt  
ieiunium, ijs salua salsa redditur: qui uerò plurimum,  
amara. Sic etiā uniuersum corpus biliosum redditur.  
Est autem ipsa flaua bilis amara: atra autē, acida: San-  
guis qui secundum naturam est, dulcissimus. At pitui-  
ta linguam contingens, nunc dulcis, nunc acida, nunc  
salsa uidetur.

#### C A P. XVI.

**N**ihil igitur mirum, nec cur rerum omnium dulcissi-  
mum mel, succum generet amarissimum: nec cur  
id maximē ætate florētibus & calidis natura, & febrile-  
ribus accidat. Nam ut foris quum plusculum igni ad-  
mouetur amarū efficitur, ad eundem modum in animā-  
tium corporibus, ubi syncerū ualidumq̃; nactum ca-  
lorem fuerit, biliosum succum procreat. At in tempe-  
raturis & affectibus frigidioribus, facile in moderatū  
sanguinē uertitur. Nec uerò ab alieno tantū calore, sed  
à suo etiam proprio, mel amarum temporis spatio red-  
ditur. Porro lac, etiā si gustu sit dulce, ex se tamen nūq̃  
amarum efficitur. Vincitur enim in eo caliditas à frigi-  
ditate: ac proinde acescit repositum. Constat autem ex  
tribus substantiis, qualitate diuersis: prima quidē cras-  
sa, ex qua caseus conficitur: secunda pingui, ex qua bu-  
tyrum: tertia aquea, quam nominamus serum. Ex quib-  
us pinguis quidem, maximē temperata est: crassa ue-  
rò, paululum ab ea declinat: excrementum autem illud  
serosum, frigidum est et humidum. Si igitur gustari lac-



posset, ubi in uentre & per uenas concoctum est, ipso melle dulcius inueniretur. Nam quod foris & ex sese mel obtinet, id dum coquitur lac accipit. Et quum admodum ingens calor in animante extiterit, tantam accipit lac dulcedinem, quantam deperdit mel. Recta quoque id ratione euenit. Etenim quod summè dulce est, ac proinde nihil apponi ad eius dulcedinem potest, id ut in consequentem uerri pergat qualitatem est necesse. At cui quid deest, id per concoctionem acquirit. Verùm lac ubi cruditatē in uentre perpetitur, in frigidiori quidem, acescit: in calidiorē nidorosum amarumque efficit: nunquam autem inter coquendum mel aciditatem contrahit. Porro utraque, tum quod acidum est, tum quod amarum, linguam mordicant. Cæterum mordacitas ipsa, à tactu propriè, non à gustu sentitur: tribusque istis saporibus, acido, amaro, & acri, est mordicatio communis: uerùm acido quidem, ut frigidus simul atque subtilis: amaro uerò & acri, ut calidis.

## CAP. XVII.

Quod sapor acer sit calidus, non est cur in demon- strando sim anxius: quādoquidem id nemo ad- dubitat: & euidentia sensus, demonstrationis fidem pre- uertit. Porro quæ ex acribus idonea sunt esui, dulcem quandam, & si obscuram, necessariò habent qualitatem admistam. Proinde multis ipsorum pro obsonio uti- mur: multis uerò ut condimentis tantum: at ut cibo, ip- sorum omnino nullo, idque ob uirum uehementiam. Eo- rum autem quæ non eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamenta: omnia \* tamen cuti nostræ imposita, celeriter ulcus moliunt. Sunt & quæ ne gu- stare quidem audeas, cuiusmodi sunt cantharides, tha- psia, & ea quæ erosione aut putrefactione interimunt. Multa uerò etiam ipso statim odore pugnantiam cum homine indicant: ueluti, & hæc ipsa quæ nunc diximus: & ex summè refrigerantibus, cicutæ, papaueris, man-

Lac incidēs in  
uētriculi ingē-  
tē calorem, tantā  
dulcedinē con-  
trahit, quātam  
amittit mel.

Lac quomodo  
in alienas qua-  
litates mutet.

Mordicatio  
acido, amaro,  
& acri saporibus  
est communis.

Acer sapor est  
calidus.

Acra esculēta,  
necessario ha-  
bēt admistam  
dulcedinem.

Acrium medi-  
caminū diffe-  
rentiæ.



Saporū singu-  
lorū qualis sit  
finis aut termi-  
nus.

Amari saporis  
facultas.

Amara quibus  
morbis conue-  
niat.

Staphis agria  
colliquat car-  
nem.

Acriū saporū  
facultas.

Acres saporis  
quō ab amaris  
differant.

dragorū, lycopersij, & hyoscyami succus. Terminus  
autem siue finis saporis amari est abstergere; acris ue-  
rò, urere; at dulcis, nutrire: ubi i sua quisq; natura ab-  
solutus fuerit, hoc est minimè alienis qualitatibus of-  
fuscatus. Porro quod in ulceribus nati sunt præstare  
amari saporis, id ipsum assumpti in corpus efficiunt.  
Abstergunt quippe & expurgant: quæq; in uenis est  
crassitiem incidunt. Quamobrem menses mouet; edu-  
cendoq; ex pectore & pulmone tussi auxiliatur: comi-  
tiali; etiam competunt morbo; si modò naturam de-  
leteriam non habeant. Iis tamē qui sanguinem expuunt  
sunt noxi. Aristolochia autē, iris, & panax, adedō ama-  
ra sunt, ut proximè ad saporem acrem pertingant: ob-  
idq; nec abstergant tantum, sed etiam exedant & mor-  
dicent. Staphisagria etiam, nihil ab istis amaritudine  
uincitur, estq; iam adedō & acris & calida, ut non mo-  
dò sordem ulceribus auferat, sed ipsam etiam car-  
nem colliquet.

## C A P.

## XVIII.

**I**gitur saporis acres, primū exactè esse calidos  
dicimus: dein exedentes, urentes, crustam molien-  
tes, & colliquantes, si uel ipsi cuti imponantur. Nam  
intra corpus assumpti, si quidē tota substantia animan-  
ti aduersentur, ipsum putrefaciētes corrumpunt: sin  
uerò caloris imoderatione dūtaxat, si crassæ sint essen-  
tiæ atq; terreæ, interna exulcerant: sin tenuis, urinam  
atq; sudores promouent, in summaq; incidendi & di-  
gerendi in halitum obtinent facultatem. Ex quo gene-  
re quidam, tum expuitionibus ex thorace, tum mensiū  
motibus auxiliantur. Nec uerò sola uehementi calidi-  
tate ab amaris acres saporis differūt: sed q̄ amari om-  
nes non modò calidam habeāt facultatem, sed etiam  
siccam, & fuligini assimilē: nimirum à dulcibus excal-  
factis & exiccatis suam suscipiētes generationē: acres  
autem, quicunq; amari non sunt, admistam nullā hu-  
midi atem



miditatem sortiantur: quo fit ut eiusmodi corporum à nobis non pauca esitentur. Cæterum astringentibus medicamentis non parum tenuiora sunt medicamēta amara: acribus uerò, crassiora. Quare nec facilè crassos uiscidosq; humores pertanseunt, ueluti ea quæ tenuiori essentia sunt prædita: nec ad incidendum inepta sunt, pinde ut crassiora. In medio siquidē sint utriusq; excessus oportet, quæ incisura sunt. At uerò ferro lapidiq; ignito ea quæ per erosionem interimunt medicamenta similia sunt: quæ à corporis nimirū calore huc perducuntur: ueluti chalcitis, misy, fori, arsenicum, hydragyros, lithargyros, & alia innumera. Crassarum enim sunt partiū id genus omnia, & potestate calida: proindeq; temporis spatio accensa, per eā quæ ab animante proficiscitur mutationem, non aliterq; lapis ferumq; ignitum, uentrem, tum exulcerāt, tum exurunt: quū scilicet in corpus distribui præ grauitate non possint. His tamen tenuiora sunt, calx, cantharis, lepus marinus: necnon aristolochia, & iris: quæ quidem hæc ultima duo, & magis sunt illis acria, minimeq; deleteria existunt. Cantharis autem modicè sumpta, quibusq; oportet admista, non modò nihil offendit uesicam, sed renes etiam expurgat.

## C A P. XIX.

**Q**Uod itaq; amarus sapor siccis temperie corporibus insit, hinc colligere est, qd & minimè omnium amara putrescant, minimeq; tum uermes, tum animalcula illa, quæ i radicibus, herbisq; & fructibus putrescentibus oriri solent, producant. Maximè nāq; uidemus in humidis nasci corporibus uermes ac putrilaginem. Quam obrem quæ exactè amara sunt, animalibus p̄p̄modum uniuersis sunt esui inepta: quū nimirum aial omne sit humidum. Porro absynthium nō solū amarum est, sed astringit: marina uerò aqua falsa potius est, q̄ amara. At aqua quæ est in lacu Sy-

Tomus IIII.

E e e e

Incidētia q̄ssa  
esse debeant.  
Erodentia me-  
dicamenta fer-  
ro esse ignito  
similia.

Erodentiū spe-  
cies variæ.

Cantharis cō-  
mode exhibi-  
ta, expurgat  
renes.

Amara min-  
ime omniū pu-  
trescere.

Amara cur ani-  
malib⁹ uniuersis  
sint esui ine-  
pta.

Animal omne  
esse humidū.



Maris mortui  
aqua cuiusmo-  
di sit.

Salsuginē eam  
ēē ad saliendū  
optimā, cui o-  
uum innatare  
videatur.

Salsa amare-  
scere, amplius  
excalfacia.

Mare mortuū,  
cur nec plantā  
nec aīal ullum  
alat.

Amara ēē ho-  
minibus atq;  
plātis aduersa.  
Salis vires &  
differentiæ.

riæ Palestinæ, quē alij uocant mare mortuum, alij sta-  
gnum bituminosum, alij deniq; Sodomenum, gustan-  
tibus non salsa modò, sed amara uidef: estq; adeò gra-  
uis & corpulenta, respectu aliarū, ut ne si coneris qui-  
dem infiliens, in profundum differri possis. Inest enim  
ei salis substantia admodum grauis & terrea; ac proin-  
de tantò est aqua q̄ in eo lacu est, marina grauior, quā-  
tò marina fluuiali. Poteris autem ipse aquam marinā  
efficere, colliquato sale in aqua fluuiali: cognoscereq;  
simul quanto grauior reddatur aqua eiusmodi, quā-  
m sit dulcis. Quin & modū iam inuenerunt moderatam  
ad saliendum conficiendi salsuginem, si in ea ouum na-  
tare uideatur. Quòd si decoquere salsuginē ipsam ue-  
lis, protinus amarior reddetur. Nam quicquid salsum  
plusculum excalfeceris, amarū euadet. Ergo in eo Sy-  
riæ lacu, q̄ nimirum aqua quæ in eo est, amaricet, nul-  
lum neq; animal, neq; plāta inesse conspicitur. Immo  
quum duo in eum longè maximi fluuij confluant, pi-  
sciumq; copia scatētes, præcipuē qui pp̄e Ierichonē  
fluit, quem Iordanem appellant, nullus omnino pisciū  
fluuiorum ostia excedit: et si captos quis in lacum inij-  
ciat, celeriter eos mori conspicit: adeò est omnibus tū  
hominibus, tum plantis aduersum, quod amarum exi-  
stit. Omni autem sali obscura quædam astringendi uis  
inest, qua eas quæ condiunt carnes constringit ac den-  
sat: potissimū ubi durus, & minimè fragilis fuerit. Ta-  
lis est exactissimus quidem fossilis ferè omnis; minus  
autem illo, marinus: tum qui multis in locis aquis leuī-  
ter salis arefcentibus prouenit, tertium locū obtinet,  
abstergere magis q̄ astringere contrahereq; potens.  
proximas his vires Sodomiticus habet, æquē atq; ma-  
rinus durus.

## C A P. XX.

**P**ropinquus est sapor salsus amaro, quum terreni  
sint ambo, & calidi: non obscura tamen diuersita-



te diffident: quod uidelicet amarus à calore arido magis sit extenuatus, & elaboratus. Sic in genere salis, qui durior, densior, atque terrestrior est, quilibet ferè est uniuersus fossilis, minus existit calidus, subtiliùque; minus partiù: quod uerò rupi facilis, laxusque; tenuior simul atque calidior est; in quo genere & subamarus consistit, mediā naturā inter salem durum & aphronitrum obtinens. At uerò spuma nitri omnium est iam dictorum tenuissima: ueluti & Asiæ petræ flos: qui aphronitro tamē minus est calidus: quare hic excrescentias carniū minori cruciatu colliquat. Mordicat uerò eas nitri flos siue spuma: mordicat etiam, tum aphronitrum, tum nitrum. Ceterum quæ sunt crassa essentia, plus rodunt, ubi quendā fuerint calorem nacta.

## CAP. XXI.

**P**Lerique odores similiter saporibus nos afficiunt. Si quidem acida omnia, & præcipuè acetum, similiter odoratum gustumque; mouet. Tum acria quoque ueluti, allia, cepæ, & ipsa non minus quam gustum, odoratum offendunt, mordicantque; Itaque nonnullorum corporum, etiam non gustantes, qualitatem cognoscimus, ueluti fimi: proinde ne gustare quidem aggredimur, quod maxima fides odoratui habeatur. Quin etiam si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos suo offendant, ne gustare quidem illa dignamur: fereque; in omnibus mutuò consentiunt odoratus & gustus. Atramen in odore suauissimis, ueluti rosa, plurimum sanè dissident. Tantum enim abest ut gustatibus suauia sint, ut amaritudinem non uulgarè exhibeant. Tametsi quod amarum est, nunquam sit odoratum. Siquidem generatio amari saporis ex dulcibus proficiscitur à calore extenuatis: ac proinde amara calidiora simul & tenuiora sunt dulcibus. Porro sensus odoris in cerebri collocatur uentriculis anterioribus: odorabiliūque; uaporoſa est substantia. Ea quippè quæ à corporibus defluunt,

Salis & amari  
saporis discrimen.

Salis genera.

Odores plerique  
quod similiter saporibus nos  
afficiunt.

Amara odorata non esse.

Odoris sensus  
in cerebri uentriculis anterioribus collocari

¶ ¶ ¶ ¶



Odorabilem  
est vaporosam  
substantiam.

Odoratum omne  
non esse suauem.

aeri ambienti permista, in cerebrumque; per narium in-  
spirationem delata, sensum mouent. Recta ergo ratio-  
ne odorata omnia eadem & calida sunt quadantenus,  
quum uaporum copia à calore excitetur. At non  
quicquid odoratum est, suaue continuò erit. Siqui-  
dem non omne id spiritui contento in uentriculis cere-  
bri, familiare existit. Iam uerò in beneolentia & gra-  
ueolentia odorabilem pleraque; reducimus: appellan-  
tes beneolentia quidem proportionem quadam ad ea  
quæ linguæ sunt dulcia: graueolentia autem, ad ea quæ  
omnino insuaui. Cæterum ab ijs quæ exactè, tum sal-  
sa, tum acerba sunt, aut nihil, aut omnino parum ua-  
poris defluit.

### C A P. XXII.

Odor non per-  
inde ut sapor  
sensibilium tem-  
peries indicat.

Rosæ iesse ex-  
crementa tria.

Rosæ partium  
excrementa.

**I** Taq; haud solida res est, ex odore de sensibilibus  
temperatura conijcere, perinde ut gustu: nimirum  
ob substantiarum inæqualitatē & differentiam. Etenim  
quæ odore carent, crassam quidem essentiam obtinēt:  
cæterum quæ sit eorum in calore & frigore cōstitutio,  
id nondum constat. At quæ odorata sunt, tenuia utiq;  
sunt quadantenus, calidaque. Porro quum in rosæ succo  
(præter ipsius rosæ corpus durum terreumque;) tria ex-  
crementa inueniantur, unum crassum, quale est in ui-  
nis fæx: alterum aerium, quod uini flori respondet: ter-  
tium aqueum, quod in omnibus bullitionē corruptio-  
nemque; molit: certè gustus id genus omnia diiudicat.  
Siquidem rosam gustantibus aliud quidem acerbum  
est: id quod terreum ut sit, & crassum & frigidum, est ne-  
cesse: aliud uerò amarum, quod tenue est & calidum:  
tertium denique; aqueum, necessariò quidem frigidum,  
sed in tenuitatis crassitudinisque; oppositione, quodam-  
modo extremorum, quorum uires exoluit, mediū. Hec  
itaque omnia de succo rosæ per gustum ipsum discer-  
nas: at per odorem, haud æquè: quum non perinde om-  
nes eius partes euaporent, nec perinde sensum moue-



ant. Multò minus ex coloribus de uiribus medicamētorum licet ratiocinari: quum in coloribus singulis calida, frigida, humida & sicca reperiās. In particularibus autem seminum, radicum, aut succorū generibus aliquam ex coloribus, licet sumere indicationem. Vt si dicas cypam, scillam, uinum, quātò fuerint albidiora, tantò & minus calida: quæ uerò subflaua fuluaq; calidiora. Idem usu uenit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, ieros radici, asphodiliq; & alijs compluribus. In quoq; enim genere in uniuersum fulua, flaua, rubraq; omnia albis sunt calidiora.

Colores ad medicaminū uires dignoscendas parum conferunt.


Calidiora sunt albis fulua, flaua, rubraq;.

Iraq; etsi hinc quoq; coniectura fieri queat, optimū tamen fuerit per experientiam discretam facultates inuenire medicamentorū. Siquidem in hac falli nō possis: licet prius q̃ experientia uirtutem agnoscas, gustus pleraq; indicet, pauculū etiam approbāte ipso odore.

## G A L E N I P E R G A

### M E N I D E S I M P L I C I V M

Medicamētorum facultatib; us. Lib. V.



**S**VNT ergo (quatenus dictum est) qualitates primæ, caliditas, frigiditas, humiditas atq; siccitas. Quæ uerò ab illis denominatur corpora, ea sunt tū cōmunia omnium elementa: tum ea quæ per harum excellentiam, calida, aut frigida, aut sicca, aut humida nuncupantur: tum ea quæ ad conueniēs siue symmetrum generis eiusdem, aut speciei conferuntur: quæq; ad quiduis obuium. Diximus præterea nutrimentum uinci ab eo quod nutritur: medicamentum autem uincere, ac superare alteraq; corpus cuius fuerit medicamētum: idq; aut una

Qualitates primæ quæ sunt.

Nutrimentum uinci ab eo quod nutritur. Medicamentū uicit, alteratq;

Eeee iij



corpus cuius  
medicamentū  
existit.

Simpliciū me-  
dicamentorū ple-  
raque dissimila-  
riū sunt partiū

Medicamentis  
quorū utan-  
tur homines.

Medicamento  
rū tāta in agē-  
do diuersitas  
unde oriatur.

Idiotarū co-  
gnitio quousque  
progrediatur.

qualitate, aut coniugatis duabus, aut uniuersa substan-  
tia, ut complura letalium medicamentorum, nec pau-  
ca etiam amuletorum: tum purgantia omnia, & ple-  
raque eorum quæ attrahentia uocantur. Quæ uerò una  
duabus uel qualitatibus in uniuersum nostrū corpus  
agunt, ea hoc in libro exponemus, hinc sumpta hypo-  
thesi, quod simplicium medicamentorū pleraque dissimila-  
rium sunt partiū, reliqua uera composita, tamen si appel-  
lētur simplicia, quod cuiusmodi sint, talia natura sint, nec  
quicquam ex nostra industria assumpserint.

### C A P. I.

**M**edicamentis frequenter utuntur homines, tum ob  
alterationem quam qualitatibus primis moluntur,  
dum uidelicet calfaciunt, refrigerant, humectant,  
& siccant: tum ob eam quæ à secundis perficitur qua-  
litatibus, quarum nimirum ratione, alia emolliētia di-  
cuntur, alia tendentia, alia laxantia, atque alia denique ali-  
ter nominantur. Siquidem quum particulatim unum-  
quodque medicamentorum non pari modo ex illis pri-  
mis qualitatibus suam temperaturam acceperit, inde  
fit, ut hoc quidē ex his uim laxandi, tendendi illud, aliud  
aliam facultatem sortiatur. De quibus sanē siue secun-  
dis, siue tertijs facultatibus agere in hoc quinto com-  
mentario est animus. Porro ad simplices intemperies,  
facilesque affectus pellendos, sæpe natura duce, ple-  
rique idiotarū ipsa remedia inueniunt. At phlegmones,  
scirrhi, cedematis, erysipelatisque, nullū ex illis sibi re-  
medium ducit peruestigandum: tanquam unumquodque  
eorum maius iam sit, quam pro captu hominis plebei, ac  
scientiam requirat uenerabiliorem, quam Medicinam  
appellant, sicuti & illius professorem, Medicum. Atque  
hucusque & ipsi procedunt, ut sciant ulcus caui imple-  
ri carne: sordidum purgari debere: æquabile cicatri-  
ce induci: non tamē norunt, quid carne impleat, quid  
purget, quid cicatrice inducat: sed ea inuenire, unius



opus est Medici. Ceterum quā ferē numerari nequeāt omnes particulatim vires medicamentorum, si secundum singula quæ ab eis perficiuntur, dum huic aut illi morbo auxiliantur, imponamus ipsis deflexa nomina: multò sanè præclarius uideatur, missa omni, prolixitate cōmodis speciebus compositas definire ipsorū facultates compēdiosissimè, sub quibus cæterę omnes quę dici possunt, comprehendunt. Vt si dixerimus non puris mouendi, aut doloris sedandi in triticę farinę caplasmate, exempli gratia, facultatem inesse, sed modicè tum humidam, tum calidam.

## CAP. II.

**Q**uæ in cōmentario hoc discutienda ueniunt, iis quæ in alijs exposita sunt, magis ad medēdi rationem pertinent. Igitur ab emollientibus & pus mouentibus orsi, dicamus utraq; calida & humida existere: cæterum hæc quidem, ceu simillimū corpori in pus mouendo calorem producere, absq; ulla existentis in eo humiditatis aut consumptione, aut adiectione: illa uerò, ceu maiorem q̃ pro natura accēdentia, nōnihilq; humiditatis contrahentia. Est autem suppuratio idem quod in pus motio.

## CAP. III.

**S**ed nec de emollientibus medicamentis, nec de ipsa emollitione, simpliciter loqui licet, quādoquidē nec de corpore duro, uel molli. Siquidem partim absolute durum dicitur, ut terra: partim per excessum, ut unguis: partim ad symmetrum sui generis uel speciei, ut elephas nimirū ad Herculem: partim ad quiduis obuium, ut Diogenes ad Aristotelem: ac de molli pari iudicio. Omisitis tamen significatis cæteris, de mollibus durisq; ut ad cutem hominis temperatissimi, contemplerur, quam sanè regulam & mensuram statuimus, omnium quæ ita dicuntur. In idem autē recidit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic durum

Eccc iij

Medicamentorum vires particulares numerari non posse

Pus motio ab emollientibus quomodo differant.

Suppuratio quid.

Cutem hominis repperatissimi esse regulam secundum quam omnia diiudicantur



Tactus homi-  
nis temperari  
medius est om-  
niū tangibiliū  
Durum quid.  
Molle quid.

Mollitio quid.

Durius quibus  
modis reddat  
aliquid.

Molliendi ra-  
tiones plures.

Cedentia oīa  
nō eē mollia.

Renitentia quē.  
Induratore va-  
riæ medendi ra-  
tiones.

molleq; appellites, quādoquidem medium quoddam est tactus noster: uti & Aristoteli uisum est, & Plato quoq; sensisse uidetur, ubi ait. Dura quidē, quibus caro nostra cedit: mollia uerò, quæ cedunt carni. Quod uerò in comparatione ad quiduis obuium durum ac molle est, id in eo quod magis minusq; cedat, iudicari uidetur. Porro corporum præter naturam induratorū ad statum naturalem redditus emollitio est.

#### C A P. IIII.

**V**erū quum uariē quidq; efficiatur durius, nempe aut siccescens, aut concrescens, aut nimia repletionē, sic ut uehementer tendatur: aut deniq; aliqua coniugatione: sequitur ut & propria suaq; cuiq; emolliendi sit ratio. Cæterū quod in se cedit, molle est, si quidem corpus id simplex fuerit. Nam quod ex pluribus constat, ac sese inuicem contingentibus, ut tritici aceruus: aut inuicem implicatis, ut lana, simul & cedere potest, nec tamen esse molle. Contrā, in ijs quę summe plena sunt, ut utres, neutrum latus in se cedit: nec tamen quod continetur est durū, sicuti neq; id quod continet, q̄ antea durius, etsi sit tensius affectum. Ac talia sanē non dura, sed renitentia appellamus. Vt autē non est una iduratorum natura, ita neq; una medela. Nam quod à siccitate iduratum est, humectari postulat: qđ à congelatione, excalfieri: quod à repletionē euacuari: qđ à siccitate simul concrectioneq; humectari simul & icalescere, p̄ ea. s. quę rātō sunt calidiora et humidiora, quātō ipsa intēperies fuerit frigidior et siccior: qđ à cōgelatione simul & repletionē, pariter & calfieri & uacuari. Siccantur porrò corpora citra congelationem, tum in ualidis exercitijs, tum in sole feruenti, tum in ingenti inedia, tum in ardenti febris, & medicamentis quę ita siccant, ut non refrigerent. Congelantur à uehementi duntaxat frigore: sicuti & implentur à largi tantū humoris affluxu. At siccantur simul & congelantur, co-



euntibus quæ simul cōuenire possunt causis: ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoq; replentur simul et congelantur ab influxu frigido ac partis refrigeratione. Frigoris rursus causa triplex est: una, à foris incidentibus: altera est propria particulæ patientis temperies: tertia ab influente in ipsam humore prouenit. At emollientia pharmaca peculiariter congruunt ijs, quæ concretione induruerunt, magis q; si in eis collectus sit humor præter naturam, ueluti in scirrhis. Nam si à siccitate induruerint, humectanda, non emollienda sunt. Similiter quæ sunt impleta, nō molliri, sed euacuari postulant: id q; aut refrigerantibus, aut calfacientibus, aut resiccantibus. Vacuant siquidem frigida repellendo, simul q; cum calore exprimendo uaporis plurimū: excalfacientia autem, humorem contentū discutiendo in uaporem: quæ uerò propriè sicca appellantur, in halitus digerēdo: id q; aut ebibēdo humores, aut totam alterando particulam. Porrò oleum & aqua calida humectant simul & calfaciunt, id q; multò magis, in unum coeuntia, q̃ si singula per se adhibeantur. Idem efficit eduliorū qualitas si similiter habeat. Quæ quidem ob id fami caninæ auxiliatur, q̃ affectus is sit frigiditas siccitati coniuncta. Cæterū cataplasma ex farina triticea in tēperatis naturis pus mouens, nec naturalem partium humiditatem minuit, nec quicquam illam adauget, sicuti nec calorem intendere potest, nec hebetare, sed tantū illius substantiam augere. Id igitur genus medicamēta humida & calida dicimus, ceu similem habentia nobis temperiem, quæ calida existit & humida.

## C A P. V.

**M**edicamenta igitur quæ pus mouent, substantiam similariū particularum secundum naturam se habentium, tueri potius q̃ alterare sunt nata, quā nimirum eis similem temperaturam obtineant: humidi-

Frigoris causa triplex.

Emolliētia quibus cōueniāt.

Vacuationum modi diuersi.

Fames canina qualis sit affectus.

Cataplasma- tis e triticea farina vires.

Pus mouentia tueri nō imutare substantiam ptis sunt nata.



Alteratio in  
animalibus tri-  
plex.

Alterationi na-  
turali, pter na-  
turā, & medie,  
quæ insunt.

Cōcoctio quæ  
fit ab innato ca-  
lore, ab exter-  
no calido iuua-  
tur.

Pus mouentia  
qualia esse de-  
beant.

Pus mouēs me-  
dicamen equa-  
lem habet ca-  
lo rē, cū corpo-  
re, in quo pus  
mouetur.

Pus mouentia  
esse calida &  
humida.

tatem autē ipsam quæ in uacuis hæret, atq; adeo etiā  
contusam carnem imutant. Etenim quum tres in ani-  
malium corpore fiant alterationes, una planè secundū  
naturam est, qua cibi in cremorē nutritioni aptum uer-  
tuntur: altera contraria huic, præter naturam, qua cō-  
putrescunt omnia: tertia ex utraq; mista, & media est,  
partim qdē, cum prima illa cōicans: partim autem cū  
hac secūda, quam præter naturam dicimus. Siquidem  
alterationi secundū naturam, duo hæc insunt, \* ut &  
ex familiari materia animantis naturæ alteratio fiat, &  
materia ipsa à calore ingenito superetur. Ei uerò quæ  
præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio ac-  
cidit, & ad nihil utile. At media earū, quæ comitat sup-  
purationes, ab ingenito quidem calore fit, sed non pla-  
nè uincente. Præterea nec ex materia prorsus benigna  
peragitur, nec etiam omnino aliena. Itaq; quemadmo-  
dum naturales alterationes, quæ ab innato calore pro-  
ueniunt, à simili iuuantur extrinsecus (nam quid æquē  
concoctioni uentris conferre nouimus, q̄ illi humanū  
corpus admotum: unde nonnulli tum pueros, tum ca-  
tellos, per quietem uentri imponūt) pari modo & quæ  
in mouendo pure conspiciūt. Cæterū tale esse debet  
quod mouendo puri adhibetur medicamentum, qualis  
est in naturis temperatis calor natiuus. Quare si iusto  
calidior natura fuerit, in eo corpore, medicamen quod  
pus mouebit, tantò oportet sit temperato calidius, quā  
tò & natura eius tēperatā in caliditate exuperat. Qua-  
re cuiusq; singulatim hominis suum proprium est mo-  
uendo puri medicamentum. Explorandæ autem sunt,  
uniuersę facultates medicamentorum iuxta hominem  
optimè temperatum: quo quidem proposito canone,  
quæ mouendo sunt puri, calida & humida dicimus, q̄  
illius calidæ & humidę tēperatæ sint consimilia: sicuti  
calidiora multò, quæ indurata emolliunt.

C A P. VI.



**I**nitium autē sumit induratorū affectio ex fluxione uiscida & crassa, paruis particulæ poris impacta. Digesto uerò per halitū quod in ea fluxione est tenue & subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac ueluti concreto, uocata sequitur scirrholis. In qua quidem quoniam cum frigiditate humor redundat superfluus, iccirco etiam cōpositam eius esse oportet medellam: ob refrigerationem scilicet excalfacientia poscente affectu: ob superuacaneam autem humiditatem, uacuantia. Quia uerò quæ immodicè, tum calfaciūt, tum siccant, fluxionem ipsam magis impactam reddūt, manifestum est sola ea quæ nō admodū calfaciunt, quæq; non magnoperè exiccant (uocant enim talia emollientia) eiusmodi affectus posse sanare.

## C A P. VII.

**Q**uapropter calida sunt id genus medicamenta. nec admodum sicca, à pus mouentibus eo dissidentia, q̃ calidiora sint & sicciora. Illa enim cognatā ac simillimam corporibus nostris caliditatē possident: emollientia uerò, licet ualidiorem habeant, non tātā tamen, ut attractionis uolentia desiccant reliquū. Preterea, quæ pus mouent, humorem qui præfuit in partibus induratis conseruant: emolliētia autem, paulum quidem eius absumunt. In summa, illa quidem, quantitate potius q̃ qualitate caloris agūt: quæ uerò indurata molliunt, qualitate potius q̃ quātitate. Itaq; si in parte quæ suppurationē indiget assidui impositas liceret seruare manus, celerrimè suppuratio perficeretur. Porrò inter emolliētia cōnumeratur bdellium, styrax, galbanum, ammoniacum thynniama, medulla, tum ceruina, tum uitulina, adeps caprinus, taurinus, & quæ eiusdem sunt generis.

## C A P. VIII.

**Q**uinetiam q̃ emplasticum esse debeat id genus medicamentum, ut exactè puris generatiuum

Scirrhus quomodo fiat.

Scirrhum tollētia qualia sint.

Emolliētia et pus mouētia quō differant.

Pus mouētia humore qui præfuit in partibus induratis cōseruant.

Manibus assidue apposis perfici suppurationem celerrime.

Emolliētia.

Pus mouētia debere cē emplastica.



Pueris inesse  
plurimū hali-  
tuosi spiritus.

Innatū calidū.  
Spiritus esse,  
aut substantiā  
animæ aut pri-  
mum illius in-  
strumentum.

Puri mouendo  
quæ cōgruant.

fit, liquidò constat. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstrui est necesse, quo uidelicet halituosos transpiratus includant. Siquidem et cataplasmata quæ aut detergētia, aut ualidius excalfacientia halitus diffilari permittunt, exiccant quidem, sed pus non mouēt. Talis est hordeacea, cicerum, fœnigræci, fabaceaq; farina: amplius etiam grina, eruina, panici, lupinorum, mili, omniumq; similiter exiccantium. Per detergētia quippè, q̄ meatus referent, particulæ calor euolat: ab immodicè autē calfacientibus, etiā natiui caloris substantia minuitur, sed qualitas ipsa intenditur: quum tamen halituosus quidam exuberansq; spiritus desyderetur, caliditate tamen cōmoderatus. Qui quidem quū in pueris copiosissimus sit (quod nimirū intellexit Hippocrates, crescentia dicens plurimum habere calidi innati) eorum omnes actiones naturales adauget. Verū nihil prohibet, sanguineam substantiam, simulq; aereā, unā cum spiritu, calidum inaudire innatum. Qui spiritus in omnibus animantis cōtensus partibus, licet nō undequaq; sui similis, si non sit essentia animæ (ut Stoici quidem existimant) at certè primum eius est instrumentum. Continetur autem in spatijs inanibus quædā ueluti spiritus ipsius materia, etiānum mutationē exposcēs leuiculam, ut spiritus innatus euadat: nihiloscius tamen conducens admodum ad naturalia opera: ex quibus unum est ea quæ in pus fit conuersio: quum in ipsa quædam etiam perficiatur concoctio. Quum igitur aliquid concoquere nobis consilium est, quāplurimum spiritum intus seruare oportet: nō autem discutere, qd faciunt illa quæ nuper cōmemorauimus. Porro omniū ad puris generationem aptissimum est, ex ijs quidem quæ irrigantur, aqua temperata, aut hydrelæum: ex ijs uerò quæ persunduntur, oleum temperatum. At ex ijs quæ ex hydrelco illinunt, farina triticea, & panis ipse,



qui uidelicet modicè est coctus. Nā qui plurimum coctus est, quodāmodo siccior est, aptusq; phlegmonis quæ egrius concoctionem admittunt; qui uerò minus, ijs quæ feruentes sunt. Et sanè quod ex pane cōficitur cataplasma, difficulter coctioni cedētib; phlegmonis idoneum est. Siquidem panis, tum sal, tum fermentum miscerur. Quod uerò ex triticea farina præparatū est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiam triticeæ farinæ quæ pura est, tum panis quoq; qui purus est, puri mouendo congruentior existit: quum furfur & minus sit calidum, & magis desiccat. Farina autem pura, humida est & calida: qualia certè ad pus mouendum conferunt. Itaq; medicamenta quæ phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendum conducunt, uti adeps suillus & uitulinus. Nam taurinus caprinusq; illis acrior existit: quam ob rem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus, magis congruit. Est & adeps gallinaceorum phlegmonis coquendis familiarissimus, magisq; etiam anserum: quodāmodo tamen ad digerendum potērior. At agrestium omnium animalium adeps multò acrior & siccior est, q̃ domesticorū, maximeq; pardalis, atq; leonis. Quare horū nullus mouendo puri est idoneus. Porro pus mouent & pix, & resina: ad feruentes quidē phlegmonas, ex rosaceo: ad frigidiores uerò, ex calfacientium aliquo oleo liquatq; utputà cicino, raphanino, ueteri, aut sicyoneio. Quum autē cera per se minus sit calida, quā ut pus mouere possit, solis feruētibus phlegmonis apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. Igitur quæ pus mouent, naturā modicè excalfaciente & humectantem sortiuntur. Cæterū medicamen puri mouendo idoneum, facultate quidē est tale: ubi uerò corpori nostro est admotum, sit actu tale, siue energia. Ergo scirrhum uocant tumore præter naturam, doloris uacuum, sed durum: interdum etiā sen-

Furfuris facultas.

Adipis differentia.

Pus mouentia modice excalfaciunt, humectantq;.

Scirrhus quid, & unde gignatur.



Scirrū qui gi-  
gnant succi.

Emollientia q̄

Cancrofos scir-  
rhus ab usu e-  
mollientiū ex-  
asperari.

Scirrhis a vi-  
scida pituita  
ortis, q̄lia me-  
dicamenta cō-  
ueniant.

Emollientia.

Sal emollienti-  
bus iniciēdus  
non est, q̄ exic-  
cet valde.

Emollientia de-  
bēt esse etiam  
emplastica.

Indurātia sunt  
frigida & hu-  
mida.  
Solani natura.

sus expertem. Oritur scirrhus ex humore crasso & fri-  
gido, quales sunt duo duntaxat: bilis uidelicet atra, &  
superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhusi om-  
nino aut pituitosae substantiae sunt, aut atrabilariae, aut  
ex utraq; misti. Propriè autem emollientia dicuntur,  
quae medentur scirrhusi tumoribus ex pituita exicca-  
ta, crassisq; humoribus ortis. Consueuerūt enim n̄ po-  
tissimū in musculorum capitibus gigni. At quae ab  
atrabilario succo duruerunt, cancrosa sunt omnia, &  
ab emollientibus medicinis exasperantur. Sed his  
quo pacto prospicere oporteat, in commentarijs  
methodi medendi docebimus. Quae uerò à lento cras-  
soq; humore concreto indurata sunt, calida in secun-  
do aut tertio ordine: sicca autem in primo medicamen-  
ta desyderant. Sed quum non exigua sit in corporibus  
induratis maioris minorisq; latitudo, necessum est me-  
dicamentorum illis medentium non paruam etiam la-  
titudinem esse. In uniuersum autem ex emollientibus  
medicamentis, praestantiora sunt, quae recentia existūt.  
Siquidem inueterata, ualidius q̄ expediat exiccāt. Por-  
rò radix althae & cucumeris agrestis, nonnullq; aliae  
plantae, partim in oleo, partim in aqua decoctae, emol-  
liunt: sicuti maluae agrestis folia, tum cruda, tum cocta.  
Atq; hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus  
adeps inueteratus, cui salis nihil indere oportet, sicuti  
nec emollientiū ulli. Valde siquidē sal exiccat. In sum-  
ma uerò, quaecunq; alia emollire possunt, calida sunt  
ex secundo, & interdū ex tertio ordine: leuiter uerò sic-  
ca. Sed & his etiā emplastica uis insit oportet, non se-  
cus q̄ pus mouentibus: at quae nō perinde meatus ob-  
struat: q̄ magis, q̄ illa, euacuare sint nata.

### C A P. IX.

**A**T indurantia frigida sunt, & humida, ut semper-  
uiuum, portulaca, psyllium, lenticula palustris,  
solanum: quanquam hoc, in medio exiccantium &



humectantium consistit, duplicē in se habens substantiam, nempe terrenā & aqueam. At uerò si quid simul & refrigeret & desiccet, sanè & ipsum indurabit omnino: improprie tamen, quum concretionē potius quā euacuatione induret corpus. Illa siquidem potius siccitas est, ac proinde non emolitione, sed humectatione curatur: quemadmodum tensio relaxatione, & relaxatione tensione.

## CAP. X.

**P**orrò laxatio in articulis fit, humectatis immodicē quę circa eos sunt ligamentis, pariter & tendinibus: tensio uerò, non etiam simpliciter: sed aut plusculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrho. In cute autem non tantum ita, sed musculis quoque subditis quoquo modo in tumore sublatis: quemadmodum etiam in inflammationibus accidit. Quā obrem non simpliciter una est species remediorum laxantium: utpotē quum alia humectando, alia calfaciendo, alia emolliendo, quædā uacuando, nonnulla tumores præter naturam purgando, alia etiam per coniugationem, horum quippiam agendo, laxare assolent. Est autem emplasticum medicamentum, quod terrena uiscidaque substantia, minimeque mordaci præditum, illitum meatibus corporis tenaciter hæret.

Laxatio ubi fit & quomodo.  
Tensionis cæg.

Laxantium species varix.

Emplasticonum essentia qualis

## CAP. XI.

**Q**uod emplastico contrarium est, dici queat poros repurgans, & infarctu liberans: estque nec uiscidu, nec mordacitatis expers, sed subtile et nitrosum. Nam in ratione tantum maioris, ac minoris differunt, tum emplastica ab ijs quæ sordes nutriunt, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quæ poros obstructos referant, subtiliora extergentibus sunt, emplasticisque contraria. Sunt autem hæc, tum nitrosa, tum amara. Cæterum ad extergenda ea quæ in superficie sunt, requiritur ut cuti extime imposita medicamenta ipsa, solā exactamque

Emplastici oppositum quale



Extergētia cui  
tim quidē, de-  
bent esse exa-  
cte nitrosa, uis-  
cera autē, uel si  
aliquid astrictio-  
nis fortiant, ni-  
hil nocuerint.

Absynthium  
intus repurgat  
meatus, foris  
nequaquā.

Medicamenta  
ad crassos vi-  
scidosq; humo-  
res expectorā-  
dos cōmoda.

Obstructiones  
iecoris et liēis,  
quę potissimū,  
tollant.

nitrosam qualitatem possideāt. At intrò in corpus as-  
sumpta, etiam si adiuncta sit quedam astrictio, possint  
tamē sic quoq; magnos purgare abstergereq; meatus,  
cuiusmodi in uasis consistūt Nam foris meatum exi-  
guitas prius ab astrictione occlusa, q̄ probè queat ex-  
purgari, non etiam inde in altum abstergentem sub-  
stantiam recipit, nec expurgatur. At quæ circa uen-  
trem uisceraq; sunt partes omnes, quum maximos  
in se habeant meatus, maius accipiunt et commodum  
ex uasorum corroboracione, quàm propter osculo-  
rum exiguitatem ledantur. Proinde intus absynthium  
repurgare potest, foris nō potest: quippè quod ex ama-  
ra acerbāq; facultate est compositum. Quæcunq; igit  
repereris nitrosa et amara, ea ad purgādos meatus om-  
nes, ualere noueris. At cutis & ulcerum sordes, non  
hæc tantū, sed & uiribus minora possunt auferre, qua-  
lia sunt dulcīa quę tenuium sunt partium. Porrò scilla,  
iris, nitrum per se, aphronitrum, spuma nitri, seriphon,  
abrotonū, cū cibo potuq; assumpta, crassos uiscidosq;  
humores extenuandi uim obtinent. Quam ob rem len-  
tis ac pituitosis thoracis pulmonisq; humoribus, aut  
purulētis & incidendis, et extenuandis, & educendis,  
aptiora inuenire alia præ istis medicamenta non pos-  
sis. His ipsis & iecinoris obstructiones expurges, &  
modicas etiam lienis. Nam quę maiores sunt, uehemē-  
tiora desyderant: nempe capparis corticem, radices ta-  
marices, scolopendrion, & scillam, & asplenon. Sed ta-  
men istis utendum est ad iecur quidē, ipsis per sese dū-  
taxat: ad lienem uerò, mistis aceto, aut ei incoctis: ad  
thoracem pulmonemq; melicrato, ptisang, oxymeliti,  
aut dulcium uinorum cuipiam.

## CAP. XII.

**Q**Uum autem plurimam urinam mouere est cō-  
siliū, non admodum dictis utendum est phar-  
macis, sed quæ acriora sunt, & magis excalfaciūt. Est  
enim



enim omne acre calidū: cuius generis sunt semen apij, petroselini, fœniculi, dauci, agrioselini, smyrnij, ipsumq; seseli, ammi, phu, meon, asaron, & cum his acorron: à quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur & secernitur: nempe seroso & tenui seorsum segregato ad renes, crasso uerò in sese coeunte. Quam obrem puris ex thorace expuitioni ea omnia aduersantur; quum nimirum excalfactoria exiccatoriaq; sint, necnon secretoria & coactoria. At quæ expui debent, mediocrem caliditatem desyderant; ne uidelicet impē se exiccentur: ac proinde medicamenta illis congruentia, eiusdem utilitatis gratia, cum sorbitiunculis potionibusq; exhibentur. Quæ uerò renes expurgant, & ipsa incidendi uim possidentia, larga humiditate non indigent. Porrò quæ callosas consistentias sunt incidere idonea, admodum quidem incidunt, sed minimū sanè caloris possident. Caliditas quippè callum pœron ue ginit: non incidit, nec diuidit. Cæterum quæ & incidunt & mediocriter calida sunt, meliora existunt; ut radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, tum ochra, & uitrum uistum, & ex scilla confectum acetum, & consimilia.

## CAP. XIII.

**Q**uæ cutis meatus referant, ea rarefacientia dicimus: quæ uerò uasorū oscula, aperientia. Quin & illis contrariorū, quod poros contrahit, condensans dicunt; quod autem osculum claudit, occludēs siue obstruens nominant. Cæterum rarefacientium quidē natura modicè calida est, ac tum minimè siccans, tum tenuium partium; aperientium uerò, tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porrò contrariorum, condensantium quidem, frigida sanè & aquea; occludentium autem, tum frigida, tum partium crassarum. Rarefacit igitur chamæmelum, & althea, quodq; ex ipsis conficitur oleum; nec minus quod ex agrestibus cu

Tomus II II.

Fff f

Acria oīa esse calida.

Diuretica medicamenta quæ.

Diuretica puri ex thorace expuendo aduersantur.

Expuitiōibus q̄ sunt idonea.

Callis incidentis discutientisq; congruentia, qualia esse debeant.

Rarefacientia.

Aperientia.

Condensantia Occludentia.



**Hæmorrhoidas aperiētia.**

cumeribus. Quin & uetus, & cicinum, & raphaninū, ex eadem sunt nota. Aperiūt autem cyclaminus, allia, cæpæ, fel taurinum, unguentumq; irinum & amaricinum, quæ & occæcatas hæmorrhoidas aperiūt. At cōdensantia sunt aqua frigida, semperuium, portulaca, tribolus uiridis, psyllium, auricula muris, lenticula palustris, ac deniq; quæcunq; refrigerant, sed non astringunt. Proinde mandragora, cicuta, altercū, papauer, si eis quis modicè utatur, condensandi uim obtinent: si liberalius, non modò condensandi, sed stupefaciendi, & necandi. Occludunt porrò meatus omnia quæ ualidè astringunt, nec tamen acrimoniā habent adiunctā: quum nimirum essentia talium sit simul terrena & frigida. Medicamenta uerò quæ frigida quidem sunt aut æquè, aut amplius: sed substantiam sortiuntur aqueā, ea inquā debiliter & contrahunt & constringūt: uidelicet propter ipsam molliciem: quare condensantia potius q̃ obstruentia dicuntur. Quippè quicquid ualenter tum constipare, tum constringere debet, robur quiddam renitens, & durum, habeat oportet.

C A P.

XIIII.

**Rarefacientia.**

**Colliquantia.**

**Anastomotica**

**Q**Uæ itaq; citra molestiā excalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Si uerò non modò calida fuerint, sed etiam consistentia crassa, si quidem uehementia sint, & caustica, hoc est urentia, ignis instar corpus colliquant, & sæpe escharas ritu cauterij inducunt. At si debilius q̃ ut urere possint, excalfaciant, anastomoticam, siue aperiendi uim obtinēt. Quod autem causticū, non tamen uehemēter, est, præterea essentia tenuioris, id prorsus ab omni mordacitate aberit: aut cum exiguo, tum dolore, tum morfu eliquabit partes carnosas. Nam qd nō confertim alterat, ut quæ uehementer sunt calida, qd q; non agrè penetrat, ut quæ crassæ sunt essentia, ea latentem actionē obtinent. Porro alterationem subitæ confertæq; mutationes, sicuti



& penetrationū quę uiolentę sunt, quales proficiſcun-  
tur à causticis, & escharoticis, maxime sensibiles sunt.  
Cæterum de quibus nunc agimus, minimè faciunt es-  
charas, uocanturq; putrefaciētia, licet improprie, atq;  
ob symptomatis tantū similitudinem: quā ab utrisq;  
nullo doloris sensu corruptio fiat. Nā quę uerè putrefa-  
cientia sunt, humectant simul & calfaciūt. Multis autē  
modis corrūpi quid potest. Corrūpūtur siquidem plus  
nimio refrigerata, aut excalfacta, aut humectata, aut  
exiccata. Non tamē quicquid corrumpitur compute-  
ſcit, sed quibus id cum foetore accidit. At medicamēta  
de quibus nūc sermo est, putrefaciētia, q̄lia, sunt auripig-  
mētum (q̄d arsenicum uocāt) sandaraca, chrysocola,  
dryopteris, pityocāpe, & aconitum, omnia colliqua-  
re sunt nata, & potissimum carnē tenellam, idq; absq;  
dolore. Ex quibus quidem nōnulla imbecilliora cate-  
ris ut uſtę petrę flos, extimā tantū superficiem, quā  
contigerint, exedendo, ulceribus excreſcentibus cica-  
tricem inducunt: quāquam medicamēta quę uerè ad  
cicatricem perducūt, nec detrahēre, nec liquare carnē,  
sed durare, & ſiccare sunt nata: ut alumē, galla ompha-  
citis, æs uſtum, ac maximè lotū, cum eisq; fructus spi-  
næ Ægyptiæ, ſiccaq; mali granati putamina.

## C A P. XV.

**I** Digitur est in planis ulceribus ad cicatricem du-  
cendis consilium, ut caro alteretur, fiatq; cutis: id  
quod perficitur per ea quę illam contrahere, constri-  
gere, constipare, densare, ſiccare, & in callū cogere ua-  
leant: quum nimirum cutis, uelut in callū durata caro  
ſit. Ea ergo medicamenta quę ſic agere poſſunt, pri-  
mariō proprieq; dicūtur epulotica, siue ad cicatricem  
ducentia: cætera uerō quę exedunt carnē, ſecundariō,  
& per accidens: ſicuti & ea quę absq; aſtrictione de-  
ſiccandi uim habent mordacitatis expertem. Nam &  
hec quoq; ex accidēti cicatricem inducunt: cuiusmodi

Corruptionis  
modi diuerſi.

Putrefaciōnē  
forter neceſſa-  
rio accedit.  
Putrefaciētia  
q̄ carnē absq;  
dolore liquant

Cicatricē indu-  
centia medica-  
menta quę.

Epulotica quę  
dicūtur primo  
& quę ſecun-  
dariō.

F f f f ij



utiq; medicamentum est, myrrha, lithargyrus, ostreū,  
& diphryges combusta: quandoquidem & ipsa cicat-  
ricem sæpe inducunt illita. At uerò medicamenta ci-  
tra morsum mediocriterq; abstergentia, cavitates ul-  
cerum implent.

## C A P. XVI.

**P**ORRò attrahentes facultates sunt quæ ex alto uehe-  
mentius extrahunt:repercutientes uerò, quæ in al-  
tum occurrentes sibi succos repellunt. At essentia illis  
quidem calida est & tenuium partium:his uerò frigi-  
da, & crassarum. Attrahit enim perpetuò calidum: re-  
pellit uerò frigidum. Verùm quod calori iunctam par-  
tium tenuitatem sortitur, trahit uehementius: quod au-  
tem crassitudinē frigori, uiolentius repellit. Atq; astrin-  
gentium quidem nota est essentia. Attrahētium autē,  
alia spōte est nata, ut dictamni, propoleos, thapsiæ, sa-  
gapeni, succiq; cyrenaici & Medici essentia: alia uerò  
\* à putredine exasperante suam ducit eriginem: qua-  
lis tum fermēto, tū pforico inest. Quòd si fimis quoq;  
ex putrefactione generatio constat, utiq; omnes attra-  
hendi facultate pollebunt: sed non parua illis differētia  
inest. Nam columbinus admodū attrahit. Ex æquo au-  
tem utrinq; ab eo recesserunt, ad calidius quidem anse-  
rinus: ad frigidius uerò gallinaceus. Hoc etiam magis  
uincuntur humanus & suillus. At canum stercus simi-  
le est medicamentis extergentibus, maximè si uescantē  
ossibus. Crocodilorum autem stercus magis etiam id  
perficit. Est & aliud attrahentium medicamentorū ge-  
nus, quod qualitatē familiaritate attrahit: id qđ aliud  
est nihil, qđ totius essentiæ similitudine: ceu quæ nutriū-  
tur, familiaria nutrimenta attrahunt. Talium enim me-  
dicamentorum sunt purgantia omnia, & amuletorum  
nonnulla. Cæterum calida ut sint id genus omnia est  
necesse. Quinetiam, inter ea quæ essentijis similia sunt,  
quod calidius fuerit, id potentius attrahet.

Attrahit calid.  
Repellit frigi-  
dum.

Attrahētium es-  
sentia duplex.

Fimus omnis  
attrahit.

Stercorū diffe-  
rentiæ.

Attrahentia si-  
militudine es-  
sentia.

Calidiora tra-  
here potētius.



SIM. MED. FAC. LIB. V. 85  
CAP. XVII.

**I** Am uerò facultatum alexipharmacarum natura est duplex. Quædam siquidem alterant: quædam euacuant uenenum lædens, aut deleterium medicamentum. Alterant igitur una qualitate, idq; rōne cōtrarietatis; aut duarum coniugatione; aut deniq; tota substantia. Euacuant totius substantiæ similitudine, & caliditate subtilium partium. Cæterum alexipharmaca medicamenta, sanè facultate sunt media inter corpora quæ oblæduntur, & medicamenta lædentiā: ut uidelicet eadem sit proportio corporis, ad facultatem alexiteriam, quæ illius ad deleteriam. Quamobrē omnia propèrdum quæ deleterijs aduersantur medicamentis, si largius sumpta fuerint, grauitèr animantis corpus offendunt. Quapropter ea exhibeantur moderatione, ut nec copia nimia corpus oblædāt, nec exiguitate sua à deleterijs uincant. Euacuatur autem omne deleterium uenenum à foris impositis medicamentis, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudine. Quum igitur omnia deleteria medicamenta aduersissima secundum temperiem sint corporibus quæ ab ipsis læduntur, certè si à similibus tēperie medicamentis uacuentur, erunt utiq; & hæc corporum naturis contraria: ut sunt haud dubie aliqua ex parte contraria, non tamen adeò ut interimant, sed in corporis perperientis, & medicamenti lædenti medio librent.

Alexipharmacarum facultatum natura duplex.

Alexipharmaca esse media inter oblæsa corpora, & lædentiā medicamentā.

CAP. XVIII.

**A**T facultas quæ uerè & est & dicitur anodyna, eorum est, quæ primo ordine excalfaciunt, tenuemq; essentiam sortiunt. Quæ uerò improprie anodyna uocatur, ijs medicamentis inest, quæ suo ingenti frigore partē stupefaciunt. Est autem stupor paulò minus q̃ insensibilitas, ac sensus priuatio. Cæterum quæ affectum sanando dolorē sedant, nec meritò dici anodyna possunt; nam id est omnium curatium cōmune.

Anodynæ facultatis natura

Stupor quid.

Ffff ij



Anodynorum  
opera.

Anodynis ni-  
hil debere in-  
esse astrictiōis

Anodynorum  
differentia du-  
plex.

Deleteria tota  
substantia quæ

Deleteria quæ  
tate q̄ sunt.

Quæ itaq; re uera sunt anodyna, partium sint tenuiū,  
& calidiora q̄ quæ symmetra sunt, est necesse: ut sci-  
licet euacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, conco-  
quant, & equabile reddant, quicquid partibus doloris  
est causa. Quare nihil prius astrictiōis habeant oportet,  
ne si pars quidem aut affectus exposcāt. Ex quibus  
liquet, q̄ interdum affectionem non iuuabunt, sed tan-  
tūmodo mitigabunt dolorē: quando uidelicet uerē ano-  
dyna dicentur. Interdum adiuuabunt affectum, dicen-  
turq; simul anodyna, & salubria. Igitur medicaminū  
anodynorum quædam ex primo sunt calfacientiū or-  
dine, quæ propriè anodyna dicunt, ut anethinum oleū;  
quædam similiter ut corpus nostrum, qualia sanè pus  
mouentia. Quæ uerò soporem epota inducunt, tempe-  
riem sortiuntur uel summè aduersam hīs quæ reuera  
sunt anodyna. Refrigerant siquidem omnia corpus, &  
sensum eousq; stupefaciunt, ut si paulò liberalius bi-  
bantur, mortem afferant. Ceterū ad usum propositū  
optima sunt quæ desiccant. Quæ uerò existentia frigi-  
da, humiditatis etiam copiam obtinēt, ut cicuta, ea po-  
tui non sunt utilia. Talis est mandragora, excepto eius  
cortice sicco: & altercū præter semen. Sunt tñ & quæ  
nobis tota essentia aduersent. Proinde si uel minimū  
eorum assumptū fuerit, oīno lædat necesse ē: ceu dryo-  
pteris, pityocampe, thapsia, solanū manicum, hydrar-  
gyros: & fungorum nōnulli: præterea salua & fel ani-  
malium uenenatorū. Nam talia omnia genere sunt de-  
leteria, non quantitate. Ac proinde nihil eorum in ale-  
xiterias antidotos indiē, ut solet papaueris succus, myr-  
ra, styrax, & crocus. Nam tamen si quædam horū de-  
mentent largius bibita, quædam mortem inferant, mē-  
sura tamen conuenienti permista alijs, adiuuant. Eo-  
rum porrò quæ mentem lædunt, pleraq; etiam caput  
degrauant, uaporibus ipsum implētia: Sunt quæ id af-  
fligant, oblædentia uentericulum. Cōmuniter uerò ce



rebrū uniuerſa duobus modis infeſtant, aut totius ſubſtantix contrarietate: aut quum una duabus ue quali-  
tatibus illius temperaturam immutant.

## C A P. XIX.

**V**ocabulum hoc purgans, una quidem, eaq; cōmu-  
ni ratione, de ijs omnibus dicitur, quę quouis mo-  
do animalis excrementa expurgant: alia uerò de ijs tan-  
tū enunciat per excellentiam, quę aut per uomitū,  
aut per alui deiectionem, purgationem moliuntur: ita  
ut ab his diuerſi gñis ſint ea quę tum p nares, tum per  
os à capite humores eliciunt. Eiuſdem cum iſtis ſunt  
generis, quę uuluæ admota, ui quadam attractrice il-  
lius excrementa repurgant. Quęcunq; ſiquidem pur-  
gare animaduertimus, ea trahendi uim poſſident, alia  
unum quempiam ſuccum: alia duos, aut etiam plures,  
idq; illis inter ſeſe cōmune exiſtit. Nam quę craſſos hu-  
mores extenuando, aut urinam ciere poſſunt, aut ex pe-  
ctore pulmoneq; eiſciendis excreationibus auxiliari,  
aut menſtruas purgationes ciere, purgant ſanè & ea  
aliquo pacto, uerū antedictis non ſimiliter nuncu-  
pant, ſed alia dicuntur diuretica, alia bechica, alia mēſes  
mouētia, hac re à ſuperioribus diuerſa, q̄ non habeāt  
uim familiarium ſuccorum attractricem, ut illa. Biſa-  
riam autem dicuntur bechica: partim q̄ tuſſim prouo-  
cent: partim q̄ eandem ſedent. Atqui contrarię horū  
ſunt facultates. Alia enim extenuandi naturam habēt:  
alia incrassandi. Atq; extenuandi quidem facultas, in  
calidis & tenuium partium ſubſtantijs ſita eſt: increſ-  
ſandi uerò, frigidis, & craſſarū partiū eſſentijs ineſt.

## C A P. XX.

**L**Actis & ſeminis effectrices facultates ſunt, par-  
tim in medicamentis tantū: partim in alimētis.  
In medicamētis quidem, quum ſuccos pituitoſos ex-  
calfacientes in ſanguinem uertimus: in alimentis autē,  
ſecundū ſubſtantix totius ſimilitudinē: ubi uidelicet

Purgās medi-  
camentū multi-  
plex habet ſi-  
gnificatum.

Purgatiū alia  
vnū alia duos  
trahunt humo-  
res.

Bechica dici-  
bifariam.

humorū corpo-  
ris humani tē-  
peries,

Ffff iij



Lactis temperies.

Lactis gignendi ratio.

Lactis generationem quæ præbeant.

Sanguis est materia mensium & lactis.

Venas esse communes vberibus & matrici

Lacti mensibus quæ gignendis, eadem victus & medicinae ratione desyderari.

boni sunt succi, & humida, & repide calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis est caloris mediocris particeps: plus uero quam mediocris, bilis: sicuti pituita frigiditatis. In medio autem pituitæ & sanguinis lac ipsum consistit: propius tamen sanguinem uersus inclinans. Vbi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mammis conficitur, humectate simul & calfaciente uictus ratione est opus. Si uero quod biliosus fuerit, in primis purgationem ipse sanguis desyderat: mox uictum quem nuper diximus. At si quod pituitosus, medicamenta requirit ex calfacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen exiccantia. Verum inter ea potiora sunt quæ non tantum medicamenta sunt, sed & nutrimenta, ueluti eruca, foeniculum, anethum. Intellego enim ipsas herbas etiamnum uiuentes & humidas: nam quæ siccæ sunt, plus quam par sit & exalfaciunt & desiccant. Huius generis est smyrnion, apium, sion, polion, eaque prius quam exiccentur. In summa uero quæcunque calfaciunt plus quam expediat, quæque desiccant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis uitiantia, partim ipsum minorem reddentia, lactis prohibent generationem.

### C A P. XXI.

Porro dictis ad similem facultatem obtinent, quæcunque prouocare aut sedare menses possunt. Vtrobique enim communis materia est, nempe sanguis in uenis contentus. Quare ubi hic fluxilis fuerit, & qualitate contemperatus, utrique abundantem copiam suppeditat. Communes præterea uberibus utroque uenæ sunt non exigue: Itaque ubi ad alterutram partem sanguis defertur, altera siccescit. Proinde quibus menses mediocriter deferuntur, ipsi lac minimè in mamillis colligitur, Quibus uero hoc largè suppetit, ipsi planè menses cohibentur. Quocirca mirandum non est, si tum uictus, tum medicamenta similia sint, nempe & ea quæ gignunt, et sedant menstruas uteri purgationes: et ea præ lactis in



uberibus generationem, tum procurant, tum supprimunt: quāq̃ hactenus differant, q̃ & calidioribus, & magis incidentibus nonnunquam menstrua purgatio indigeat: quum nimirum ea in parte sitæ uenæ magis aperiri debeant, q̃ quæ tendunt in mamas, & sanguinem fluxilem magis requirant, utero ad delationē eius nihil conferente. Mittuntur enim in uenas quæ comitantur illi, non attrahunt menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed etiam trahitur: ac proinde leuiori subsidio medicamentum opus habet, quum non abunde in mamas is confluit. Medicamenta etiam que iuuat ut sanguis in mamillas serat, imperfectas etiam purgationes promouent. Sin autem nimis oblesæ sint, aut planè retentæ, nullum eiusmodi eas sanare potest: uerū sabina, meion, iris, calamintha, pulegium, dictamnū, asarum, costus, casia, cinnamomum, amonium, aristolochia, buniū, & eius gñis reliqua, exactas uteri purgationum retentiones persanant: taliaq̃; etiā urinas promouent. Sed ab ijs que diuretica tantum dicuntur, hoc quidem differunt, q̃ non uehementer desiccant. Etenim que non desiccant, & modicè calfaciunt, lacti sunt generando utilia: quæ uerò plus excalfaciunt, non tamen ualenter desiccant, mensibus eliciendis sunt congrua. Verum & utraq̃ hæc urinas prouocant, necnon in primis ea quæ desiccantia, etiam calfaciunt. At præter alia & reddendis ex pectore pulmoneq̃; excreationibus incōmoda sunt desiccantia. Poscunt quippè & ipsæ incidi quidem, non tamen exiccari: ceu & renum uesicæq̃; calculi.

## CAP. XXII.

**S**emen generant cibi qui probè nutriunt, & flatulenti sunt, familiaresq̃; totis substantijs; medicamentā uerò flatulenta etiam & calida. Extinguunt autem desiccantia & refrigerantia omnia, quæq̃; totis substantijs cōtraria sunt. Porro prouocant quæcunq̃ calida sunt

Menses demittunt in uterū, nō ab illo attrahunt.

Menses & urinas que eliciant Menses ducunt a diureticis quo differant.

Semen que gi gnant, extinguantq̃.



Semē prouocā  
tia supprimen  
tiāq.

Semen suppri  
munt oia refri  
gerantia.

Semen ne esse  
quidē pmitūt,  
quæ siccant.

Ocularia me  
dicamenta.

& flatuosa absq; desiccatione: supprimunt uerò cōtra-  
tia. Etenim quum seminis substantia ex bona superflui-  
rate generationem sortiatur, sitq; etiam flatuosa: bene  
nutriant & flatulēta sint, necesse est, quæcūq; semē aut  
procreare, aut prouocare possunt. Quare bulbi, cicer,  
fabæ, polypodes, cornus, edulia multi seminis & dicū-  
tur & sunt. At scincus & satyrion medicamenta ad id  
apta existūt. Porro simul cibi & medicamina multi se-  
minis sunt lini semen, & eruca. Cæterum quæ refrige-  
rare sunt nata, tam edulia, q̃ medicamenta, semen co-  
gentia, incrassantia, & stabile reddentia, uim habent ip-  
sum supprimentem, non autem corrumpentem: ut la-  
ctuca, blitū, atriplex, cucurbita, mora, melopepones,  
cucumeres, siue maturi, siue immaturi. Iam uerò quæ  
desiccant, ne esse quidem semen permittūt, etiam si na-  
tura calida sint, ut ruta. Quod si etiam non calfaciant,  
multò minus: ut nymphæa. Eandem proportionem tū  
esulentorum, tum medicamentorum est inuenire, cir-  
ca lac & menstrua. Sub idem genus cadūt, quāuis alio  
modo, quæ respirantium instrumentorum reijciendis  
excreationibus auxiliantur: quæq; urinā eiere possunt.  
Hæc enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti  
contraria incrassandi.

#### C A P. XXIII.

**T** Amet si collyrio diarodon, & diapompholygos,  
& cygnio, & thure, uti possimus ad aures, aut os,  
aut nares affectas, necnon ad pudēdum & anum, quia  
tamen frequētius ad oculorum morbos ijs utimur, ob  
id nimirum ocularia medicamenta uocantur: sicuti  
alia hepatica, alia splenetica, stomachica ue, secun-  
dum differentiam particularum quibus solent auxi-  
liari creberrimè.

#### C A P. XXIIII.

**D** Vm autem ij qui Methodici nominantur, meta-  
syncriticas quasdam materias & facultates appellāt,



præterq̃ q̃ obscura & falsa loquuntur, etiam suæ ipso-  
rum hæresi maximè repugnantia astruunt.

## CAP. XXV.

**E**X operibus autem contrarias iudicare facultates  
oportet: dicentes quasdam esse facultates empla-  
sticas, & his contrarias, tum extergentes, tum farctū li-  
berantes: prætera emollientes, indurantes, laxantes, &  
contendētes. Nam astringētes, acres, amaras, acidas,  
atq; dulces, non facultates medicamentorū, sed gustus  
esse qualitates monstrauius. Quanquam & harum  
etiam tum actiones, tum temperaturæ nobis ueniunt  
inuestigandæ. Etenim astringens, terrestre est & frigi-  
dum; acidum, subtile & frigidum; amarum terrestre &  
subtile: quod insignis qualitatis expers, frigidum simul  
& aqueum; acre, igneum; salsum terrestre & calidum;  
nondum tamen igneum; similiter dulce, calidū, sed nō-  
dum urens: quæ deniq; oleosa sunt, omnia aquea sunt  
& aerea. Sequuta sanè sunt temperaturas eorū, & ope-  
ra. Nam astringens contrahere, constringere, densare,  
repellere, incrassare, omniaq; refrigerarē, exiccareq; est  
natum: acidū uerò incidere, extenuare, farctū libera-  
re, & ppurgare citra calfactionē & cum aliquantula re-  
percussione potest. At acre similiter ut acidum exte-  
nuatq; & perpurgat, necnō perrumpit, attrahit, & es-  
charam inducit: cæterū calfaciens, & digerens. Sic  
amarū quoq; meatus perpurgat, abstergit, extenuat,  
icidit humorum crassitiē absq; manifesta excalfactio-  
ne. Quod qualitatis est expers incrassat, cogit, contra-  
hit, extinguit, stupefacitq; Porro salsum contrahit, con-  
stringit, condiendo seruat, desiccatur citra apertā aut fri-  
giditatem, aut caliditatem. Dulce uerò concoquit, laxat,  
rarefacit: oleosum deniq; humectat, emollitq; et laxat.  
Ex quibus sanè facillè inuenire licebit, qui nā sapores  
temperie, & qui sint contrarij operibus.

## CAP. XXVI.

Gustus qualita-  
tes quæ sint.

Saporum tem-  
peraturæ.

Gustatiliū qua-  
litatū faculta-  
tes & opera.



Symmetrum  
quid dicatur.

Ordines, siue  
gradus excessus  
sui, quatuor.

Exiccantia  
quarto ordine,  
etiam viuunt.


**S**ymmetrum appellare medicamentum conuenit,  
quod nec excalfacit, nec deficcat, nec refrigerat,  
nec humectat: nec calidū, frigidū, humidū, siccū uē  
existit. Quod uerò aut calidius, aut humidius, aut frigi-  
dius, aut siccus est, à uincente, seu excedente facultate  
cognominatur. Porro per unumquēq; excessum qua-  
tuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, sufficit:  
calidum quidem exempli gratia nominantes primi or-  
dinis, quod nos excalfacit, non tamē euidenter, sed ita  
ut opus sit rationali demonstratione. Quæ uerò mani-  
festè calfacere nos dicuntur, ea secundi ordinis esse di-  
centur. At quæ iam uehementer quidē, non tamē sum-  
mè, tertij. Quæ autem adeò excalfacere possunt, ut es-  
charam moliantur & urant, quarti: similiterq; in alijs  
exuperantijs existimandum. Nam quæ adeò uehemen-  
ter refrigerant, ut extinguant, & ipsa quarti sunt ordi-  
nis. Cæterū nullū inuenire est, qd quarto deficcat ordi-  
ne, quod non etiam urat. At tertij ordinis exiccantium  
quippiam eē possit, quod minimè urat, ceu omnia quæ  
uehementer astringunt: ex quibus est omphaciū, rhus,  
alumē, balauſtia, galla omphacitis. In his autem ipsis  
quædam uicina sunt adurentibus, ut squama æris, &  
æs uſtum, quasi inter tertium quartumq; ordinem he-  
reant. In medio tertij est æs uſtum, si lotum sit: in  
principio tertij hypocystis. Sic in secūdo &  
quarto differentias licet cōstituere tri-  
plices: quū non perinde urāt cau-  
terium & napy, licet ambo  
quarti sint ordinis.



# G A L E N I P E R G A<sup>93</sup>

## M E N I D E S I M P L I C I V M M E D I C A M E N T O R V M

Facultatibus. Liber VI.



**G**ENERALIS igitur sermo de facultate medicamentorum simpliciū, uniuersus iam superioribus libris finem suum cōsequutus uidetur. Tempus uerò iam est ad sermones particulares, siue speciales transire: hoc solummodo repetentes, primū quidem, in natura temperatissima; secundò in intemperata: postea deinceps in simplicibus morbis, faciendum esse periculum de facultate ipsorum medicamentorum. Cæterū quoniā medicamenta omnia, partim quidem sunt animalium partes, aut plantarum, aut fructuum, aut horum liquores, aut succi: partim autem ex metallis sumuntur: optimum mihi uisum est de plantis ante omnia differere: dein, de metallicis pertractare: ac ultimò ad animalium partes transire, idq; obseruato literarū Græcarum ordine. Curabimus autem semper, ut (quod monuit primo oraculo Hippocrates, uitam pronuntiās breuem, & artem longā) festinantes quā maximo studio, uiam incedamus compēdiosissimam, per ea nēpe quæ sunt in arte utilissima. Inter omnes porrò Dioscorides perfectissimè mihi uidetur confecisse tractatū de medicamentorum materia. At qui aggrediuntur figuras herbarū describere, quas ne per somnium quidē uiderūt, n̄ certē uident præconibus similes, qui notas ab alijs acceptas fugitiui mancipij publicant, quem ipsi nunq̄ uiderunt: imò quem ne agnoscere quidem possint, si propè assisteret. Illos etiam nō possum non accusare,

Medicamenta  
in qbus experiri  
debeamus

Vita breuis,  
Ars longa.

Dioscoridē ex  
actissime tradidisse  
historiā  
plantarum.



Herbarum formas  
non esse ex  
libris discendas

qui primi herbarum formas, scriptis docere conati sunt, quum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non assimilari istis, qui ex libris prodeunt gubernatores.

Abrotoni tem-  
peratura & es-  
sentia.

Abrotonum.

Abrotono siq;  
perfrices ante  
invasionem, mi-  
nus a febrili ri-  
gore infestabi-  
tur.

Abrotonum ver-  
mes perimit.

Abrotonum ini-  
micum ventri-  
culo.

Absynthium ve-  
triculo gratum.

Astringentia sunt  
amica ventri-  
culo.

Absynthii  
tres species.  
Santonicum  
Seriphum.

**A** Brotonum calidum & siccum est facultate, in ter-  
tio recessu, aut ordine, qui ad temperatam natu-  
ram expenditur, situm. Valde siquidem est amarum: qui  
sapor, quum essentia terrene sit, à largo est calore exte-  
nuatus. Porro si quibus per circuitus redeunt rigores,  
ante invasionem rigorum eos abrotono confrices, mi-  
nus utique concutientur, subitoque sensum caloris perci-  
pient. Quod abrotonum etiam lubricos perimat, par-  
quidem est, quum sit amarum. Cæterum & digerendi  
& incidendi quædam vim habet, ipsoque absynthio ma-  
iorem: quandoquidem paucis sine acerbitalis particeps  
est abrotonum: haud autem exigua absynthium. Un-  
de inimicum sanè est ventriculo abrotonum, ueluti etiã  
seriphum: gratum uerò et amicum absynthium. Per se  
quippe amarum omnifariam est insensum ventriculo:  
austerum uerò, aut acerbum, aut in summa astringens,  
amicum & familiare. Abrotoni duæ sunt species: qua-  
rum alteram sanè marem, alteram feminam uocant.  
Similiter & absynthii tres species, aut differentia assi-  
gnantur. Quarum unam eodem cum genere ipso no-  
mine appellant absynthium: cuiusmodi est Ponticum.  
Secundam autem Santonicum: ac tertiam, denique Se-  
riphum. Quibus omnibus absynthium quidem minus  
est calidum, nempe plurimam astringentiam obrinens.  
Non tamen minus desiccatorium existit. Cæterorum au-  
tem, Santonicum à Santonia regione, in qua nascitur,  
nomine sortitum, proximam habet facultatem, Seripho  
paulò imbecillius in extenuando, calfaciendo, desiccā-  
doque. Porro ipsum Seriphum Abrotono minus est ca-  
lidum, uerum calidius absynthio, stomacho impendio



inimicum, nempe cum amaritudine, præ se etiam quādam ferens falsedinem. Sed nonnullam tamē, & si minimam, astrictionem sortitur. Sic abrotonum & fantonicum admodū sunt infesta uētriculo. Solum enim inter ea absynthium, & maximè ponticum, gratū stomacho existit. Abrotonum ustum, calidū siccūq; facultate est, magis etiam q̃ cucurbita sicca usta, & anethi radix, Illa enim ulceribus humidis simul & citraphlegmonē callo induratis conueniunt; ac proinde maximè præputij ulceribus congruunt. At cinis abrotoni ulceribus omnibus mordax est: atq; iccirco ex oleo aliquo tenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut sicyonio, aut ueteri, & maximè Sabino, ad alopecias accommodatur. Tum barbam tardius nascētem, in eorum aliquo, nec minus lentiscino maceratum, elicit.

Agnos. Vitex.

**A**gnos, aut uitex, fruticosa illa plāta, calidus quidem & siccus est, tertio ordine, uerū multū tenuis substantiæ, tum gustu acris simul & astringens: ipas tamen uitices ad medicinam habet inutiles. Cæterum folia, semenq; et flos, calida siccaq; sunt facultate, necnon tenui substantia, quare sæpe nobis sunt usui. Porro semen edendo est: tam perspicuè tamen calfacit, ut capiti dolorem hoc nomine pariat: quāquam si id frigatur minus caput tentat. Vtuncq; autem sumat, flatus uentris discutit. Præterea tum semen, tum flos, tum folia, uenereas intemperantias compescunt. Quare non tantū esā potaq; conferre ad castitatem uidentur, uerū etiam substrata, unde plāta ipsa, agnos, hoc est casta uocatur. At ruta q̃ agnos, magis quidem ex-calfactoria & exiccatoria existit. Adhæc, agni quidem semen ac germina, modicā astrictionem ferunt: at ruta ubi aruerit, exactè amara est & acris: quādiu uerò humida fuerit, subamara. Nulla tamen austeritas aut acerbitas illi inest: aut illa certè obscurissima Quocirca &

Cucurbita usta  
præputij vice-  
ribus cōgruit.

Abrotoni cinis  
ex aliquo oleo  
calido barbā  
tardius nascentem elicit.

Agnos.  
Vitex.

Vitidis semen  
capitis graui-  
tatem parit.

Vitex uenereas  
intemperan-  
tias cōpescit.

Rutæ facultas



Vitex obstru-  
ctis cōfert, mē-  
sesq; pmouet.

ad iecur & lienem indurata & obstructa, agni semen  
potius q̄ rutæ competit. Præter dicta autem agnus &  
mēses mouet, & indurata digerit, & lassitudinē tollit.

Agrostis. Gramen.

Agrostis.  
Gramen.

**G**Raminis radix, modicè frigida est et sicca, morda-  
citatem quandam exiguam, & partium tenuitatē  
obtinens. At herba ipsa primo quidem recessu refrige-  
rat, in humiditate uerò & siccitate existēs q̄ moderata.

Gramen esculentum.

Graminis escu-  
lenti radix cruē-  
ta vulnera glu-  
tinat, fragiturq;  
lapides.

**E**Ius radix est modicè frigida et sicca, p̄indeq; eruē-  
ta ulcera glutinat. Ipsa autem herba illita non ue-  
hementer refrigerat, in medio cōstituta humiditatis &  
siccitatis. Radici porrò mordacitas & tenuitas quædā  
exigua inest, qua nimirum lapides frangit, si quis eam  
decoctam bibat. At semen alterius quidem, imbecillū  
est; eius uerò quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet, ac  
fluxus uentris & stomachi resiccat. Vis enim eius est  
exiccatoria, tenuium partium, & subacerba.

De quatuor Anchusis.

Anchusæ qua-  
tuor species.

**O**Noclea quam uocant, radicem habet admodum  
refrigerantem, desiccantem, astringentem, & sub-  
amaram, corporibus condensandis & modicè extenu-  
andis idoneam; tum abstergendis quoq; & abluendis  
biliosis & salsis succis. Quare aurigini & lienosis est  
utilis. Præterea cum polenta illita, iuuat erysipelata, &  
abstergit non modò epota, sed etiam admota extrinse-  
cus: proinde aceto macerata uirilignes et lepras sanat.  
At folia ipsius herbæ imbecilliora radice sunt, non ta-  
men à resiccatione & astrictione aliena. Itaq; p̄fluuiū  
sanant cum uino pota. Lycopfos nominata, refrigerās  
etiam & siccans, similiter erysipelatis congruit. Cæte-  
rūm radicem q̄ onoclea magis astringentem sortitur.  
Onochilo cognominatæ uis & calidior & medicamē-  
tosior inest. Quare eos qui à uiperis morfi sunt, admo-  
dum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua  
uerò

Onoclea qui-  
bus morbis cō-  
ueniat.

Lycopfos.

Onochilos.



uerò quæ quarta est, & parua, cæteris est calidior, amarior, & medicatior: ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mēsurā cū nasturtio & hyssopo epota.

Agarici radix.

**P**rimò quidē gustu dulcis, sed paulò post subamara apparet, acrimoniæq; & attritionis leuiculæ quandam speciem temporis spatio inducit: estq; consistētia laxa. Quare composita hæc radix est ex substantia aerea & terrea, à calore extenuata. Minimum autē habet essentiæ aqueæ. Hac rōne & digerēdi uim possidet, & crassitudinem incidendi, tum anfractus uiscerum expurgandi. Idcirco regio morbo laborantes ex obstructione iecinoris, necnon morbo comitiali obnoxios, sanat: tum rigores per circuitus recurrentes, ex crassis uiscidisq; humoribus ortos exterminat. Iuuat & morsos à bestijs frigore lædentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum: tum intrò in corpus assumptum, pondere drachmæ unius cū uino diluto. Est etiam & purgatorium.

Ageranton.

**F**acultatē digerendi habet, & leuiter quadantenus phlegmone liberandi.

Adiantum, Polytrichum, Callitrichum.

Vulgo capilli Veneris.

**I**n calore & frigore symmetrum est, siccat tamen, & extenuat, et digerit. Caput ex alopecia glabrū, capillis uestit; strumas & abscessus digerit: epotum lapides frangit; uiscidorū crassorumq; è pectore pulmoneq; excreationibus; nō mediocriter cōfert: ac deniq; uentris profluuium sistit.

Aeizoon. Semperuiuum.

**A**eizoon utrunq; tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, utpote astringens modicè: est tamen ex tertio ordine refrigerantium, in eoq; aquea essentia præpollet. Quare ad erysipelata, herpes, &

Tomus IIII.

Gggg

Anchusæ quarta species anonyms, latos lumbricos perimit.

Agaricū radicem eē credit Galenus.

Agarici facultates insignes.

Ageranton.

Adianton.  
Polytrichon.  
Capill. Ven.

Aeizoon.  
Semperuiuum



phlegmonas à fluxione ortas accōmodatur.

Ægilops. Avena.

Ægilops.  
Avena.

**D**Igerendi uim obtinet, existens leuiter acris. Vnde de phlegmonas induratas, & ægilopas sanat.

Æra. Lolium.

Æra.  
Lolium.

**I**N principio tertij ordinis excafacientium, & secundi uerò extremo exiccantium consistit, sic ut accedere magis quàm jris, naturæ acrium uideatur: à qua tamē essentiæ tenuitate relinquitur.

Ægyrus, siue populus alba.

Ægyrus.  
Populus alba.

**P**Opuli flores calidi sunt in primo recessu, paulūq; ad siccus declinant, subtiliorumq; potius q̄ crassiorum sunt partiū. Floribus similia sunt folia, licet imbecilliora. Resina etiam floribus similem facultatem, sed calidiorem obtinet. At semen, tum resina, tum floribus subtiliorum est partium, & exiccantius: non tamen multò calidius.

Acacia.

Acaciæ facul.

**A**Cacia & planta ipsa acerbata est, & fructus, & succus: qui lotus acrimoniā deponit. Porro si parti illinatur, protinus eam sicciorē atq; contractā reddit: estq; tertij ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotus fuerit: alioqui si illotus sit, primi. Est autē consistentia terreus, habetq; in se partes quasdam aqueas, necnon alias tenues & calidas.

Acalephe. Vrtica.

Acalephe.

**H**Vius herbe, tum fructus, tum folia, admodum digerentis sunt facultatis: adeò ut phymata & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum exhibent, dum coquuntur quo extimulant uenerem, & maxime ubi semen cum musto bibitur. Quòd non calfaciat uehementer, sed nimis renuium sit partium, testimonio est crassiorum ex pectore educio: tum pruritus quem in partibus excitat. Porro subducit uentrem titillatione magis q̄ purgatione. In uniuersum, q̄ exiccari citra mor-

Vrtica extimulat uenerem.

Vrtica subducit aluum titillatione magis q̄ purgatione.



dicationem postulant ea conuenienter persanat.

Acanthos. Spina uulgaris.

**F**olia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinent: at radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium.

Acanthos.  
Spina.

Acanthium.

**R**adix huius & folia facultatis sunt excalfactoriæ, ut & ijs qui conuelluntur auxilietur.

Acanthion.

Acanthe leuce. Spina alba.

**R**adix eius desiccatoria est & modicè astringens: quamobrè & coeliacos et dysentericos iuuat, et sanguinis reiectiones cohibet, oedemataq; illitu contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluatur. Semen tenuis essentie & calidæ facultatis est: itaq; potui dari ijs qui conuelluntur conuenit.

Acanthe leuca  
Spinæ albæ facultas.

Spina Ægyptia.

**V**alidius q̃ spina alba, tum astringit, tum siccatur. Quare p̃fluuium muliebri radix eius supprimit.

Spinæ Ægyptiæ facultas.

Fructus uerò & columellæ prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: ulceraq; ad cicatricem perducit.

Acoron.

**H**uius radice utimur, quæ gustu modicè amara est, odoreq; non iniucundo. Itaq; facultatis calidæ est, & consistentie tenuis. Quare & urinam mouet, et lienes induratos discutit, ceratoidisq; crassitiem detergit, extenuatq;. Ad quod succus præstantior existit. Calfacit enim & siccatur in tertio ordine.

Aconi facultates.

Aconitum Pardalianches.

**H**oc putrefacientis & deleteriæ facultatis existit: quare in cibo potuq; fugiendum.

Aconitum pardalianches.

Aconitum lycoctonum.

**E**t hoc similis alteri facultatis: sed peculiariter lupos interficit, ut illud pardos.

Aconitum lycoctonum.

Acte, quam sabucum: Chamæacte, quam Ebulum uocant.

G g g g ij



Aſc.  
Sabucus.  
Chameacſe.  
Ebulus.  
Alinum,

**V** Traq; potentiam habet & deſiccandi, & conglu-  
tinandi, necnon digerendi modicum.

Alinum.

**S** Emen ſimul & hac planta gignit, eſtq; guſtus  
acris & ſubſtringentis; ex qbus conſtat ipſam eſſe  
diſſimilarem. Maior tamen pars eius temperatè eſt ca-  
lida, cum humiditate inconfecta, & leuiter flatuoſa.

Aloe.

Aloes facultates.  
e.

**H** Æc herba, optima in India naſcitur, cuius liquor  
eſt id quod ad nos importatur cognominatum  
aloe, medicamentum ad plurimas res, propter ſiccita-  
tem mordicationis expertem, utile. Quod quidè aſtrin-  
git modicè, ſed fortiter amarum eſt; ac proinde ſubdu-  
cit uentrem. Eſt autem tertij ordinis exiccantium; calfa-  
cientium autem, aut primi intenſi, aut ſecundi remiſſi.  
Ad hæc uerò, gratum eſt uentriculo medicamen, ut ſi  
quid aliud; & ſinus glutinat. Sanat ulcera quæ agrè ad  
cicatricem perducì poſſunt; & maximè quæ in ano ſunt  
& pudendo. Confert ſimiliter ſi maceretur aqua, ad eo-  
rum phlegmonas, necnon eas quæ in ore, naribus, ocu-  
lisq; oboriuntur. In ſumma, repellere & digerere ſimul  
poſeſt, cum hoc ut paulum extergeat, quantum uideli-  
cet ulceribus puris non ſit moleſtum.

Alyſſon.

Alyſſon mor-  
ſos a cane ra-  
bido, rabien-  
temq; ipſum  
ſanat.

**N** Vncupata eſt hæc herba Alyſſon, q mirificè iu-  
uet morſos à cane rabido. Sed rabièti quoq; da-  
ta, ſæpe in totum ſanauit, ob totius ſubſtantiæ ſimilitu-  
dinem. Siccatur autem digeritq; mediocriter; ac præ-  
terea detergit nonnihil. Qua ratione uiriliginem, &  
ephelim purgat.

Alſine. Auricula muris.

Alſine.  
Auricula mu-  
ris.

**H** Æc quum eſſentiæ ſit aqueæ, citra aſtrictionem,  
tum refrigerat, tum humectat. Quare ad ſeruèſes  
phlegmonas & mediocria eryſipelata confert.

Amaracon. Maiorana.



**C** Alfacit quidem in tertio ordine: in secundo autem siccatur.

Amaracoma.  
Maiorana.

**I** Lita uim habet astringentem, ac repellentem.

Ambrosia.

Ambrosia.

**E** Ius semē est admodum utile. Quum enim sit subamarum & acre, constat ipsum & digerere, & puocare urinas. Calfacit autem, resiccatq; in tertio ordine intenso.

Ami.

Amarantum.

**F** Acultatis est incidentis & extenuantis. Quare comma eius cum uino pota, menses educit: omnesq; pota fluxiones desiccatur: stomacho infesta. Grupos etiā sanguinis dissoluere creditur.

Amarantum.

Amurca.

**E** X secundo est ordine callacientium: at siccātium, intenso quodāmodo magis, terrestres substantiæ quum sit. Sic et ulcera corporum temperatura siccorū, curatur: quæ uerò in alijs omnibus sunt, exasperat, perinde ut resina, pix sicca, & bitumen.

Amurce vires.

Ampelopra on. Porrum agreste.

**E** St enim herba hæc porrū agreste: ob idq; acrius eo, atq; siccus: ut agrestia oia hortensibus. Proinde stomacho q̃ illud, nocētius. At crassos & lentos humores potentius incidit, ualentiusq; infarcta organis obstructione liberat. Hac quoq; rōne sæpe puocauit urinas, ubi à crassis & lentis retinebantur humoribus. Adeò uerè est calidum, ut illitum cataplasmaris ritu, exulceret.

Ampelopras  
Agrestia oia esse acriora hortensibus.

Ampelos agria uitis agrestis.

**R** Acemi eius extergēdi uim possident: ac proinde cutis extremæ ulcera purgare possunt. Sed astringentem quandam sortiuntur extrema germina: quæ & sale condiri assolent.

Ampelos agria  
Vitis agrestis.

Ampelos hemeros. Vitis saturna.

Gggg ij



Ampelos.  
Vitis.

**V**itis cultæ assimilis facultas est agresti, sed ad omnia imbecillior.

Ampelos leuce, Vitis alba, Bryonia.

Ampelos leu-  
ce.  
Vitis alba.  
Bryonia.

**P**rima huius germina Vere edi solent, edulium uē-  
triculo propter astringentem acceptum. Ceterum  
subamarum, & modicè acrem astringentem possident.  
Quare & urinam modicè cient. At radix & absterge-  
tem, & desiccantem uim habet, & moderatè calidam.  
Quam ob rem & lienes induratos liquat epota: cū ficu-  
busq; foris imposita, psoriam & lepram sanat. Porro  
fructus eius, racemi speciem præferens, ijs qui coria  
depsant est utilis.

Ampelos melæna. Vitis nigra.

Vitis nigra.

**V**ocatur autem hæc propriè bryonia, prædictæ ad  
omnia similis, nisi q̃ imbecillior.

Amygdala.

Amygdalorū  
vires.

**Q**uæ quidem palēm amara sunt, omnino exte-  
nuandi uim possident. Siquidem ephelim pur-  
gant, & excreationibus ex pectore pulmoneq; crasso-  
rum lentorumq; humorum mirè auxiliantur. Obstru-  
ctiones præterea iecinoris à crassis & uiscidis succis  
ortas expediunt. Quin & lateris & lienis, & coli, & re-  
num dolores, ab huiusmodi causa natos persanant. Ip-  
sius arboris etiam radices coctæ, illitæq; ephes pur-  
gant. Porro amygdala dulcia, quæ & ipsa nonnihil for-  
tiuntur amaritudinis, moderatè sunt calida.

Ammoniacum.

Ammoniacū.

**C**uiusdam ferulæ est lachryma, intensam emolliē-  
di uim possidēs, aded ut articulorum tophos dis-  
soluat, & lienes induratos sanet, & chæradas per ha-  
litum digerat.

Amomum.

Amomum.

**A**coro similem facultatem obtinet, nisi quòd a-  
corum siccus sit, maiore autem concoquendi ui-  
amomum.



## Anagallis.

**A** Nagallis utraq; & quæ cœruleum, & quæ purpureum fert florem, extergentis est facultatis. Habet uerò nonnihil etiam caloris, & quandam trahendi uim, qua corpori infixæ extrahunt. Succus earū ex naribus purgat eadem de causa. In summa, desiccandi uim habent citra mordicationem. Quam ob rem uulnera glutinant, & putrida corrigunt.

Anagallis vtri  
usq; facultates

## Anagyris.

**F** Rutex est grauiter olens, et digerentis, excalfacientisq; facultatis. Cuius folia uiridia tumores reprimunt: at resiccata, incidētis sunt, exiccātisq; potentiæ. Similem ferè uim habet eius radice cortex. Semen autem subtiliorum est partium: uomitū tamen puocat.

Anagyrī facul  
tas.

Androsæmum. Officinis Milleperforata. Hispanis coraconcillo, hoc est corculum.

**P** Lanta est fruticosa, natura duplex. Vnum enim dicitur Ascyrō, species hyperici; alterum à quibusdam appellatur Dionysias. Est autem semen eorum purgatorium: foliorum uerò facultas modicè extergēs & desiccans, ut & ambusta curare credantur. Cæterum in uino austero decocta, uinum ipsum uulnerum grandium glutinatorium efficiunt.

Androsæmon  
Milleperforata.

## Androsaces.

**A** Mara & acris est herba. Potest autē resiccata ebibitaq; tum ipsa, tū fructus eius, magnopere prouocare urinam, & nimirū etiam digerere & desiccare.

Androsaces.

## Andrachne. Portulaca.

**F** Rigida & aquea est temperie, paucæ particeps auferitatis: proinde fluxiones repellit, maximeq; biliosas & calidas. Estq; tertij ordinis refrigerātium: humectantium autem secundi. Quare maximè æstuātes adiuuat, tum uentris osculo imposita, tum hyponchondrijs: ac præcipuè in febribus hec̄ticis. Præterea dentium stuporem lenit. Quoniam autem restringit, utili-

Andrachne.  
Portulaca den  
tium stuporem  
lenit.

Gggg iij



ter dysentericis editur, & muliebri profluio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc sanè multo est quàm herba succus ipsius efficacior.

Anemone.

Anemone.

**R** Adix cōmansa pituitam euocat; succus è naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper fordida ulcerum anemone expurgant, & lepras detrahunt, menses q̄; appolītæ eliciunt, & lac trahunt.

Anethum.

Anethi. facultates.

**A** Deò excalfacit anethum, ut habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantis uerò ordinis est secundi incipientis, aut primi finietis. Itaq; meritò in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnū conciliat, crudos humores cōcoquit. Vstū autem, tertij ordinis, tum calfaciētium, tum exiccātiū sit. Proinde ulceribus nimis humidis prodest; potissimum ijs quæ in pudendis consistunt. At quæ in præputio sunt inueterata, ea probè cicatrice inducit. Cæterum uiride humidius & minus calidum est. Itaq; magis concoquit, & somnū conciliat, sed minus discutit.

Anthillis.

Anthillis v. traq̄.

**A** Nthillis utraq; modicè desiccat, ut & ulcera glutinet. At quæ chamæpityi assimilis est, subtiliorum est partium, magis q̄; detergit; præterea comitialibus competit.

Anthemis. Chamæmelum.

Anthemis. Chamæmelū.

**C** Alfacit, & desiccat in primo ordine, est q̄; tenuiū partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi uim obtinet.

Anisi semen.

Anisi semen.

**C** Alfacit & siccatur in tertio ordine. Proinde urinam mouet, ac digerit, flatu q̄; uentris reprimat.

Antirinum. Anarinum.

Antirinum.

**S** Emen habet inutile, est q̄; cum bubonio similis facultatis.



Aparine. Philanthropos.

**M**odice extergit et desiccatur, habetque nonnihil subtilium partium.

Aparine.  
Philanthropos

Apios. Pirus,

**P**iri folia pariter & turiones, austera sunt. Ex fructu autem, pars una terrea est, alia aquea. Cæterum utraq; frigida: necnō alia temperata. Proinde esu pira stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autē de siccāt, modice refrigerāt. Vnde etiā uulnera glutināt.

Apios.  
Pirus.

Achra des. Pira syluestria.

**M**agis quā pira reliquā astringunt & desiccant: ob idque maiora uulnera glutināt, fluxusque reprimūt.

Achra des.  
Pira syluestria

Apocynum. Cynocrambe. Cynomorum.

Syluestris mercurialis.

**C**anibus iuxta & hominibus est uenenum, herba grauitur olens, ob idque uehementer calida: non tamen proportionē desiccatur. Itaque illita admodum digerentis est facultatis.

Apocynum.  
Cynocrambe.  
Cynomoron.

Argemone.

**E**thius herbae facultas abstersoria est & digerēs.

Argemone.

Arisaron.

**M**ultò minus est aro. Radicē habet oliuæ magnitudine, sed multò est ipsa acrius.

Arisaron.

Aristolochia.

**R**adix eius est amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est, quæ rotunda. Aliarum uero duarum, quæ clematitis appellatur, fragrantior est, infirmior tamen. At longa, tenuitate quidem à rotunda uincitur: abstergerendi tamen calfaciendique & ipsa potentiam obtinet: minus sanè quā rotunda abstergens & digerens, sed non minus calfaciens: imò forsan plus. Itaque in quibus usus est modice abstersionis, commodior est longa: utputa in ulceribus carne implendis. At in quibus crassum humorem ualidius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Proinde dolores à crasso spiritu

Aristolochia  
triplex.



Aristolechiæ  
rotundę admi-  
randa opera.

inductos, rotunda exactius persanat: extrahit spicula: putredines corrigit: ulcera sordida purgat: dentes & gingiuas splēdidas facit: auxilio est asthmaticis, singul-  
tientibus, comitialibus, podagricisq; si cum aqua bi-  
batur Tum ruptis & conuulsis, ut si quid aliud, medi-  
camentū idoneum est.

Arceuthus.  
Iuniperus.

Arceuthus. Iuniperus.

**C** Alida et sicca est tertij ordinis. At fructus, simili-  
ter calidus est; siccus tamen in primo ordine.

Arctium.

Arctium.

**Q**uod Thapso Verbasco est simile, radice tene-  
ra, candida, dulci, caule oblongo et molli, semi-  
ne cymino simili, tenuium est partium: ob idq; facul-  
tatis modicē exiccantis & extergentis. Quam ob rem  
radix ac semen eius in uino cocta, quadantenus dentiū  
dolores mitigant. Porrō ambusta & chimethla non  
horum modo decoctum, sed & caules teneriores sana-  
re possunt.

Arctium aliud Lappa maior. Bardana.

Lappa maior.  
Bardana.

**D** Igerit simul & desiccata: astringit tamen nō nihil;  
unde folia eius antiquis ulceribus profunt.

Arnaglosson. Plantago.

Arnaglosson.  
Plantago.

Refrigerantia  
simul & astringentia quibus  
morbis conue-  
niant.

**R**efrigerat pariter & siccata in secundo gradu: ha-  
betq; nonnihil austerum, rationē terrearum par-  
tium. Porrō medicamenta, quæ cum hoc q̄ refrigerāt,  
unā etiam astringunt, ea et ad ulcera rebellia omnia, et  
ad fluxiones & putredines cōueniunt, ac p̄inde & ad  
dysenterias. Nam & sanguinis profluvia sistunt, & si  
quid aduratur, refrigerant. Tum sinus quoq; glutināt,  
& alia ulcera recētia simul & uetera. Atq; in omnibus  
ferē id genus medicamētis primas tenet, aut certē nul-  
li secundum est arnaglossum, ob temperaturæ symme-  
triam & conuenientiam. Nam siccitatem obtinet mor-  
sus expertem, & frigiditatem quæ nōdum stupefaciat.  
Fructus etiā & radix similis sunt facultatis, nisi q̄ tum



ficciore, tum minus frigida. Quin & semē subtilium est partium: radices uerò crassiorū. At herbe folia exsiccata, subtilium partium existūt, & minus frigida facultatis. Radicibus utuntur ad dentium dolores, tum mandentes, tum collutionibus incoquētes: præterea ad iecinoris renūq; obstructiones nō has tantū adhibēt, sed folia quoq; & multò magis semina.

Plantaginis radicibus ad dolores dentium utuntur.

## Arum.

**M**ediocrem extergēdi uim possidet, estq; primū ordinis calfacientium & exiccātiū. Radices eius comesæ mediocriter humorum crassitiem incidunt, ita ut sint excreationibus ex pectore idoneæ.

Arum.

## Artemisia.

**D**vplex est, utraq; tamen calfacit secūdo ordine, intenso autem primo, aut secundo remisso desiccatur: estq; tenuium partium: unde calculis renū, uteriq; fomentationibus haud mediocriter congruunt.

Artemisia vtrāq;.

## Asarum.

**R**adices eius facultate similes radicibus acoris sunt: intensiores tamen.

Asarum.

## Asclepias.

**H**uius nondum nos periculum fecimus,

Asclepias.

## Aspalathos.

**A**cris simul & astringēs est. Quare partibus quidē suis acris excalfacit: austeris uerò refrigerat. Itaq; utriusq; ratione desiccatur, unde ad putredines & fluxiones est utilis.

Aspalathos.

## Asparagus petræus.

**A**bstergerendi uim habet citra manifestam caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac iecur infartu liberat, & maximè radices eius, & semen: quia & dentium dolores sanat.

Asparagus petræus.

## Asplenum.

**T**enuium quidē partiū, non tamē calida est herba. Hac utiq; rōne lapides frangit, & lienes liquat.

Asplenum.



Astragalos.

Astragalos.

**R** Adices astrictorias sortitur: quare non instrenue  
siccat, Nam & ulcera gluinat, et aluum fluentem  
sistit, si quis in uino decoctam radicem bibat.

Aster atticus. Bubonium.

Aster atticus.  
Bubonium.

**P** Artim quidem digerens est, parum autem refrige-  
rans, uerum id non astringit.

Astaphis. Vua passa.

Astaphis.  
Vua passa.

**C** Vltia quidem, concoquendi, astringendi, & leui-  
ter digerendi, facultatem obtinet. At agrestis, ue-  
hementer acris existit, adeo ut ex capite purget, abster-  
gatq; ualenter. Itaq; ad pforam accommodata est, Sed &  
urendi uim habet.

Asphodelus.

Asphodelus.

**H** Vius radix extergētis est facultatis. Vstæ autem  
cinis, calidior, exiccantior, subtilior, ac digerere  
potentior existit: ac proinde alopecias sanat.

Attractilis. Cnicus agrestis.

Attractilis.  
Cnicus agre-  
stis.

**F** Acultatem habet desiccandi, & modicè digeren-  
di: exq; spinarum est genere.

Atraphaxys. Atriplex.

Atraphaxys.  
Atriplex.

**H** Vmida quidem est in secundo ordine: frigida ue-  
rò in primo: estq; aquea similiter malua. Quin et  
uentrē celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatē. Horten-  
ses autē attriplex & malua, q̃ agrestes, tū humidiores  
sunt, tum frigidiores: pinde phlegmonis & phygethli-  
s incipientibus, hortenses: uigentibus autem & declinā-  
tibus, agrestes magis conueniunt. Semen eius abster-  
gendi uim habet. Itaq; icteritiæ ab obstructione ieci-  
noris ortæ auxiliatur.

Aphace.

Aphace.

**A** Stringit, editurq; ut ipsa lenticula: ægrius tamen  
concoquitur. Caterū ualentius desiccet, & mo-  
derati caloris est.

Ab synthium.



**A** Strictoriam, amaram, & acrem qualitatem sortitur, excalfaciens, extergens, roborans, & exicans. Proinde biliosos uentris humores deiecit, ac per urinas euacuat. Verum contentam in uentre pituitam nihil adiuuat sumptum. Sic nec si in thorace aut pulmone contineatur; nam astringens in eo facultas, quam amara, ualentior est. Est autem calidum in excessu primo; siccum uero, in tertio. At succus longe quam herba est calidior.

Balanus Mirepsica. Glans unguentaria.

**S** Vcco eius, qui calidus est, unguentarii utuntur. Reliquiae autem unde expressus est succus, uincetem habent qualitatem amaram: cui admista est quaedam astrictio. Proinde extergentem, incidentem, contrahentem, & stipantem effectum possident. Quod si quis carnem eius drachmae pondere, cum melicrato bibat, medicamen experietur uomitorium. Sepe etiam per infernam alium subducit largiter. Sed lienes liquat, iecurque, indurescunt; ad quorum uiscerum expurgationem, ex exocrato ipsam exhibere consueuimus. Ex aceto etiam lepras, psoras, leutes, uirilignes, ionthos, ephelim, exanthemata, achoras, aliosque id genus cutis affectus extergit. Abstergentem itaque & incidentem cum astrictione obtinet facultatem. Cortex autem eius, admodum astrictorius existit.

Balsamum.

**B** Alsamum desiccatur & excalfacit secundo excessu: est autem & tenuium partium, adeo ut odoratum sit. Eius lachryma subtiliorum est partium quam ipsa planta: non tamen adeo calida ut nonnulli existimant. Fructus eius persimilis facultatis est, longe tamen in subtilitate partium inferior.

Balaustium.

**F** Los est agrestis punice, sicuti domesticarum cytinus. Valenter gustum astringit. At uero si omne astringens terrestre est & frigidum, merito quis dixe-

Absynthium

Balanus myrepsica.  
Glans unguentaria.

Balsamum.

Opobalsamum.  
Carpobalsamum.

Balaustium.  
Cytinus.



rit ipsum ualenter & exiccare, & refrigerare. Quo nomine ulcera ad cicatricē perducit. Quin etiam ad sanguinis reiectiones, dysenterias, necnon uētris uteriq; profluuia, nemo est qui non hoc medicamento utatur.

Batus. Rubus.

Batus.  
Rubus.

**R** Vbi folia, germina, flos, fructus, & radix, qualitate astringente, neq; obscura, participant. Sed folia germinaq; recens nata plurimū in se habent substantiā aqueā, parū uerò astrictiōis. Quare uulnera glutinant. At fructus maturus, non parum habet succi calidi temperati, qui existit dulcis: ob idq; & ob modicā astrictiōem non est insuauis gustui. At immaturus, acerbus est & ualidē exiccatorius. Ac sanē uterq; recōditur, ualidius q̄ recens desiccans. Flos eandē uim fructui immaturo possidet. Vtraq; ad dysenterias, uētris profluuium, robur deperditum, sanguinisq; expulsiōem sunt idonea remedia. Radix præter astrictiōē, non paucam habet substantiā in sese tenuem, per quā & lapides renum comminuit.

Rubi radix cō  
minuit lapides

Batrachium. Ranunculus.

Batrachium.  
Ranunculus.

**H** Vius omnes quatuor species adeò acres existūt, ut cum dolore exulcerent. Quare si conueniēter utare, pforas & lepras excoriant, & ungues diuellunt. Tum leprosis stigmata digerūt, & uerrucas detrahūt. Quin & alopecias iuuāt exiguo tempore admotē. Radix arefacta sternutationem prouocat. Sed & dentes dolentes iuuat, sic ut eos frangat. Est itaq; ualde calida & sicca, tum radix, tum uniuersa herba.

Bdellium.

Bdellium.

**Q**uod Scythicum nominant estq; acrius & resinosis, emollientis admodum & efficacis uirtutis est. Arabicum autē, quod splendidius est, magis q̄ emollientia exiccat: uideturq; in potu sumptum calculos renum frangere, tum urinas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores, ruptu-



rasq; sanare.

Bechion. Tusfilago. Vngula caballina.

**T** Viles & orthopnoas iuuare creditur, si quis folia arida aut radicem in prunis urens, ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris: ut sine molestia, noxa'ue omnes thoracis affectus credatur rumpere. Folia uirentia partem recenti phlegmone obsessam illitu adiuuant.

Blitum.

**H**olus est esculentum, humidæ frigideq; temperaturæ in secundo ordine.

Bulbus satiuus.

**F** Rigidior quidem & crassior agresti est, lentumq; succum pcreat. Nam & coctu difficilis est & flutuosus, & uenerem prouocans. Attamen illitus ob amritudinem simul & astrictionē abstergit simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat.

Bulbus uomitorius.

**M** Vltò est calidioris temperaturæ q̃ superior.

Bubonium. Aster atticus.

**C** Reditur sanare bubonas & illitum, & alligatum inguini. Digerit enim mediocriter, quia modicè est calidum. Cæterū non ita siccatur, ut tendat.

Buglosson.

**H** Vmidæ calidæq; tēperiei est: uinisq; iniectū hilaritatis causa esse creditur. Sed gutturis etiā lenit aspredinem, si melicrato coctum sumatur.

Bunium.

**A** Deò excalfacit, ut & urinas moueat, & menses prouocet.

Buphtalmos.

**F** Los eius floribus chamæmeli est tum maior, tum acrior: uehementiusq; digerit, adeò ut & duritias sanet, cerato mistus.

Brathy. Sabina.

Bechion.

Tusfilago.

Vngula caballina.

Blitum.

Bulbus satiuus

Bulbus vomitorius.

Bubonius.

Aster atticus.

Buglosson vino iniectum, hilaritatē parit.

Bunium.

Buphtalmos



Brathy.  
Sabina.

**Q**uantum in acrimonia cupressum uincit, tantū ab eo superatur in astrictione: quare illo & calidior est, & potētius digerit. Quin & similiter cupresso putredinibus accommodari potest, maximē ubi rebeliores fuerint, & diuturniores. Carbunculos item soluit; mensesq; ut si quid aliud, essentiae tenuitate prouocat, & sanguinem per urinas mouet. Fœtum etiam uiuentem interficit, & mortuum educit. Esto autem hoc medicamen tertij ordinis tum excalfacientium, tum exiccantium; ex numero eorū quæ uel maximē tenuiū sunt partium.

Bretanica.

Bretanica.

**H**uius folia astringentia sunt, & uulnerum glutinatoria, similia agrestibus lapathis. At expressus ex illis succus perinde natus est astringere, uideturq; sanare iam putrescentia.

Bromus.

Bromus.

**I**llitum desiccatur, digeritq; mediocriter, & sine morfu. Temperiem autem habet paulò frigidiorē. Nonnihil etiam astrictiōis obtinet, ut uentris profluua iuuat.

Bryon thalation. Alga.

Bryon thalation.  
Alga.

**C**ompositū est ex terrena & aquea essentia, utraq; frigida. Siquidem & gustum astringit, & calidis quibusuis illitum, ea refrigerat, adiunatq;.

Bryon.  
Splachnon.  
Muscus.

Bryon aut Splachnon. Muscus.

**V**im habet astringentem inualidam, ceterū mediocriter frigidam. Nam & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps.

Gallium.

Gallium.

**I**nde nomen sumpsit, q̄ lac coagulet. Facultatem autem obtinet exiccatoriā, & subacrem. Flos eius competere sanguinis profluuijs uidetur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gentiana.

Gentiana.

**H**uius radix efficacissimē extenuat, purgat, abstergit, liberat,



git, liberat obstructione, utpote impēse amara existēs.

Gigarta. Acinorum uuae nuclei.

**E**X secundo exiccantium sunt ordine: refrigerantiū  
uerò, primo. Omnibus autem uentris cum proflu-  
pio iunctis affectibus, impēdio conferunt: utpote quū  
acerbi appareant.

Gigarta.  
Acinorum uuae  
semina.

Gingidium.

**G**Vstu amarum & astringens quum sit, temperie  
calidum frigidumq; uidetur. Secundum utranq;  
uerò qualitatem desiccatorium est. Cætera porrò sto-  
macho amicum existit.

Gingidium.

Glaucium.

**A**Stringit cum quodam fastidio: tum adeò insigni  
ter refrigerat, ut solum sæpe erysipelata, si ualen-  
tia nō fuerint, curare possit. Cōstat enim ex aquea ter-  
reaq; substantia, utraq; frigida.

Glaucium.

Glaux herba.

**E**X lacticinīs quum sit, calida quodammodo hu-  
midaq; fuerit.

Glaux herba.

Glechon. Pulegium.

**Q**Vandoquidē acris & subamara est, ualde exte-  
nuat & calfacit. Quare & illita rubricat; & ex-  
ulcerat si diutius hæreat. Quin etiam humida, crassa, et  
lenta, ex thorace & pulmone excreatu facilia facit, mē-  
sesq; mouet.

Glechon.  
Pulegium.

**M**odice emolliendi uim obtrinet;

Glaeos, strigmenta balneorum.

Glaeos.  
Strigmenta.

Glycyrrhiza, Dulcis radix.

**S**imiliter radici ipse succus, dulcis leuiterq; astrin-  
gens existit: Proinde nō modò asperæ arteriæ, sed  
uesicæ etiam scabritiem lenire potest, idq; temperatu-  
ræ mediocritate. Quare fuerit sanè natura eius familia-  
ris nostræ temperaturæ. Cæterum tepidam quandam  
caliditatem sortitur. Porrò quoniam temperie quoq;  
est humidum, id quod modicè est dulce, ure sanè etiā

Glycyrrhiza.  
Dulcis radix.  
Dulcis modice  
est humida.  
Glycyrrhiza  
sitim lenit.

Tomus IIII.

H h h h



siti congruens medicamentum est, nimirum modicè humidū, humanaq; natura frigidius. Dioscorides ait, are factæ radicis pollinem unguibus oculorum mederi.

Glycyfida. Pœonia.

Glycyfoda.  
Pœonia.

**R** Adicem habet leuiter astringentem, cum quadā dulcedine: at si plusculū dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato, amygdali pota quantitate. Expurgat porrò etiam iecur obstructum, & renes: uentrisq; sistit fluxiones, si in aliquo austero uino cocta sumatur. Est præterea omnino resiccatoria: quare ex collo pueris suspensa, meritorè comitialē morbum persanat: idq; aut aliquem à se fluorem, per infantuli inspirationem imittens: aut aerem assidue mutās, atq; alterum reddēs. Nam hoc pacto succus Cyrenai-  
cus columellam phlegmone affectam iuuat: & melanthium frictum palam catarrhos & coryzas desiccatur, si quis id in calidum lintheum rarum liget, assidueq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quin etiam si compluribus linis, & maximè marinæ purpuræ, collo uiperæ iniectis, illis uiperam præfoces, eaq; postea cuiuspiam collo obuincias, mirificè profueris, tum paristhmijs, tum omnibus ijs quæ in collo expulsiuant. Pœonia itaq; & exiccat, & tenuium est partiū: calfacit autem mediocriter.

Gnaphalium.

Gnaphalium.

**F**olia eius modicè astringunt: quare ex aliquo uino austero dysentericis profunt.

Gongilis, Rapum.

Gongilis.  
Rapum.

**G**ongilidis semen uenerè excitat, utpote spiritum flatuosum gignēs. Sic & radix coctu difficilis est: inflatq; & semen generat.

Damasonium, Alisma.

Damasonium,  
Alisma.

**D**ecoctū radicis eius calculos renum cōminuit. Quare absterforiæ facultate est particeps.



Daucus, Staphylinus.

**D**omesticus esui aptior, sed imbecillior, acrem calidamq; facultatē sortitur; ac proinde etiam extenuat. Ac radix sanē flatuosum quid obtinet, ac uenerum. Semen autem, domestici quidem, et ipsum quādam ad uenerem cīdi potentiā possidet; agrestis uerò planē flatu caret; ac proinde urinam mensesq; ciet.

Daucus.  
Staphylinus.

Dauci semen.

**A** Deo uehementer excalfacit, ut inter prima, tum urinam, tum menses prouocet. Multum etiam digere per halitum foris impositū ualet. Ipsa uerò herba, moderatē calida est, similemq; etiam uim obtinet, cæterū infirmiore.

Dauci semen.

Daphne arbor, Laurus.

**H**uius folia calfaciunt & siccant uehementē: at fructus adhuc uehementius. Radicis cortex minus quidem acris est & calidus; cæterū plus amarus: habetq; etiam astrictiōis nonnihil. Quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest. Bibitur ex uino fragrante trium obolorum pondere.

Daphne.  
Laurus.

Daphne herba: quā Alexandrinam appellant.

**E**vidēter est calida, acris, & subamara, potaq; tum urinas, tum menses prolicit.

Daphne herba.

Chamædaphne.

**P**er similis quidem est uiribus daphnæ Alexandrinæ: sicuti & quod daphnoides uocant.

Chamædaphne.

Dictamnū.

**T**enuiori essentia constat quā pulegium, cætera illi simile. At pseudodictamnū ad omnia imbecillius existit.

Dictamnū.

Dipsacos.

**D**ipsaci spinæ radix ex secundo ordine exiccata est, habetq; nonnihil & absterforium.

Dipsacos.

Dorycnidion.

**A**quea excellit frigiditate. Quamobrem, paucū

Dorycnidion.

Hhhh ij



lum quidem, soporem conciliat: plusculum uerò sumptum, perimit.

Dracuntium, Dracunculus.

Dracuntium.  
Dracunculus.

**Q**uidam aro persimile obtinet, tum folijs, tum radice. Cæterum illo acrius est, & amarius: ac proinde calfactorium magis, et tenuioribus partibus. Habet etiam & astrictiōem leuiculam. Radix omnia uiscera expurgat, optimumq; remedium est contumacium ulcerum. Verum extergit etiā cætera omnia quę extersionem desiderant. Folia præterea similem facultatem sortiuntur, ob idq; si sint uiridia, recentia uulnera glutinant. Fructus ualentior est, non folijs tantū, sed radice. Itaq; & cancos, & polypodas credit eliquare. Succus eius quoq; uitia oculorum expurgat.

Dryopteris, Filicula.

Dryopteris.  
Filicula.

**D**Ulcis, acris, amara, & in radice etiam acerba existit. Habet autem facultatem putrefaciendi; proinde pilis glabram cutim efficit.

Drys, Quercus, Robur.

Drys.  
Quercus.  
Robur.  
Fagus.  
Ilex.

**E**Xiccandi astringendiq; possidet facultatem, cum mediocri quadā tepidāq; caliditate. Cæterū plus cæteris eius partibus astringit quę in trunci cortice membrana subest: tū quę ipsius fructus conuestit carnem. Quamobrem ad pfluuium muliebri, sanguinis expuitiones, dysenterias, & diuturnos uentris fluxus, eam esse credunt accommodam. Valētius tamen astringunt fagus & ilex. Quarum plantarum folia tenella illita non instrenuē deliccant, necnon uulnera glutināt. Eandem folijs uim habet & fructus roboris: eoq; Medici nonnulli utuntur ad incipientes atq; crescentes phlegmonas.

Ebiscus, Althea, Agrestis malua.

Ebiscus.  
Althea.  
Malua sylue-  
stris.

**F**acultate digerendi, laxandi, phlegmone liberandi, mitigandi, & concoquendi difficiles coctu affectus est pedita. Cæterū radix & semē q̄ folia, & tenuiorum



sunt partium, magisq; exiccatoriam & extersoriam facultatem ostendunt: ut & uiligines detergant, & seminum calculos frangant. At radices decoctum, ad dysenteriam, diarrhoeam, et sanguinis reiectionem est aptum: quum nimirum etiam nonnihil astringant.

Ebenus.

**E**X his lignis est, quæ trita in aqua soluuntur. Vis ei Ebenus.  
inest excalfaciendi, extergendi, & tenuium partium. Quamobrem, quæ pupillas offuscant extergere creditur: misceturq; alijs ocularibus medicamentis.

Elæa, Olea.

**O**liuæ rami quantum habent astrictionis, tantæ sunt Elæa.  
Olea.  
frigiditatis participes. Fructus uerò, si quidē ad unguem maturuit, moderatè calidus est: sin imaturus, magis, tum astringit, tum refrigerat.

Elæon, Oleum.

**O**leum quod ex oliuis exprimitur, humectatorium Elæon.  
Oleum.  
esse & moderatè calidum, iam supra docuimus. Eiusmodi est, quod est dulcissimum: sitq; potissimum ex oliuis quas druppas appellant. Cæterum quod omotribes & omphacinum nuncupant, quale ab Hispania uehitur, id quantum in se habet astrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum uetus, quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & potentioribus ad euaporandum uiribus: quod uerò ex crudo, id, dum reliquum quippiam seruauerit astrictionis, miste permanet facultatis: ubi uerò illam prorsus abiecerit, reliquo euadit simile. Quinetiam, quicumq; in præparando ramos iniiciunt, ij omphacino simile oleum efficiunt. Porro qd oleum lotum minimè omnium mordacitatem contineat, supra etiam traditum est. Sunt autē Oleum lotum  
ē minime mordax  
dicans.  
uaria oleorum genera: quibus sanè cicinū & tenuius, & ad discutiendum potentius est, qd simillimum oleo ex oliua uetusto. Raphaninū autem, cætera huic est simile, sed calidius tamen. At hoc etiam calidius sinapi.

H h h h i ij



num: cui simile est quod est melanthio conficitur. Pu-  
gnant cum istis myrtinum & sesaminū, tum q̄ astrin-  
gant, tum q̄ crassarum sint partium. Mistæ facultatis  
est lentiscinum, terebinthinū, & mastichinū. Nō enim  
tantum emolliunt, sed & astringunt. Amygdalinum  
porrò amaritudinem exuperantem possidet, cæterum  
cuiusdam astrictionis est particeps: nō tamē caryinū,  
sed id uel maximè simplicis est digerēdi facultatis. Ca-  
lidius eo est laurinum, & hoc etiam magis, cedrinum.  
Proximum ei est quod ex nigra pice conficitur. Da-  
dinum, minus quidem laurino calidum, uerū ualen-  
tius desiccans. Hyoscyaminum uerò mistæ facultatis  
est, emolliendi uidelicet, ac refrigerandi. Oleum porrò  
cicinum, uentrem subducit. Hoc uerò magis, quod fit  
ex gnidio grandē. Quod ex agresti oliua exprimitur, ex-  
tergit, simulq; astringit. Squalidissimū enim id est ex  
omni olei genere, & post, iltricum quoq; deinceps il-  
lis Hispanum. Pinguis simum est Zibicum, et Ciliciū:  
simul autem pingue & tenue, Sabinum. In medio cō-  
prehētorum omnium sunt, tum id quod per cyclades  
insulas nascit, tum quod per Græciā, Asiamq;: Etenim  
oleum pingue æstimatur uiscositate: tenue uerò, si pel-  
luceat, si purum sit, si plurimum minima eius portione  
inungatur, si facile à cuti cōbibatur. Omne autem oleū  
pro cuiusq; iniectorum natura uariari contingit.

Oleū pingue,  
tenueq; qua ra-  
tione æstimat.

Elatine.

**M**odice tum refrigerat, tum astringit.

Elatine.

**E**xcalfacit et tenuium est partium: ob idq; exiccat,  
maximè in secundo ordine.

Elenium, Enula campana.

Elenium.  
Enula campa-  
na.

**R**adix eius calida & sicca est cum recrementitio  
humore. Quare ele gmatīs quę faciunt ad educē-  
dos crassos ex pectore succos, idoneè miscetur. Iuuat  
etiam ad rubrificandas partes uexatas frigidis diutur.



nisq; affectibus.

**E**leliphacos, Saluia.  
Videnter exalfacit, ac leuiter subastringit.  
Helleborus, Veratrum.

Eleliphacos.  
Saluia.

**T**Am albus q̃ niger helleborus extergentis calfa-  
cientisq; est potentia. Quamobrem ad alphos, li-  
chenas, pforas, leprasq; accommodi sunt Quinetiam  
niger si in fistulam callo indurata infundatur duo-  
bus tribusue diebus, callum detrahit. Dentibus pro-  
dest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordi-  
ne exalfacientium & desiccantium. Porro niger gustu  
calidior est; candidus amarior.

Helleborus.  
Veratrum.

Elxine, quam Parthenium uocant.

**A**bstergit, constringitq; cum humiditate subfrigi-  
da; unde phlegmonas incipientes usq; ad augmen-  
tum sanat: maximè si calida fuerint. Incipientibus etiã  
phygethliis cataplasmatibus ritu illinit; ad auriumq; do-  
lores phlegmonosos succus eius instillatus, sicuti ad  
paristhmia gargariza us conducit.

Elxine.  
Parthenium.

**D**Elxine, quam Cissampelon uocant,  
Igerendi obtinet facultatem.

Elxine altera.  
Cissampelos.

Elynus, Meline, Panicum.

**F**acultate pauci nutriti est, & exiccatoria. Sistit  
nonnihil uentris fluxus, ut milium. Si uerò foris il-  
linatur, exiccat atq; refrigerat.

Elynus.  
Meline.  
Panicum.

Empetron.

**A**d solas purgationes esse uidetur commodum,  
bilem ac pituitam educens: iuuat tamen ad alia,  
gustu salsum existens.

Empetron.

Epithymum.

**T**hymi facultatē habet, ad omnia efficacius. Exic-  
cat & calfacit in tertio gradu.

Epithymum.

Epimedium.

**R**efrigerat moderatè, cum aquea humiditate. Vbe  
ribus illitum, surrecta ea seruare potest. Aiunt ue

Epimedium.

Hhhh iij



rò si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis, Pomus syluestris.

Epimelis.  
Pomus syluestris.

**F**Ructus eius acerbus est, stomacho tamen ingratus, & capitis mouens dolores.

Erebinthus, Cicer.

Erebinthus.  
Cicer.

**L**Egumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, aluo mouendæ habile, ciendæ urinæ idoneum, lacti & semini generando aptum. Prolicit uerò & menses. Cæterum quod arietinum dicitur efficacius urinam prouocat: cuius decoctum renū calculos frangit. Reliquū erebinthorum genus eadem ui pollet, puta attrahēdi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè sicci: participes item amaritatis: cuius ui & lienem & iecur, & renes expurgāt: psoras q̄; & lepras, & lichenes extergunt: tum parotidas & testes induratos discutunt: tum ulcera maligna cum melle sanant.

Erebinthus agrestis.

Cicer agreste.

**C**Alidior & siccior domestico est, quātò et acrior, & amarior existit.

Erice.

Erice.

**D**Igerendi per halitum facultatem obtinet: sed præcipuè flore eius ac folijs utendum.

Herpyllus, Serpyllum.

Herpyllus.  
Serpyllum.

**V**Sq̄ adeò calfacit, ut urinas & menses moueat. Est q̄; & gustu admodum acre.

Erysimum

Erysimum.

**S**emen eius igneum est, & calfactorium. Vtile est cum elegmatis ad promouendas crassorum expectores expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas uberum et testiculorū, iuuat: & ut Dioscorides ait, etiam occultos cancos.

Erythrodanum, Rubia passiuā.

Erythrodanum.  
Rubia tinctorum.

**E**st autem tinctorum rubia radix acerba et amara: Quare lienē, & iecur expurgat: & urinas, crassas, multas, & interdum sanguinolentas promouet. Quin



& mēses ciet, extergitq; mediocriter. Proinde uiligi-  
nes albas cum aceto illita iuuat.

Eupatorium.

**T** Enuium est partium, incidendiq; & extergendi Eupatorium.  
uim, citra manifestam caliditatē, obtinet: quocir-  
ca obstructions iecoris aperit. Inest ei quædam etiā  
astrictio, per quam robur uisceri addit.

Euphorbium.

**V** Rentem & tenuium partium facultatē sortitur. Euphorbium :

Ephemeron, Iris agrestis.

**A** Stringit quidem, estq; suauis odoris. Quare et re Ephemeron.  
pellit, & per halitū digerit. Non inefficaciter au- Iris agrestis.  
ten radix eius in dentium dolore colluitur. At folia co-  
ctain uino, phymatum augmento & statui cōgruūt.

Echinus herba.

**F** Ructus eius acerbus est: atq; iccirco repellentis fa Echinus her-  
cultatis & exiccatoriæ. Utuntur eo ad oculorum ba.  
auriumq; fluxiones.

Zeia, Spelta.

**V** Niuerfa sua facultate, quodammodo in medio Zeia.  
est tritici & hordei. Spelta.

Zingiberis radix.

**E** Xcalfacit, sed non primo statim occurso, ueluti pi Zingiberis ra-  
per: unde sanè & minus esse subtilium partium, q̃ dix.  
pipei, exstimanda. Etenim illaboratam quandam, &  
crassam retinere in se uidetur humiditatem: quemad-  
modum piper longum. Quare diutius perseuerat que  
profiscitur à Zingibere, aut pipere longo caliditas;  
quàmquæ ab albo, aut nigro. Porrò ubi totum cor-  
pus celerrimè calfacere consiliū est, ea tunc exhi-  
benda sunt, quæ & celerrimè à caloris nostri conta-  
ctu incalescant, & promptissimè undequaq; feran-  
tur. Verū ubi partem quāuis refrigeratam recalfa-  
cere studemus, contra agendum: nimirum quæ tardè  
calescentia, plurimo tempore perdurent, ea præbēdo.



Cæterum licet zingiber & piper \* longum hac ratione à nigro pipere differant, non magna tamē est differentia. At nasturtium, napy, thapsia, & agrestium columbarum stercus, maiori tempore perfectē accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

## Zythus.

Zythus.

**N**on parum est acrior hordeo, succi q̄; prauī, quī ex putredine oriat̄. Est et flatuosus: ac ptim acis & calidus: pte uerò plurima frigidus, aqueus, acidus.

## Zyme, Fermentum.

Zyme.

Fermentum.

**T**enuum est partium, & mediocriter calidum: p̄ inde citra molestiam quæ in p̄fundo sunt extrahit & digerit. Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine natę. Cui accedit ea quæ à sale est, \* & quæ etiam à farinæ natura.

## Hedysmos, Menta.

Hedysmos.

Menta.

**T**am menta, q̄ calamintha, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio calfacientium ordine. Infirmior tamen est menta, & minus excalfacit: cæterim mediocriter ad uenerem excitat: id quod omnibus accidit, quæ humiditatem semicoctam & flatuosam continent: At calamintha, quum ualētius calfaciat & excitet, habet etiam quiddam amarum in se, atq; acerbū. Quare illo quidem lumbricos perimit: acerbitate uerò, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimit. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

## Hedysarum.

Hedysarum.

**H**uius semē amarum & subacerbum apparet: ob id q̄; potum stomacho gratum existit, uiscerum q̄; obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus germina.

## Hemerocalles.

Hemerocalles.

**R**adicem habet lilij radici similem, & figura & uiribus: prodest q̄; ut illa, ignis ambustis, nimirum



tum leuiter digerens, tum nōnihil astringens.

Hæmionitis.

**A** Strictionem simul & amaritudinē possidet. Quā obrem cum aceto pota lienosis auxilio est. Hæmionitis.

Herigeron.

**R** Efrigerat & modicè digerit. Herigeron.

Heryngion.

**C** Alore quidem est temperatum, nō paruam tamē siccitatem sortitur consistentem in tenui essentia. Heryngion.

Thaliëtrum.

**F** Olia habet coriandro similia: caulem crassitudine rutæ. Vis eis inest citra morsum exiccatoria. Itaq; ulcera inueterata ad cicatricem perducit. Thaliëtruni.

Thapsia.

**A** Crem habet ac ualenter excalfacientem facultatem cum humiditate coniunctam. Quare ex alto uiolenter extrahit, & quod extraxit, digerit. Celeriter tamen corrumpitur. Thapsia.

Thermus, Lupinus.

**P** Remaceratus aqua, amaritudinem exuit, ediq; potest, sed nutrimentum fit crassi succi. Vbi uerò natura etiamnum amaritas permanet, extergendi, digerēdiq; uim obtinet. Interficat autem lumbricos, tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca epotus. Quin & decoctum eius lumbricos ejicere potest: tum etiam foris identidem perfusum, uutiligines, achoras, exanthemata, pforas, gangrænas, malignaq; ulcera, iuuat. Expurgat iecur & lienem cum ruta & pipere suauitatis gratia sumptum. Elicit menses & foetum cum myrrha & melle impositum. Lupinorum porro farina, etiam sine mordicatione digerit, nec liuida tantū sed & chæradas & phymata curat, si in aceto, aut oxy melite, aut posca coquatur. Thermus. Lupinus.

Lupinorum farina qbus morbis medeat.

**A** Thermos agrios, Lupinus agrestis. Lupinus agrestis.

Marior est, & ad omnia ualentior domestico,



eiusdem genere cum ipso facultatis.

Thlapfi.

Thlapfi.

**S**emen eius facultatem acrem sortitur, adeò ut iter nos abscessus potum dirumpat. Menses ciet, & foetum enecat Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest: euacuatq; supernè & infernè bilem oxybaphi mensura epotum.

Thridax, Lactuca.

Thridax.

Lactuca.

**H**umida & frigida est, secundū aquæ fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas, & ad parua & leuia erysipelata, est cōmoda: præterea restinguit sitim. At semen potum, genituræ profluuium cohibet. Sic & agrestis lactucæ semen. Cuius holeris colligitur succus, argemas & caligines purgans, inūgiq; ad adustiones cum lacte muliebri solitus.

Thymum.

Thymum.

**I**ncidit & calfacit uehementer, ob idq; urinam & menses prouocat, foetum euellit, potum uiscera expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert, ac deniq; excalfacit exiccatq; in tertio ordine.

Idæa radix.

Idæa radix.

**A**dmodum gustu est acerbæ. Quare sanguinis effusiones, lienterias & dysenterias, mensesq; fluētes supprimit, tum pota, tum etiam admota extrinsecus.

Ixos, Viscum.

Ixos.

Viscum.

**E**x plurima aerea & aquea, paucissima terrena substantia constat. Quare ex alto humores extrahit eosq; diffundit et digerit. Tempus aut ut calfiat postulat.

Ios. Viola.

Ios.

Viola.

**V**iolæ folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Proinde tum per se, tum cum polēta illita, calidas phlegmonas mitigant. Impo-  
nuntur & ori uentriculi æstuanti, & oculis.

Hippuris.

Cauda equina

Hippuris, Cauda equina.

**A**stringentem cum amaritudine facultatem pos-



fidet, ac proinde ualenter exiccantē, sed citra morsum. Itaq; uulnera etiam maxima glutinat, uel si perfectos esse neruos cōtigerit. Præterea uocatas enterocelas glutinat: necnō sanguinis reiectiones, fluētes menses, dysenterias, cæterosq; alui fluxus coercet. Succus uerò eius pdest sanguinis eruptioni per nares, et fluxui obnoxijis in uētre passionibus, ex austerorum uinorū quopiam epotus; ac si febre teneantur, ex aqua.

**V** Hippomarathrum.  
Nā cum foeniculo & de ipso differemus.  
Isatis.

Hippomara-  
thrum.

**D** Omestica quidē qua utuntur tinctores, facultas est ualenter exiccātis, nondū tñ mordentis: est enim simul amara & astringens. Proinde magna uulnera corporum durorum glutinat: & sanguinis profluvio laborantibus partibus utiliter illinitur, tumores laxos mirificē digerit, simul ac reprimat, & aduersus omnia maligna ulcera mirabiliter resistit. At isatis syluestris manifestē iam acré quiddā, tum gustu, tum actione præfert. Proinde q̄ domestica magis desiccans, ualentius etiam putredinibus obsistit; ad cætera iam cōprehensa deterior.

Isatis.

Isopyron, Phasiolon.

**S** Emen habet amarum & subacerbū. Extergit itaq; & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora cōtrahat, & stringatq; . Quare excreationibus pectoris cōfert, & iecur expurgat; crediturq; iuuā hemoptoicos.

Isopyron.  
Phasiolon.

Itea, Salix.

**S** Alicis folijs ad cruenti uulneris glutinationem uti possis. Verū floribus eius maximē ppe omnes utuntur ad exiccantis emplastri præparationem. Est enim uis eorum ita desiccatoria, ut morsu abstineat. Habet uerò etiam quandam astrictiōem. Porro succus expressus medicamē exiccatoriū existit, expersq; mordacitatis. Nec enim inuenias aliquod medica-

Itea.  
Salix.



Salicis corticis  
cinere macera-  
to in aceto cal-  
los atq; myr-  
mecias exteri.

men ad plures res utilius eo, quod citra mordaci-  
tatem exiccat. Arboris cortex similem facultatem  
obtinet, tum floribus, tum folijs, nisi q; tēperatura sic-  
cioris existit, ueluti omnes cortices. Etenim cinere  
corticis macerato in aceto, nonnulli callos atq; myr-  
mecias tollunt.

## GALENI PERGA-

### MENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber VII.

Calamintha.  
Nepita.



Calamintha, Nepita.

**S**SENTIA quidem est tenui, tem-  
perie autem calida & sicca, quodāmo-  
do in tertio ordine. Est enim acris gu-  
stu, paulumq; amaritudinis obtinet.  
Extrinssecus admota, primū quidē  
ualde excalfacit et mordicat, cutemq;  
exugit: postremò etiam ulcus efficit. In corpus autem  
intrò assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum  
melicrato, perspicuè calfacit, atq; sudores ciet, omneq;  
corpus tum digerit, tum exiccat. Idcirco ea cōtra rigo-  
res repetētes per circuitum nonnulli utuntur, sicuti &  
cōtra ischiadicos morbos. Trahit enim que in profun-  
do hærēt ad superficiem, totumq; adeò articulū excal-  
facit, & cutem non obscurè adurit, mensesq; tum epo-  
ta, tum apposita, admodum efficaciter prouocat, ac de-  
niq; elephāticis etiam probè auxiliatur. Præterea cica-  
tricibus atris candorē restituit, & sigillata digerit. Pre-  
stat autem in huiusmodi, ubi in uino decoxerimus, ip-  
sam emplastri ritu apponere, & uiridem magis q̃ sic-  
cam. At sicca, ad uenenatarum bestiarum morsus as-



sumitur, ueluti etiam cauteria, & quæcūq; medicamēta calida sunt & acria Succus eius aut infusus, aut epotus, ascaridas, lumbricos, & auriū uermes, enecat. Sic & conceptum interimit, eiſcitq;. Igitur incidendi quidem ei uis adest, ob calorem, tenuitatē, amaritudinē: abstergendi uerò propter solam amaritudinem. Quare Asthmaticis atq; ictericis cōuenit. Ad omnia tamē dicta, montana efficacior existit.

Calamus odoratus.

**L**Euiculam quādam astrictiōem, ac minimā acrimoniam possidet. Siquidem magna ex parte essentia quidem eius terrena est, & aeria: temperies autem, calida & sicca in secundo excessu, nisi q̄ ualentius deficcet. Porrò moderatē mouet urinam: ac facultatibus quæ iecori stomachoq; imponuntur, necnon ijs fomentis quæ inflāmato utero, aut mouēdis menstruis administrantur, cōmodissimē potest misceri.

Calamus odoratus.

Calamus phragmites, Canna.

**R**Adix eius cum bulbis aculeos stipitesq; infixos extrahere ex alto traditur Etenim abstergentem, minimeq; acrem facultatem sortitur, quemadmodum & ipsa folia. Cortex uerò cōbustus, admodum tenuiū partium, & digerentis facultatis efficitur, cum nonnulla abstersione, ut exiccet & calfaciat tertio quodāmodo ordine. Cæterū eius flos est uitandus. Nam si in aures incidat, adeò tenaciter hærens affigit, ut auelli non possit, auditumq; uitiat.

Calamus phragmites.  
Canna.

Calami flos uitiat auditum.

Cancanus, Cacalia.

**R**Adix cancani, crassam, emplasticamq; & exiccātem habet essentiam, sed mordacitatis expertē. Quare macerata uino sicuti tragacantha, & linctā, aut cōmansa, arteriæ asperitates sanat.

Cancanus.  
Cacalia.

Cannabis.

**C**Annabis semē adeò flatus discutit, exiccatq;, ut si largius edatur, genituram absumat.

Cannabis semen.



Capnios, Fumaria.

Capnios.  
Fumaria.

**A** Cris, amara, & acerbæ qualitatis est particeps,  
Quamobrem urinam biliosam, multamq; pro-  
vocat: sanatq; tum obstructions, tum imbecillitates  
iecinoris. Succus eius oculorū aciem acuit, non parū  
trahens lachrymarum, ueluti ipse fumus.

Capparis.

Capparis radi-  
cis cortex ins  
foris adhibitus  
quæ meliatur.

**C** Apparis radicis cortex uincentem habet qualita-  
tem amaram, proximam acrem, deinde acerbā.  
ob idq; pugnantibus facultatibus cōstat: qppè abster-  
gere, purgare, incidere, potest amaritudine: excafcere,  
incidere, digerere, acrimonia: cōtrahere, dēfare, strin-  
gere, acerbitate. Quare lienes induratos, si quid aliud,  
maximè potest iuuare: tum foris medicamentis quæ il-  
linunt admistus, tum intra corpus assumptus, siue de-  
coctus in aceto, oxymelitē ue, siue cōtus atq; illis p-  
mistus. Quum nimirū crassos lentosq; humores aper-  
tè hoc pacto sumptus euacuet; nec eos tantum per uri-  
nas, sed per uentrem etiam sæpe sanguinolētos defert:  
unde & lienes adiuti sunt, & coxarum dolores. Quin  
etiam menses promouet, ex capite purgat, auxiliatur  
ruptis atq; conuulsis, necnon malignis ulceribus, cata-  
plasmatis modo impossius. Præterea dentium dolores  
adiuuat, interim cum aceto coctus, interim cum uino,  
sæpe solus dentibus mansus. Ad hæc uiligines cum  
aceto detrahit, & chœradas, & duros tumores digerit,  
idoneis ad eas medicamentis mistus. Radicis cortici  
fructus proportionæ respondet, nisi q̄ ad omnia sit im-  
becillior. Imò & folia, & caules similem etiā uim obti-  
nent. Admiscemus tamē illis aliquid, qđ eorum uehe-  
mentia obtundat. Nec mirum est, q̄ aurium uermes  
sua perimant amaritudine.

Capparis fru-  
ctus & folia.

Cardamum, Nasturtium.

Cardamum.  
Nasturtium.

**N** Asturtij semen adurētis facultatis est particeps,  
ueluti napy. Proinde omnia quæ rubrificationē  
postulant



postulant, eo excalfaciunt. Miscetur quoque remedijs, quæ exhibentur asthmaticis, tãquam ualenter crassos succos incidere ualeat. Porò & herba arefacta semini similem facultatem sortitur. Nam quæ humida est et uiridis, multis numeris inferiorem.

## Cardamomum.

**Q** Vanto suauius magisque fragrans nasturtio est, tãtò & imbecillior ei calida facultas inest. Nec enim ulcerare est idoneum. Habet autem adiunctum quiddam amaritudinis, qua lumbricos interficit: & cū aceto ualenter psoras detergit.

Cardamomum.

## Caron.

**C** Ari semen calfacit & exiccat tertio quodãmodo ordine, moderatè acrem possidens qualitatem. Itaque & flatus extinguit, & urinas ciēt, tum semē, tū planta.

Caron.

## Casia.

**E** Xiccat et calfacit tertio quodammodo ordine, sed & tenuium admodum partium est, habetque acrimoniae plurimum, ac leuiter nonnihil astringens. Incidit itaque simul & digerit, roburque instrumentis addit. Quare mensibus est mouendis idonea, ubi à copia simul & crassitudine illi suppressi fuerint.

Casia.

## Carya, Nuces.

**A** Rbor tum in folijs, tum in germinibus astrictio- nem quandam possidet, cæterum euidentem multamque in nucis putamine recenti pariter & sicco. Eius autem succo expresso, ac melle decocto, nos uice stomachici medicaminis utimur. Oleum quod ex fructu elicitur inueterato, admodum per halitum digerit. Quare nonnulli eo gangrænas, carbunculos, & cægilopas sanant. Sunt qui ad neruorum uulnera utantur. Cæterum si recens sit, astringentis nonnihil qualitatis obtinet. Nucleus arefactus & uustus, tenuium partium & exicatorium citra morsum est medicamen. At pontica nux, quam λεπτοκάριον & auellanā appellāt, plus habet es-

Carya.  
Nuces.Nux pontica.  
Auellana.



sentiaē terrestris ac frigide. Itaq; austerior tum cortex,  
tum planta, tum fructus apparet.

Caucalis.

Caucalis.

**E**Xcalfacit & desiccāt. Præterea urinam ciet, mu-  
riaq; ad repositionem conditur.

Carpesium.

Carpesium.

**S**imile est ualerianæ, tum gustu, tum facultate. Sed  
plus habet tenuitatis. Proinde magis ea uiscerum  
obstructiones extergit, urinam mouet, renesq; calcu-  
lis degauatos expurgat.

Cenchrum, Milium.

Cenchrum.  
Milium.

**P**rimo ordine refrigerat. Exiccat uerò tertio exolu-  
to, aut certè secundo intèso. Paululum etiam tenui-  
tatis sortitur. Quibus de causis inter omnia frumenta-  
ria edulia minimum nutrimenti largitur. Ventrem ta-  
men desiccāt, forisq; admotū in sacculis, idoneū fomē-  
tum est ijs quæ citra morsum exiccati postulant.

Cedrus.

Cedrus.

Cedrea.

**C**edrus specie est duplex: altera fruticosa iunipero  
assimilis: altera arbor non exigua. Vtraq; est cali-  
dæ siccæq; temperaturæ tertij quodammodo ordinis  
secundum utrunq;. Ceterum cedrea (uocatur ita cedri  
oleum) quartum etiam ordinem attigisse uidet, admo-  
dum calida & tenuium partium. Quare mollem uiuen-  
tium carnem promptè, citraq; dolorem putrefacit. Nā  
mortuorū corpora exiccat, simulq; à corruptione tue-  
tur: utpote humiditates eorū depascens: at solida haud  
quaq; attingens corpora. Nec mirum uideri debet, si  
quā tanta ui polleat, lendes, pediculos, tineas, aur iūq;  
uermes interficere ualeat: tum foetum uiuentem quidē  
interimat: extinctum autem eiiciat: quemadmodū &  
ipsum semen, si coeundi tempore, pudendo ea circūli-  
natur. Proinde partui aduersum est medicamē. Quod  
etiam dentium foraminibus instillatum, eos & cōfrin-  
git, & à dolore liberat. Extenuat quoq; oculorum cica-



trices, & uisus hebetudini ab humorū crassitudine or-  
te medetur. Viuntur autem ea plebeij, quum ad uulne-  
ra ouibus inter tondendū à forfice illata, tum etiā con-  
trā ipsarum scabiem & ricinos, quos κρότωναs uocāt.  
At fructus moderatiores existūt, adeò ut comedi pos-  
sint. Quanq̃ si ijs liberalius utare, capiti dolorem infe-  
rent, ardoremq̃; ac morsum in uentre percipies.

## Centaurium maius.

**R** Adix eius gustui acris simulq̃; astringens appa-  
ret, cum leuicula quadam dulcedine. Quòd uerò  
ad actiones pertinet, menses prouocat, uiuum foetum  
extinguit, extinctumq̃; propellit. Præterea ulcera glu-  
tinat, sanguinemq̃; reñcientibus prodest. Exhibentur  
autem eius binæ drachmæ, febrientibus quidem cum  
aqua: feбри uerò liberis, cum uino. Quinetiam ruptis,  
conuulsis, dyspnœg, inueteratq̃; tussi est auxilio. Eadē  
quæ radix, & succus ipsius præstat.

## Centaurium minus.

**H** Vius radix planè inefficax est: at caulis & folia, et  
flores, utiliora sunt. Vincit enim in eis qualitas  
amara, paululum habēs & astrictiois: ob idq̃; admo-  
dum exiccatorium est medicamen, expers mordacita-  
tis. Ulcera itaq̃; magnæ herbæ ipsius recētis illitu glu-  
tinantur: & ue uista, quæq̃; egrè ad cicatricem perducī  
queunt, cicatrice obducuntur. Arefacta uerò glutina-  
torijs & desiccatorijs miscetur facultatibus. Miscetur  
etiam ijs quæ rheumaticis medētur affectibus. In qui-  
bus ea medicamina præstantissima sunt, quæ uehemē-  
ter desiccantia cum quadam astrictione nullam habēt  
mordacitatem. Decoctum herbæ quidam infundūt is-  
chiadicis, ceu biliosa & crassa extrahens: nam & talia  
purgat. Succus eius præter dicta, cum melle oculis illi-  
nitur, mensesq̃; & foetum euocat. Iecinoris quoq̃; ob-  
structiones optimè aperit, bonumq̃; durato plieni est  
remedium, & impositum foris, & bibitum.

Iiii ij

Cedri fructus.

Centaurium  
maius.Centaurium  
minus.



## Cerasia.

Cerasia.

Cerasi gūmi.

**Q**Uæ dulcia sunt, magis aluum subducūt, sed minus grata stomacho sunt. Austera uerò, cōtrario modo. At acida, pituitosis excrementosisq; stomachis sunt idonea. Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil etiā incidunt. Ipsius arboris gummi, arterias asperas lenit, calculisq; uexatos adiuuat,

## Ceratonia.

Ceratonia.

**E**Xiccantis astringētisq; facultatis est, tum arbor ipsa, tum fructus. Qui quidem si sumatur humidus, magis uentrem subducit; si autem siccus, magis eundem sistit.

## Cestrum, Betonica, Psychrotrophon.

Cestrum.  
Betonica.  
Psychrotrophon.

**V**im habet incidendi, ut gustus indicat. Est enim subacris & amariuscule. Quare calculos renum frangit; pulmonem, pectus, & iecur expurgat: menses promouet; comitialibus prodest: rupta conuulsaq; curat, omnibusq; bestiarū moribus illita auxiliatur. Postremò acidū ructantibus & ischiadicis, bibita pdest.

## Cecis, Galla.

Cecis.  
Galla.

**Q**Uæ omphacitis dicit, admodum acerbum est medicamen, pleraq; sui parte essentia terrena & frigide, per quā desiccatur, repercutitq; fluxiones. Esto uerò tertij in desiccādo, secūdi autē in refrigerādo ordinis. Altera autē galla, flaua illa & magna, laxaq; & ipsa desiccatur quidē, sed tantò minus, quātò minus acerbæ qualitatis est particeps. Cocta itaq; ipsa per se in aqua, aut si magis astringere uis, in uino aliquo austero, ac dein trita, cataplasma est nō instrenuum sed inflammate, procidenti q;. Gallæ combustæ, extinctæq; in aceto aut uino, sanguinis reprimendi facultatem acquirunt.

## Cera.

Cera.

**I**nter primas quatuor qualitates mediū quodāmodo obtinet. Habet uerò quiddam crassæ essentia & emplasticum. Quamobrem aliorum medicamentorū



materia existit. Ipsa autem per se ex genere fuerit debili-  
liter concoquentiū. Habet tamē quiddam digerentis,  
calidæq; potentia, quæ plurima melli inerat.

Cici Ricinus.

**V**T fructus eius expurgat, detergit, & digerit, sic Cici.  
etiam foliū, sed unde quaq; debilius. Oleū quod Ricinus.  
ex semine conficitur, calidius atq; tenuius est, q̃ cōmu-  
ne oleum, ac proinde potentius digerit.

Cinnamomum.

**S**ummè tenuium est partium, atq; ex tertio ordine Cinnamomū.  
calfacientium. Nihil autem æquē desiccant, eorum  
que pariter calfaciūt, ppter tenuitatē essentia. At Cin- Cinnamomis.  
namomis, ueluti imbecillum est cinnamomum.

Circæa.

**D**Ioscorides ait radicem eius ex uino dulci potā, Circæa,  
secundas purgare. Est enim boni odoris, & cal-  
factoria. Semē autem eius in sorbitione exhibitum, ad  
lactis generationem conducit.

Cisthus.

**F**Rutex astringens est. Folia eius & parua germina Cisthus.  
trita adeò desiccant, astringuntq; ut ulcera gluti-  
nare ualeant. Sed flores efficaciores sunt, adeò ut cum  
uino poti dysenterias, uētris imbecillitates, fluxusq; &  
humiditates perfanent. Cataplasmatibus ritu illiti, ulcerū  
putredinosa iuuant. Desiccant enim secundo excessu.  
Hypocistis multò est magis astrictoria q̃ folia, admo Hypocistis.  
dum efficax remedium ad omnes fluxionū affectus.  
Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ ui-  
delicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmi-  
tudinē illi haud segniter addit. Quo nomine antido-  
to ex uip. ris inditur.

Cisthos, Ladanum.

**P**rimo excessu medicamen est quodammodo com Cisthos.  
pletè calidum, ita ut secūdum attingat, habens etiā Ladanum.  
astrictionis nonnihil. Est præterea substantia tenui, &

Iiii ij



emolliens, necnon moderatè digerens, cōcoquensq;. Peculiariter igitur ad uteri uitia est aptum. Diffuentes tamen capillos retinet. Cæterum alopecias & ophthalmias sanare non potest, quòd hi affectus ualētiora medicamenta desyderent.

Cissos, Hedera.

Cissos.  
Hedera.

**E**X contrarijs facultatibus cōstat. Habet enim quādam astringentis substantiæ, quæ terrea & frigida existit: habetq; nonnihil acris, quam calidam esse uel gustus cōprobat: præterea si uiridis sit, obtinet etiā quādam aqueam & tepidam. Viridia igitur folia in uino decocta, grandia ulcera glutināt, malignaq; ad sanitatem reducunt. Igne factas exulcerationes cicatrice obfirmant: cum aceto decocta lienosis opitulantur. Flores autem quodāmodo ualidiores sunt. Succus medicamen est errhinō: uetustas aurium fluxiones sanat. necnon uetera ulcera tum aurium, tum narium. Lachryma hedere perimit lendes, pilisq; nudat. Adeò quippè est calida, ut etiam obscurè adurat.

Clinopodium.

Clinopodiū.

**C**Alfacit simulq; siccatur in tertio ordine, estq; subtilium partium.

Clematis.

Clematis.

**H**Vius folia acrem & adurentem obtinent facultatem: adeò ut lepras excoriēt. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfacientium initio. Dicitur etiam Clematis illa herba, quam nonnulli polygonoidem appellāt. Quæ tantum abest ut exulceret, ut profluuijs & dysenterijs cum uino pota auxilietur, mansaq; dentium dolores mitiget, ac deniq; doloribus uteri in pello ad mota sit usui.

Cnicos.

Cnicos.

**C**Nici semine duntaxat ad purgationes utimur. Estq; tertij ordinis excalfacientium, si quis foris eo uti uolet.



Coccus cnidius, Granum gnidium.

**E** T ipsum quoq; purgat, sed acris est, adurentisq; facultatis.Coccus cni-  
dius.

Coccus baphicus, Granum tinctorium.

**A** Stringentem simulq; amaram possidet qualitatem. Vtraq; sine morfu desiccatur. Proinde ad ingentia uulnera congruit, & ad neruorum uulnerationes.Coccus baphi-  
cus.  
Grauum tin-  
ctorum.

Coccymelea, Prunus.

**P** Runi fructus uentrem subducit, recens quidem plus, aridus minus. Minus tamen subductiuum sunt. Damascena pruna istis quæ ex Iberia aduehuntur. Quin et ipsæ arbores fructibus proportionem respondent. Porro quorum in germinibus astrictio quædam manifesta inesse apparet, istis decoctis, phlegmone in columella aut tonsillis consistentes idoneè colluuntur. Iam uero agrestium fructus, euidenter est astrictorius, uentremq; sistit.Coccymelea,  
Prunus.

Colla, Glutem.

**G** Luten quod ad libros preparant ex similagine & garo, emplasticæ, & coctoriæq; facultatis existit.Colla.  
Glutem.

Colocynthe, Cucurbita.

**H** Vmida & frigida est in secundo ordine. Quare succus eius rosaceo mistus, aurium dolori contra-cto ex phlegmone, est utilis. Præterea restinguit sitim.Colocynthe.  
Cucurbita.

Colocynthis.

**G** Vistu amara est, uehementerq; purgatoria facultate prædita. Ipsius uirentis succus intritus, ischiadicis prodest.

Colocynthis.

Comarus, Arbutus, Cuius fructus Vnedo.

**F** Ructus unà cum arbore acerbus est. Est autem hic & insensus stomacho, & capiti dolori concilians.Comarus.  
Arbutus.  
Vnedo.

Commi, Gummi.

**L** Achryma est concreta in truncis arborum ipsam producentium: estq; exiccatoriæ & emplasticæ facultatis, asperitatibusq; medetur.Commi.  
Gummi.

Iiii iiij



Conia, Lixiuum.

Conia.  
Lixiuum.

**O**Mnium maximè abstersorium exiccatoriumq; est, quod ex cinere ficus & tithymallorum efficitur: fereq; putrefacientis est facultatis.

Conyza.

Conyza.

**C**Onyza & maior & minor adsimilis sunt, tum temperaturæ, tum facultatis, gustu amaræ & acres. Luculenter autem excalescunt: siue quis folia cum teneris ramulis parti infricet: siue ubi oleo incoxerit, eo utatur. Siquidem rigores per circuitum redeunt, sanare tale oleum uidetur. Consimilis quoq; flores sunt facultatis. Quos quidem nonnulli ex uino propinant, ad educendos menses, atq; pellendum foetum. Est & tertium conyze genus in locis humidioribus nascens, utrisq; illis graueolentius & imbecillius. At primæ memoratæ, calfaciunt & siccant in tertio ordine.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

Coriannon.  
Corion.  
Coriandrum.

**H**Ancherbam refrigeratoriâ esse Dioscorides perdidit, q; mista panis aut polentæ, illitaq; erysipelas curet. Quanq; certè exactum aliquod erysipelas, quod utiq; inflammatum est, & flauum, haud unq; à tali cataplasmate persanabitur: sed illud tantum quod refrigeratum iam fuerit. Coriandrum itaq; ex contrarijs facultatibus constat, plurimū habens essentię amaræ, quæ tenuiū partium est & terrena. Nec parum etiā aqueę humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis. His adiunctum est quoq; astrictiōis paucillū. Quod autem longè à refrigeratione absit coriandrum, hinc constat, q; choeradas siue strumas, cum lomato discutiat: id quod nullum refrigerantium medicamentorū facere est aptum.

Coronopus.

Coronopus.

**C**oronopodis radix coeliacis prodesse creditur manducata.

Costus.



**L**Euiculam planè amaram: plurimam autem acré Costus:  
 & calidam in se qualitatem simul et facultatē ob-  
 tinet; adeò ut etiam exulceret. Quare in quibus ex cal-  
 facere partem quāuis, aut ex alto in superficiem extra-  
 here quippiam est opus, ad costum cōfugitur. Eadem  
 de causa urinas mensesq; puocat: & ad ruptā, conuul-  
 sa, & laterum dolores congruit. Porrò ob amaritudi-  
 nem quæ illi inest, lātos lumbricos enecat, maculasq;  
 à sole cōtractas exterit, illitus cum aqua aut melle. In-  
 est item flatuosa quædam illi temperiei humiditas, per  
 quam & uenerem excitat cum uino mulso.

Cotyledon, Vmbilicus Veneris.

**H**Vmidam, subfrigidam, obscurè astringētē, ac Cotyledon:  
Vmbilicus  
Veneris:  
 leuiter amaram obtinet facultatē. Vnde refrige-  
 rat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phlegmonas  
 erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode persā-  
 nat: æstuantiq; uentriculo commodissimum cataplas-  
 ma existit.

Crania, Cornus.

**F**Ructus eius admodum acerbus est, esuiq; aptus: Crania:  
Cornus:  
 proinde ualenter aluum restringit, quemadmodū  
 & mespila. Foliā quoq; & germina pacerba sunt gu-  
 stui, ualenterq; desiccant. Itaq; maxima uulnera gluti-  
 nare possunt, potissimumq; durorum corporum.

Crambe, Brassica esculenta.

**D**Esiccādi uim habet, tum esa, tum foris imposita: Crambe.  
Brassica escu-  
lenta.  
 non tamen admodum acrem. Præterea & uulne-  
 ra glutinat, & maligna ulcera sanat, phlegmonasq; iā  
 induratas, atq; ægrè solubiles, necnon erysipelata id  
 genus, epinyctidasq; et herpētes curat. Habet quiddā  
 etiam in se abstersoriū, quo leprās elicit. Porrò semen  
 eius potum, amarum quum sit, lūbricos perimit. Eadē  
 facultate ephelidas, lentes, & quęcunq; modicam ab-  
 stersionem postulant, adiuuat. Cineres caulium brassi-  
 cæ desiccant usq; adeò, ut causticæ facultatis partici-



pes esse uideantur. Quibus sanè cum adipe mistis contra inueteratos laterum dolores utuntur. Sic nāq; ualenter digerens pharmacum redditur.

Crambe agria, Brassica agrestis.

Brassica agrestis.

**C** Alidior sicciorq; et amarior q̄ domestica est: quā obrem nec citra noxā intra corpus sumit̄. Exergit autem & degerit q̄ domestica etiam ualentius.

Crambe thalattia, Brassica marina.

Brassica marina.

**N** On solum aluū deſicit, subsalsa & subamara existēs, sed etiā ē ad externos corporis usus idonea.

Cratægonos.

Cratægonos

**F** Ruētus eius & acris gustanti est, & utenti frigidus, similis milio.

Crethmon.

Crethmon.

**G** Vſtātibus falsum est, cum paucula amaritudine: quāobrē uis eius est exiccatoria, & absterforia.

Crithe, Hordeum.

Crithe.  
Hordeum.

**P** Rimi est ordinis in exiccando & refrigerando. Habet etiam absterſionis pauſillum. Præstat in cibo fabis, q̄ flatuosam naturam exuat. Quantūcūq; enim fabas coxeris, flatuosa semper illis natura remanet. Sunt quippè crasſioris essentia quā hordeum, ob idq; eo plus etiam alunt. At polenta multò plus hordeo desiccatur.

Crimnon.

Crimnon.

**P** Lūs nutrit quā polenta, sed ægrius concoquitur. Sorbitio quē ex eo conficitur, si ex zea fiat, leuiter uentrem sistit.

Crinos, Lilium.

Crinos.  
Lilium

**L** Ilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aquea, eaq; temperata. Quare quod ex eo conficitur oleum, digerendi, emolliendiq; citra morſum facultatem sortit̄: unde fit, ut uteri sit duritiebus aptissimū. Porro radix foliaq; per se trita, desiccant, abstergunt, & digerunt



moderatè. Proinde quoq; ambustis competunt. Radicem ergo tostam, ac dein rosaceo cōtritam, ambustis quoad obducat cicatrix, imponunt: quū sit etiā ulcerū aliorum remedium. Emollit præterea uteros, mēsesq; prouocat. Ceterū quum aut uirilignes, aut psoram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, cōmiscemus illi aliquod aliorum medicaminum ualidius extergentium, cuiusmodi est mel. Imposuimus uerò etiam quandoq; & foliorū succum cū melle & aceto coctum. Eratq; respectu utriusq; portio ipsius succi quincupla. Atq; itaq; conficiebatur insigne medicamentum ad omnia ulcera, quæ exiccati absq; morfu postulant.

## Crocodilion.

**C**rocodili semē acre est, atq; odoratum, urinam mensesq; ciens: itaq; facultatem habet calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis sint facultatis, nephriticos adiuuat. Radix pectoris excreationibus ualenter conducit. Trahit uerò etiam per nares sanguinem. Crocodilion.

## Crocus.

**S**ecūdi quidem est ordinis excalfacientium: primi uerò exiccantiū. Proinde concoquendi quoq; uim obtinet, adiuuante etiā ad id, quadā exigua astrictione. Crocus.

## Crommyon, Cæpa.

**C**æpa ex quarto est ordine excalfacientium. Essentia eius potius crassarum est partium. Vnde etiā hæmorrhoidas aperit, tū apposita, tum cū aceto inuncta. In sole alphas abstergit, tū alopecij attrita pilos alcyonio citius restituit. Succus eius n̄s q suffusi sunt, aut aciem oculorum obtusam præ crassitudine humorum habent, inunctus prodest. Ob huius temperaturā tota cæpa flatuosa est, manducata. Itaq; quæ temperie sicciore sunt, minus flatuum generant. Crommyon.  
Cæpa.

## Cyamos, Faba.



Cyamos.  
Faba.

**M**Ediocriter exiccat, refrigeratq;. At caro eius paulum quoq; abstergentis facultatis cōtinet: sicuti putamen nonnihil astringentis. Porrò ut edulium, flatulēta est, & coctū difficilis, si quid aliud: excreationibus ex pectore & pulmone idonea. Vt medicamentū uerò, foris imposita, desiccet innoxie. In podagricis ea sæpenumero usi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. Ad neruorū tum contusiones, tum uulnera, farinā eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos quos ex ictu iam occupauerat phlegmone, cum polenta. Sed & testū & uberum aptū est cataplasma. Quo quidem & lac ipsum extinguatur, & puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra pmanet.

Cyclaminus, Rapum, Tuber terræ.

Cyclaminus.  
Rapum.  
Tuber terræ.

**A**bstergit, incidit, ora uenarum aperit, attrahit, & digerit. Succus eius hæmorrhoidas referat, uiolenterq; ad secessum puocat, in floccis appositus. Sic etiā facultatibus phymata, strumas, aliasq; durities digerentibus cōmiscetur, ac suffusis cum melle illitus comperit. Ad hæc per nares expurgat. Adeò uehemens eius facultas est, ut abdomine illito, subducatur aluum, & fœtum perimat. Tota autem radix succo imbecillior est, q̃q; & ipsa uehemens satis. Nam & menses siue epota, siue apposita, euocat, & aurigini prodest. Modus eius bibendi est drachmarū trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem detergit, ac tū alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curat: necnō auxilio est lieni indurato. Fructus etiam alterius cyclamini, quā nonnulli cyssanthemon nominant, cum uino pluribus diebus potus, sanat lienem, urinas mouens, atq; aluum subducēs. Locos quoq; eicit, atq; asthmaticis auxiliat. Qualitas eius gustui acris est & sublenta.

Cyminum, Cuminum.

Cyminum.  
Cuminum.

**C**Ymini semen calfacit in tertio ordine, urinā mouet, extinguitq; flatum.



Cynos batus, Sentis canis.

**H** Vius fruticis fructus non segniter astrictorius Cynos batus.  
 est. Folia uerò mediocriter, lanugo fructus, arte. Sentis canis.  
 riam uitiat.

Cyparissus, Cupressus.

**C** Vpressi folia, germina, pilulæ recentes & molles, Cyparissus.  
 magna ulcera glutināt in duris corporibus. Qua Cupressus.  
 re resiccandi uim habent absq; insigni acrimonia aut  
 calore. Tāta enim ei acrimonia inest, caliditasq; quā  
 ta satis sit deducēdæ in altū acerbitati. Proinde in alto  
 latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humi  
 ditates, innoxie depascit et populatur. Sic enterocœli-  
 cos iuuat, exiccans, roburq; addens corporis partibus  
 præ humiditate laxatis. Quidam ea utuntur ad carbun-  
 culos, herpesq; polentæ miscentes. Sunt qui ad ery-  
 sipelata utantur.

Cyperus, Iuncus quadratus.

**C** Yperi radices excalfaciunt pariter & siccāt absq; Cyperus.  
 mordacitate. Itaq; ulceribus inueteratis mirifice Iuncus qua-  
 profunt. Habent etiam quippiam astringens: quapro- dratus.  
 pter ulceribus item oris conueniunt. Quin & inciden-  
 di uim quampiam illis inesse testificandum est, qua &  
 calculos exterunt, & urinam mensesq; prouocant.

Cypros.

**H** Vius arboris folia summaq; germina habent in Cypros.  
 se quiddam digerēs cum aquea substantia modi-  
 cè calida; habentq; & astrictionem quādam ex terre-  
 na substantia frigida. Itaq; eorum decocto quidā am-  
 busta fouent, necnon igneas phlegmonas, carbuncu-  
 losq;. Nam absq; molestia siccant. Sed sponte ortis in  
 ore ulceribus cōmansa folia cōmodissima sunt.

Cytisus.

**C** Ytisi folia digerendi facultatē obtinent, aqueæ & Cytisus.  
 temperatæ mistam, ut malua.

Coneion, Cicuta.



Conion.  
Gicuta.

**Q**Uod extremè sanè refrigeret, omnes norunt.  
Conos.

Conos.  
Strobilus.  
Cocalus.

**C**oni fructus, quem cocalum & strobilum appellant, uiridis totus, habet cum humiditate amaritudinem quampiam & acrimoniā. Proinde purulentis, & ijs quibus facilè expuere est opus, accommodatur. Quod esculentum est, nutrimentum est coctū difficile & ualidum. Vt medicamen autem asperitati leniendæ congruit, si præmaceratus in aqua, omnem acrimoniā exuerit. Nam reliquū sic minus mordax efficitur, in medio calidæ & frigidæ qualitaris consistens: ex aquea et terrea mistū substantia, minimum participās aeris.

Lagopus.

Lagopus.

**F**acultatis est desiccantis, adeò ut fluxus alui probe exiccet.

Lathyrus.

Lathyrus.  
Esula.

**E**T succo, & purgatoria ui, tithymallū refert: nisi quod semen apparet dulce, licet maximè sit purgatoriū.

Lampfane.

Lampfane.

**E**Sa quidē succos prauos procreat. At illita, abstergendī, digerendīq; nōnullam facultatē sortitur.

Lapathum.

Lapathum.  
Oxylapathū.

**D**Igerit moderatè. At oxylapathum, nonnihil etiā repercutit. Manifestè ipsorum semen astringit: ita ut dyarrhæas & dirrhœas persanet.

Limonium.

Limonium.

**E**Ius fructum, utpote acerbum, ex uino exhibet cœliacis, dysentericis, et hæmoptoicis. Iuuat & profluuium muliebri. Satis est oxybaphi mensura.

Leichen.

Leichen.

**L**Eichenas curat, extergentem, modicèq; refrigerantem, ac siccantem obtinens facultatem. Nascitur enim in humidis roresq; perfusis saxis.

Leontopetalon.

Leontopetalon.

**R**Adix eius, digerendi facultatem, et exiccandi, cal



faciendiq; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

**E**X quarto est ordine excalfacientiu, simile prorsus Lepidium. nasturtio, nisi q; minus desiccat.

Leucas.

**A** Crem possidet qualitatem exuperantem: tempe raturam uerò calidam, siccamq; in tertio quodammodo ordine.

Leucas.

Leucacantho.

**H**Vius radix amara est, ac p inde incidit, exiccatq; in tertio ordine. Calfacit autem in primo.

Leucacantho.

Leucoion.

**E**Xtergit ac tenuium est partium: plus tamē flores, ac præcipuè qui sunt sicciores. Hi quippè & oculorum crassas cicatrices extenuant. Præterea menses eorum decoctum mouet, secūdas, & partum emortuū elicit, bibitumq; facit abortum: maximè amarum quū sit. Quòd si eius uires multa mistione aquæ frangant, erit contra phlegmonas, & difficilia ulcera, cōmodum medicamen. Semen etiam eiusdem est facultatis, radicesq; similiter, nisi q; hę sunt crassioris essentię, terreq; magis. Cum aceto tamen lienes induratos psanant.

Leucoion.

Leuce, Populus alba.

**E**X aquea, tepida, & terrena extenuata essentia conflatur. Quamobrem & abstergentis facultatis est particeps.

Leuce.  
Populus alba.

Libanotus, Thus.

**E**Xcalfacit secundo ordine, desiccat primo, habet quoq; astringentem pusillam. Cortex eius euidenter astringit, desiccatq; in secūdo ordine. Est autē crassiorum partium q; thus, & minimum acrimonię possidet. Quare in hæmoptoicis, stomachicis, coeliacis, & dysentericis eo utimur. Ramus eius, siccioris & calidioris ē facultatis q; ipsum thus, adeò ut ad tertiu usq; excessum perueniat. Habet uerò etiam & absterforiu

Libanotus.  
Thus.



quiddam. Vnde expurgare & implere oculorum ulcera potest.

Libanotides.

Libanotides.

**L**ibanotides tres existunt; una sterilis, due fructum ferentes. Omnes uerò emollientis, digerentis, incidētis, & abstergentis sunt facultatis. Succus tum radicis, tum herbae mistus melli, obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendat. Decoctum eius quam rorem marinum appellant, potum, regio morbo auxiliatur.

Lignys.  
Fuligo.

Lignys, Fuligo.

**F**uligo omnis exiccatoria est, ob idq; terrenae essentiae: habēs quasdam etiā ignis etsi pusillas reliquias: ratione quarum tenuium est partium. Ceterū quae speciatim in ea differentiae sunt, ea prouista materia eueniunt. Thuris fuligine utimur ocularibus medicamentis permista, ijs uidelicet, quae ad oculos etiā phlegmone tentatos, & qui adhuc fluxione affliguntur, exulcerati uel sunt, accommodantur. Nam & illa expurgat, & carne implet. Terebinthinae etiam myrrhae q; fuligo, molestia caret; non secus q̄ thuris. Sed styracis quodāmodo ualentior est. Magis etiā picis liquidae. Qua adhuc magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia superciliorum uocata ptila, & erosos angulos oculorū, & citra phlegmonem humidos.

Libisticum.

Lybisticum.

**L**ybistici radix et semen, ex genere excalfacientium sunt, adeo ut et menses cieant, & urinas prouocent, flatuq; discutiant.

Linorpermō.  
Lini semen.

Linosperrmon, Lini semen.

**F**latuosum est esum, etiam si frangatur. At calfacit quidem quodāmodo in primo ordine, humiditatis & siccitatis, in medio existens.

Linozostis.  
Mercurialis.

Linozostis, Mercurialis.

**E**A utuntur omnes ad subductiones alui duntaxat: Quanc̄



Quancūq; etiam admota, ualenter digerit.

Lonchitis.

**R** Adix eius quæ semē gerit triangulare, urinā ciet. *Lonchitis.*  
Folia eius quæ scolopendriæ similis est, uiridia  
quidem, uulnera glutinant: sicca autem, & cum aceto  
epota, lienes induratos perfanant.

Lycion.

**A** Rbor est spinosa, ex qua lycium fit, medicamē id *Lycion.*  
liquidū, quo ad sugillata, sedis orisq; phlegmo-  
nas, ulcerationes, herpetas, putredines, ulcera cōtuma-  
cia, aures pure fluentes, intertrigines, & paronychias  
utuntur. Est enim facultatis exiccatoriæ, compositum  
ex diuersi generis substantijs, altera quidem tenuium  
partium, digerente atq; calida: altera terrestri & frigi-  
da, ex qua astrictiōem exiguam obtinet. Ceterū dige-  
rit & siccat in secundo ordine: in calore autem medijs  
est proximum. Est porrò lycium Indicum ad omnia  
ualentius.

Lyfimachios.

**S** Vperantem astrictiōem fortitur: per quā omnes *Lyfimachios.*  
sanguinis fluxus reprimit, tum pota, tum cataplas-  
matis modò admota.

Lychnis.

**S** Emen eius calidum & siccum est, secundo quodā *Lychnis.*  
modo, aut etiam tertio ordine.

Lotos herba.

**L** Otos domestica, quam trifolium nominant, ut me *Lotos herba.*  
diocriter cōcoquendi, sic etiā exiccandi uim pos- *Trifolium.*  
sudet, in caliditatis frigiditatisq; coniugio, media quo-  
dammodo existens. Semen agrestis loti, secundi est or-  
dinis calfacientium: habetq; nonnihil absterforiū. Por-  
rò Ægyptiæ loti semen etiam in panes fingitur.

Lotos arbor.

**N** On ita multe astrictorię qualitatis est particeps, *Lotos arbor.*  
sed & tenuium partiū est, & exiccatoria. Cuius

Tomus IIII.

K k k k



siccę ramenta profluuiio muliebri, dysenterijs, capillorum effluuiio, coeliacisq; affectibus accommodantur, aut in uino, aut in aqua concocta.

Macer.

Macet.

**C**ortex est qui ex India aduehitur, gustu multum acerbato, cum leuicula quadam acrimonia odorata. Constat autem ex mista essentia, pleraq; terrena frigida, paucula uerò calida & tenuiū partium. Itaq; ualenter desiccatur, astringitq; ob idq; coeliacis & dysentericis medicamentis miscetur, in tertio exiccantiū consistēs ordine: in caloris frigorisq; discrimine, neutrum insigniter præstans.

Malabathrum.

Malabathrū.

**M**alabathri solum cum spica nardi simillimam obtinet facultatem.

Malache, Malua.

Malache.  
Malua.

**A**grestis, quidem digerētis paululū & emolliētis leuiter est facultatis: hortēsis uerò, quāto plus habet aqueę humiditatis, tāto facultate ibecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto & siccior. Cæterū Althea omnium efficacissimè digerit.

Mandragora.

Mandragora.

**R**efrigerat tertio excessu. Nonnihil tamē pomis caloris atq; humiditatis inest. Vnde soporem conciliant. Radicis cortex non tantū refrigerat, sed etiam siccatur. Quod eo includitur, imbecillimum est.

Marathrum, Fœniculum.

Marathrum.  
Fœniculum.

**C**onfacit in tertio, desiccatur in secundo ordine: proinde lac gignit, auxiliatur suffusis, mensesq; et urinas promouet. Radix & semen hippomarathri, amplius q̃ domestici siccant: quare & uentrē uidentur sistere. Possunt etiā & calculos frangere, curare ictericos, mensesq; & urinas mouere: minimè tamen lac gignere.

Mastiche.

Mastiche.

**C**andida quidem & Chia, astringit simul emol-



litq; Proinde stomachi, uentris, intestinorum, iecorisq; inflammationibus competit, ut puta secundo ordine exal faciens & siccans. Nigra uero, quæ Aegyptia dicitur, magis desiccet, minusq; alstringit: quam obrem aprior est ad ea quæ ualidiorem digestionem per halitum postulant. Porro oleum, quod precipue ex Chia conficit, similis est cum mastiche facultatis.

Melanthium, Nigella.

**E**xcalfacit & siccet in tertio ordine, estq; amarum, atq; tenuium partiū. Quare catarrhos sanat in lin teo admotum, atq; assidue olfactum: flatus potū extin guit: lumbricos enecat, non esum modò, sed etiam fo ris applicitum: lepras, clauos, atq; myrmecias exterit: orthopnoeam iuuat, & menses puocat: in summa uero ubi sectione, extersione, desiccatione, exalfectione est opus, præstantissimum id remedium existit.

Melilotum.

**Q**uidam habet astringens, digerit tamen, con coquitq; . Copiosior enim in eo est substantia calida q̃ frigida.

Mel.

**D**esiccet exalfacitq; secundo ordine: ac detergen tem facultatē obtinet. Porro coctū, minus acre absterforiumq; redditur. Itaq; ad sinuosorum ulcerū glutinationē eo utuntur. Cæterum quod mel est ama rum, mistæ facultatis existit. At Saccharo, quod ex In dia et felici Arabia conuehitur, concrefcit in calamis, estq; mellis species, minus certè nostrate dulcius, sed similes ei uires obtinens, quod ad abstergendum, de siccandum, & digerendū pertinet. Quatenus uero nec inimicum uentriculo est, ut nostras, nec sitim adferēs, eatenus ab illo substantia differt.

Melissophyllon, Citrago.

**M**arrubio similis est facultate, sed plurimū ab eo uincitur. Quamobrē nec utitur eo quispiam, quū

Melanthium,  
Nigella.

Melilotum.

Md.

Saccharum.

Melissophyl  
lon.  
Citrago.

Kkkk ij



larga marrubij copia suppetat.

Mespilum, Tricoccon, q̄ tria grana gerat.

Mespilum.  
Tricoccon.

**F** Ructus eius admodum est acerbus, uixq; edi possit, uentrem extremè coercens. Quin & in germenibus & folijs acerba hæc qualitas non pauca reperit̃.

Medion, Trifolium odoratum.

Medion.  
Trifoliū odoratum.

**R** Adix quidem eius austera est, omnesq; fluxiões cohibet. At semen tantum abest ut id molliatur, ut etiam menses cieat; nimirum tenuium partium quū sit, & facultate incidendi præditum.

Mecon, Papauer.

Mecon.  
Papauer.  
Roxas.

**Q** Vum quatuor eius insignes species sint, facultas omnium existit refrigeratoria. Cæterū satiui semē, mediocriter somnum conciliat, uisu candidū; proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum esitant. At ex syluestribus, eius quod rhœas dicūt, quia flos ipsius celeriter defluit, semen ualidius refrigerat. Itaq; nequaquā eo quis innoxie solo uti possit. Illius uerò quod calicem incidentem sustinet, atrum existit semen, medicamentosumq; atq; impensè refrigerans. Quod autem longiorem emittit calicem, medicatissimum omnium est, admodumq; refrigerans, idq; omnibus partibus suis. Adeò quippe refrigerat, ut stuporem ac mortem etiam inducat. Est enim ex quarto & ultimo refrigerantium ordine.

Mecon ceratitis, Papauer cornutum.

Papauer cornutum.

**V** Im habet incidendi, extergēdiq;. Itaq; radix eius in aqua ad dimidiū decocta, hepaticos affectus adiuuat. Folia & flores sordidis & contumacibus ulceribus profunt. Sed ea reiicere oportet ulceribus iam repurgatis: alioqui sanam carnem exedent.

Papauer Herculeum.

Mecon Heracleia. Papauer Herculeum.

**S** Emen habet pituitam expurgans.

Melea.  
Malus.

Melea. Malus.

**M** Alus non omnis eiusdem naturæ est, sicuti nec



eiusdem fructus. Succi siquidem, cortices, foliaq; arborum, etiā inter se dissident. Itaq; si acidiora austerioraq; sint, illis uulnera glutinare possis, tum in phlegmonarum initio repercutere influxum, ac uētriculum exolutum & lāguidum roborare: at aquosioribus, mediocres phlegmonas incipientes & gliscentes remittere. Quod autem plurima pomis omnibus rectementia frigidaq; insit humiditas, hinc liquet, q̄ nullus eorū succus seruari possit: uerūm acescāt corrumpanturq; uniuersi. Solus enim cydoniorum & struthorum (que propter astrictionem uehemētem, cæteris minus sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: per se autem minimè.

Succi qui seruari possint, et quomodo.

Melea Persice, Persica malus.

**I**N germinibus & folijs uincētem habet qualitātē amaram. Proinde folia eius trita & super umbilicum posita, lumbricos enecant: estq; digerens medicamen. Fructus humidior est, & temperie frigidior.

Persica malus

Melea Armenice, Malus Armenica.

**F**RUCTUS humidior frigidiorq; est: Vtrunq; secundo quodammodo excessu.

Malus Armenica.

Melea Medice, Malus Medica, Citrium.

Malus Medica.

**Q**UOD in fructu semen amplectitur tertij est ordinis resiccantium atq; refrigerantium. Cortex desiccatur quidem in excessu secundo, non tamen frigidus est, sed temperatus, aut paulò infra. Caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa, frigidaq; Semen amarum est, digerereq; & exiccare potens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia exiccādi & digerendi uim obrinent.

Meum.

**R**ADICES eius sunt calidæ tertio excessu, in secundo siccæ. Proinde urinas mēsesq; mouent. Quòd si liberalius sumantur, capiti dolorem conciliant.

Meum.

Milax tracheia, Milax aspera.

Kkkk ij



Milax aspera.

**V**arijs clauiculis suis arboribus circūuoluitur. Folia eius & acria gustanti, & utenti calida existūt.

Milax lenis.

Milax lenis.

**Q**uodāmodo iam dictæ similes uires obtinet.

Morus.

Morea, Morus.

**M**ori fructus maturus quidem aluū subducit: immaturus uerò, ubi aruerit, restringit admodum. Quare ad fluentes affectus est cōmodus. At maturorū succus, propter astrictiōem quam habet, ad stomatīca medicamenta est utilis. In radicis cortice purgatoria uis cum quadam amaritudine exuperat, ita ut latos uermes enecet.

Myagros.

Myagros.

**O**leum quod ex semine ipsius funditur, emplasticam facultatem obtinet.

Mycetes.

Mycetes, Fungus.

Fungus.

**F**rigida humidaq; admodum plāta est, quare proximè ad enecātem facultatem accedit. Et sanè inter eos sunt qui interficiant: maximè qui ex natura mistam habent qualitatem putrilaginosam.

Myle.

Myle.

**R**adix eius contrahentis est facultatis. Quam cum farina lolij apertā uuluā sanare ait Dioscorides.

Myosotis, Auricula muris.

Myosotis.

**D**esiccat secundo ordine, cæterū nullam euidētem caliditatem sortitur.

Myrice, Tamarix.

Myrice.

Tamarix.

**A**bstergit & incidentis est facultatis, absq; perspicua desiccatione. Habet uerò etiam astrictiōem nōnullam. Igitur cum aceto decocta prodest lieni indurato. Sanat etiam dentium dolores. Fructus & cortex non paucam possident astrictiōem. At cinis myricæ, admodum desiccatoriæ facultatis est, plurimam habens abstergendi uim, astringendi pauxillam.

Myriophyllon.



**A** Deò exiccat, ut uulnera glutinet.  
Myrrhis.

Myriophyllò.

**R** Adix eius est odorata et dulcis, mensesq; mouet,  
necnō thoracem atq; pulmones purgat. Calfacit  
itaq; secundo ordine, cum partium tenuitate.

Myrrhis.

Myrrhine, Myrtus.

**I** N hac planta uincit terreum & frigidum. Habet ta-  
men aliquid tenue & calidum. Quare ualenter de-  
siccatur. Porrò quod ramis & trunco adnascitur tubero-  
sum, quanto siccus cæteris partibus est, tanto desic-  
cat & astringit uehemētius. Folia item arida uiridibus  
plus desiccant. Itaq; omnes partes eius restringunt, tū  
foris imposita, tum intro assumpta.

Myrrhine.

Myrtus.

Moly, Ruta syluestris.

**R** Adicem habet nigrā, & florem lacteū. Vis eius  
tenuium partiū est, & calida tertio ordine; unde  
crassos humores desiccatur, digeritq; & urinā mouet.

Moly.

Ruta sylue-  
stris.

## GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIUM  
MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber VIII.

Nardustachys, Spica nardi.



**C**ALFACIT excessu tertio. De-  
siccatur secundo completo. Constat ex  
astringēti, acri, & leuiter amara sub-  
stantia. Quare radix iecori et uentri-  
culo cōuenit, & pota, & admota ex-  
trinsecus. Urinam ciet; morbus sto-  
machi sanat, uentris, capitis, & thoracis, fluxiones de-  
siccatur. Valenter tamen est Indica; quæ nigrior quàm  
Syriaca existit.

Nardus sta-

chys.

Spica nardi.

Kkkk iij



Nardus Celtica, hoc est Gallica.

Nardus Cel-  
tica.

**A** Domnia est imbecillior dictis, præter quæ ad pro-  
uocandam urinam. Nam calidior illis est, sed  
minus astringit.

Nardus oreæ: hoc est montana.

Nardus mon-  
tana.

**P**lurima in Cilicia nascitur, sed prædictis infirmior:  
Narthex, Ferula.

Narthex.  
Ferula.

**S**emen eius calfacit et tenuat. Medulla autem astri-  
ctionis est particeps. Vnde hæmoptoicis & cœ-  
liacis conuenit.

Napy.

Napy.

**C**alfacit desiccaturque ordine quarto.

Narcissus.

Narcissus.

**E**ius radix desiccatur adeo, ut uel maxima tendonum  
uulnera glutinet. Habet uero quiddam absterfo-  
rium & attractorium.

Neuras, Poterium.

Neuras.  
Poterium.

**D**esiccatur citra morsum, adeo ut incisos nervos glu-  
tinare credatur: ac præcipue radices eius.

Nerium, Rhododaphne.

Rhododaphne.

**F**oris quidem illitus is frutex, digerendi uim obti-  
net. At si intra corpus sumatur, uirulentus homini  
& plerisque pecudibus est.

Nymphæa.

Nymphæa.

**T**um radix eius, tum semen, desiccandi citra mor-  
sum uim habet. Itaque uentris profluvia, semenque im-  
modicè profluens sistit. At cui adest candida radix, ea  
& muliebri medetur profluuio, ex uino nigro & auste-  
ro epota. Vtraque autem abstergendi quandam uim pos-  
sidet. Quare maceratae quidem aqua, sanant alphos, li-  
quida uero pice, alopecias. Ad hæc tamē aptior est ea  
cuius radix est nigra.

Xanthion.

Xanthion.

**S**emen eius digerendi uim obtinet.

Xyris.



**T** Enuium partium, attractoria, digerendi, & desiccandi facultatis est, quā radix, tum multo magis fructus: qui quidem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

Xyphion, Gladiolus.

**X** Yphij radix, maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccaturq;.

Xyphion.  
Gladiolus.

Oe, Sorbus.

**A** Stringentem uim obtinet, at multo quæ mespilus imbecilliore. Proinde fructus eius gustui iucundus est, minusq; uentrem quæ mespilus constringens.

Oe.  
Sorbus.

Oenos, Vinum.

**E** X secundo est ordine calfacientium: sed quod admodum uetus est, ex tertio: sicuti mustum ex primo. Caliditati proportionem respondet siccitas.

Oenos.  
Vinum.

Olynthi, Grossi.

**A** Crem facultatem sortiunt. Cocti itaq; duos tumores discutiunt: crudi myrmecias & thymos eijciunt.

Olynthi.  
Grossi.

Olostium.

**D** Esiccandi uim obtinet cum astrictione: ideoq; propinatur ad rupta.

Olostium.

Olyra.

**M** Ediam tritici & hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum, quæ ut medicamentum.

Olyra.

Onagron.

**H** Vius radix arefacta uinosum quiddam redolet, maximeq; ad uini facultatem accedit.

Onagron.

Onosma.

**A** Cri & amara substantia constat. Cuius folia in uino pota foetum extinguere expellereq; credunt.

Onosma.

Onobrychis.

**R** Arefaciendi digerendiq; uim obtinet. Proinde folia eius uirētis illita, phymata digerunt: arefacta uerò, & cum uino pota, strangurias sanant: sudoresq; eliciunt, cum oleo inuncta.

Onobrychis.



Ononis.

Ononis.

**R** Adix eius calfacit quodāmodo in tertio ordine, abstergitq; & nonnihil incidit. Itaq; non tantum urinas prouocat, sed & lapides frāgit, & crustas detrahit. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuerit cocta, colluuntur.

Oxos.  
Acetum.

Oxos, Acetum.

**E**X frigida calidaq; substantia constat: utraq; tamē tenuium partium. Verū calidam frigida exuperat. Desiccat porro in tertio gradu.

Oxyacanthos.

Oxyacanthos.

**V**T specie, sic facultate hæc arbor piro syluestri est similis, Cæterū piri syluestris fructus, prorsus \* acerbus est: oxyacanthos uerò, & tenuium est partium, & nonnihil incisorium sortitur: estq; rubcus & rarus. Qui quidem affectus omnes fluxionum conhibet.

Opos, Succus.

Opos.  
Succus.

**C**Yrenaicus quidem reliquos omnes caliditate & tenuitate exuperat: ideoq; omniū maximè per ha- litum digerit. Quanq; sanè & cæteri admodum calidi sint, & spirituosī. Porro licet complures etiam sint aliī succi, qui effluunt, incisa radice: ob excellentiam tamē sic dicitur Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus.

Origanus.

Origanus.

**H**Eracleotica quidē efficacior est onitide: agrestis tamen est ualentior utraq;. Omnes uerò incin- di, extenuandi, calfaciendi, & exiccandi obtinent facul- tatem, in tertio nimirum excessu. At Tragoriganus etiam quippiam astringit.

Tragoriganus

Orobus, Eruum.

Orobus.  
Eruum.

**D**Esiccat quidem excessu secundo intēso, calfacit uerò primo. Porro quatenus amaritatis est par- ticeps, eatenus incidit, extergit, atq; obstructions ex- pedit. Cæterū si sumatur copiose, sanguinem per urinas euocat.



Orobanche, Eruangina.

Orobanche.  
Eruangina.**S**iccæ frigidaq; temperaturæ est, in primo ordine.

Oryza.

**H**abet astrictorium quippiam, quare mediocriter  
aluum sistit.

Orchis, Testiculus canis.

**R**Adici eius bulbosæ & geminæ, uis inest humida  
& calida, gustantibusq; dulciuscula. Cæterū ma-  
ior radix multam habere uidetur humiditatem excre-  
mentitiam, & flatulentam: quapropter epota uenerem  
excitat. Minor uerò, quum ad calidius & siccus uer-  
gat, tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etiam co-  
hibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, tostæ.Orchis.  
Testiculus ca-  
nis.**S**iccatur ultra primū excessum. Quare nō ita est ad ue-  
nerē cōmodus. Oedemata illitus discutit. Vlcera sordi-  
da expurgat. Herpetes sanat. Siccatus multo amplius  
desiccatur. Nam putrescētia contumaciaq; restituit ulce-  
ra, & subastringens quū sit, uentrē sistit ex uino potus.

Orchis, Serapias.

Orchis.  
Serapias.**A**Mara est, & aperiendi uim obtinet. Quare iecur  
obstructum adiuuat.

Pancratium.

**R**Adix huius, scillæ similem gustū refert, & uires,  
multo tamē imbecilliores. Ea itaq; pro scilla, ubi  
hæc non adest, utuntur.

Ofris.

Paliurus.

**F**olia eius & radix adeò perspicuè astringūt, ut flu-  
xum uentris cohibeant: adeoq; digerunt, ut mē-  
ta phymata curent. At fructus, tantam incidendi uim  
possidet, ut calculos uesicæ cōminuat, & pectoris pul-  
monisq; excretionibus auxilietur.

Paliurus.

Papyrus.

**O**Xycrato uino uel macerata, recentia ulcera gluti  
nat, maximè in circulum circumposita, ut mate-

Papyrus.



Chartæ cinis.

ria sanantia medicamina excipiens. At ubi usta fuerit, medicamen exiccatorium existit, ut chartæ combustæ cinis. \* Hoc tamen cinis papyri est infirmior.

Panax Heraclium.

Panax Heraclium.

Opopanax.

**E**X hoc conficitur opopanax, radicibus et caulibus eius incisis. Porro opopanax ipm tum mollit, tum digerit. At calfacit quidem in tertio ordine; in secundo autem siccatur. Cortex radice excallacit etiam & siccatur, minus tamen quam succus. Cæterum abstergerendi nonnullam facultatem sortitur. Quare eo utimur & ad nuda ossium, & ad ulcera contumacia. Sufficienter siquidem quæ talia sunt, carnem procreant. Fructus calidus est & ipse, ac mensibus mouendis accommodus.

Panaces, Asclepium.

Panaces Asclepium.

**M**Inus est calidum supradicto panace. Quare floribus eius & semine melli mistis ad ulcera, phymata, & phagædænas utuntur.

Panax cheironium.

Panax, Cheironium.

**P**Rædicto similem facultatem obtinet.

Paronychia.

Paronychia.

**P**Aronychias & fauos sanat, digeritque ea quæ discuti postulant. Calfacit enim & desiccatur in tertio ordine, estque tenuium partium, & sine mordacitate.

Pentaphyllum.

Pentaphyllum.

**R**Adix eius desiccatur uehementer, nimirum in tertio ordine, citra mordicationem tamen. Minimum siquidem habet quàm acrimoniæ, tum conspicuæ caliditatis.

Peplos.

Peplos.

**S**Vccum habet similem tithymallis, quum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

Peplium.

Peplium.

**E**Tiam fruticulus hic succum habet ut tithymalli, ualidumque, non tamen admodum utilem. Radix eius uidetur superuacanea. Semen utile est, & flatulentum, pepli semini similiter purgans.



Peperi, Piper.

**P**iperis radix vires costo similes obtinet. Fructus nuper germinātis, longum existit piper: quare maturo est humidius. At fructus qui ueluti omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam ueluti superassatum uidetur. Vtrunq; tamen ualenter & calfacit, & desiccatur.

Peperi.  
Piperis differētia.

Persea.

**P**ersea folia modicè astringunt, ita ut nonnunq; si sterere queant sanguinem erumpentem.

Persea.

Periclymenos, Volucrum maius.

**F**ructus eius & folia adedò uehementer incidunt & calfaciunt, ut si diutius bibātur, urinam sanguinolentam efficiant: principio tantum urinam mouentia. Foris cum oleo illita etiam excalfaciunt. Iuuant & lenos, & difficulter spirantes. Competens mēsurā est drachmā unius cum uino. Desiccatur etiam semē, & (ut quidā tradunt) si liberalius bibatur, sterilitatē inducit.

Periclymenos  
Volucrum maius.

Peristereon.

**V**im habet hactenus desiccantem, ut & uulnera glutinet.

Peristereon.

Petalites.

**E**x tertio est ordine desiccantium: quāobrem ad caecoethe & phagedænica ulcera eam adhibent.

Petalites.

Petroselinum.

**E**ius semen est gustu acre, cum amaritudine: Sic & in operibus calidum, unā cum incidendi effectu. Hinc menses & urinas affatim prouocat, flatusq; discutit. Calfacit itaq; & siccatur in tertio ordine. Tota herba similem, sed imbecilliores possidet facultatem.

Petroselinum.

Peucedanum.

**S**uccus eius admodum excalfacit & digerit, estq; tenuium & incidentium partium. Quare omnibus neruorum affectibus credit opitulari: tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine humorum ortis. \*

Peucedanum.



Nec uerò intra corpus sumptus duntaxat, sed olfactu etiam prodest. Ad hæc sæpe foratorum dentium dolores, cavitati impositus, prius mitigauit. Quin etiam induratos lienes iuuat. Ad quæ omnia, licet etiam uti radice, quæ & squamas celerrimè ab ossibus detrahit, & arida illita ulceribus contumacibus remedium est optimum: minus quidem q̃ succus exalfaciens, nempe in secundo ordine iam completo: desiccans uerò in tertio incipiente.

Peganon. Ruta.

Peganon.  
Ruta.

**A** Crestis quidem, in quarto ordine exalfacit: Domestica uerò, in tertio. Est autem non solum gustu acri, sed & amaro. Ex quo sanè digerere, icidereq; crassos & lentos humores potest, atq; mouere urinas. Quin et tenuium est partium, flatusq; extinguit. Quare ad inflationes competit, ac ueneris appetentiam inhibet: digeritq; atq; exiccat strenuè.

Pissa. Pix.

pissa.  
pix.

**S**icca quidem siccatur, & calfacit secundo ordine. At plus siccare ualet q̃ calfacere. Humida uerò contrà, plus calfacit q̃ siccatur: habetq; partium tenuitatem nonnullam, qua asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mistæ. Abstergendi etiam, cōcoquendi, digerendiq; quandā uim habent, ueluti in gustu leuem amaritatem & acrimoniam. Sic leprosos ungues eximunt mistæ cum cera, lichenasq; detergunt. Coquunt item duos & cudos tumores, cataplasmatibus inditæ. Atq; ad ea omnia, humida ualentior est: arida uerò glutinandis uulneribus aprior.

Pisselæon.

Pisselæon.

**E**X humida pice efficitur, genere quidem ei simile, sed essentia tenuioris.

Pistacium.

Pistacium.

**F**Ructus eius quodammodo tenuioris essentia est,



subamarum quid, & odoratum retinens. Obstructiones itaq; oïum uiscerum aperit, sed precipuè iecinoris.

Pityides, Picearum fructus.

**A** Stringit, simulq; acris ē, cū amaritudine quadā. Vnde thoracis pulmonis q; expuitiōibus cōfert.

Pityides.  
Picearum fru-  
ctus.

Pitys, Picea.

**P**Iceæ cortex uincentem facultatem astrictoriā sortitur, sic ut intertrigines sanet, uentremq; potus sistat. Sed & ambusta cicatrice includit. Tedæ cortex illi adsimilis est, uiribus tamen moderatioribus. Vtriusq; arboris folia, glutinant ulcera. In coni folijs & cortice ualidior facultas est, adeò ut cum molestia mordicet. Fuligo quæ ex dictis colligitur, ad pilos superciliorum est commoda, itemq; ad angulos oculorum erosos, lipientes, & lachrymantes.

Pitis.  
Picea.  
Tedæ cortex.

Pityusa.

**V**iribus est similis tithymallo, succumq; sortitur similem, & similiter purgat.

Pityusa.

Platarus.

**H**umidioris frigidiorisq; est essentiæ, non ita multò q̃ symmetra Proinde folia uiridia trita & illita, non obscure nascentes phlegmonas adiuuāt. Correx & pilulæ magis desiccantem uim obtinent: ut ille quidem in aceto coctus ad dentiū adhibeatur dolores; pilulæ uerò cum adipe, ad ulcera ambusta. Vitandus est puluis folijs arboris insidens. Alioqui si attrahatur spiritu, arteriā offendit, ualenter siccans, exasperansq;. Nec non uocem lædit, sicuti & auditum & uisum, si in oculos aut aures inciderit.

Platanus.

Polygonon, Centinodia.

**V**ti astrictionis est particeps, ita in eo frigidum aqueum uincit: ut secundo excessu refrigeret, aut etiam initio tertij. Itaq; æstuantu uentriculo, erysipelati, atq; calidis phlegmonis, si illinatur frigidum, auxiliatur. Sistit præterea uniuersas fluxiones; qua ratione

Polygonon,  
Centinodia.



uidetur exiccatorium. Quare ad herpetas, ulceraq; bonum remedium est. Quin etiam cruenta uulnera glutinat, auriumq; puri & ulceribus confert. Stillicidio & stranguria affectis exhibitum, urinam mouet, ut Dioscorides ait. Fœminæ ad omnia mas præstat.

## Polygalon.

Polygalon.

**E**ius folia modicè astringunt, uidenturq; si bibantur, lac generare. Itaq; superauerit in eo calidum humidumq;.

## Polygonatum.

Polygonatū.

**A** Strictionis pariter & acrimoniæ habet quippiā, cum fastidiosa quadam amaritudine. Quare non usq; adeò est uescū. Sunt qui radicē eius illinant uulneribus. Alij eo n̄xuos in facie detergunt.

## Polemonium.

Polemonium.

**T**enuium partium est, & desiccandi uim obtinet. Vnde quidam radicem eius cum uino ad ischidas, dysenteriam, lienemq; induratū propinant.

## Polium.

Polium.

**A** Marum est ac modicè acre. Obstructione itaq; omnia uiscera liberat, urinamq; & menses promouet. At uiride magna etiam uulnera glutinat, & maximè species eius fruticosa. Aridum sanat rebellia ulcera: præcipuè quod minus est.

## Polium minus.

Polium minus.

**A** Crius & amarius est hoc q̄ maius, adeò ut ex tertio sit ordine desiccantium; ex secundo autem completo calfacientium.

## Polycnemon.

Polycnemon.

**D**esiccat & calfacit secūdo excessu; itaq; & ipsum uulnera glutinat.

## Potamogeiton.

Potamogeitō.

**A** Stringit & refrigerat similiter polygono; sed essentia eius crassior q̄ polygoni est.

## Polypodium.

Dulce m



**D** Vlcem simul & austeram uincentem obtinet Polypodium.  
qualitatem: ut facultatis sit citra morsum admo-  
dum exiccantis.

Praesium, Marrubium.

**P**raesium amarum quum sit, iecur ac lienem liberat Praesium,  
obstructione, thoracem & pulmonem expurgat, ac me- Marrubium.  
ses promouet. Sed illitum etiam detergit et digerit. Calfa-  
cit itaque secundo excessu completo: siccatur autem tertio  
ineunte, aut completo. Succo eius ad aciei oculorum cla-  
ritatem utuntur cum melle: per naresque auriginem purgat,  
ipsumque ad inueteratos aurium dolores adhibent.

Propolis.

**M**odicè quidem extergit, ceterum ualidè trahit. Est Propolis.  
enim essentia tenui. Excalfacit porro ordine secu-  
do completo, aut certè incipiente tertio,

Parmice.

**F**lores eius ciendæ sternutationis uim obtinet. Su Parmice.  
gillata et ceteras ecchymosis digerit. Viridis por-  
ro calfacit secundo ordine: tertio autem siccatur.

Ptelea, Vlmus.

**V**lmi folijs quandoque recens uulnus conglutina- Ptelea.  
uimus: confidentes astringentem simul & abster- Vlmus.  
gentem inesse eis facultatem. Ceterum cortex magis  
amarus est, astringentiorque magis. Itaque cum aceto & le-  
pras sanat. Quod si uiridis circumligetur uulneribus, ea  
glutinare potest. Radices etiam eandem uim obtinent.  
Quarum decocto sunt qui perfundant fracturas, quæ  
callo obduci desiderant.

Pteris, Filix.

**R**adix eius latum lumbricum perimit, si in meli- Pteris.  
crato pondere drachmarum quatuor bibatur. Qua- Filix.  
re ipsam partem uiuum necare, mortuum autem expel-  
lere, non est mirum. Siquidem amara existit, paulumque  
astrictionis obtinet. Unde ualidè ulcera desiccatur: citra  
morsum tamen. Simile ei uim habet Thelypteris.

Tomus IIII.

LIII



## Pycnocomum.

Pycnocomū.

**R** Adix, fructus, & folia eius, digerendi attrahēdiq; obtinent facultatem: acria nimirum quum sint. Folia itaq; phymata furunculosq; discutunt. Fructus ualentior est. Nam & palos, & tela infixa, ad extimam cutem elicit. Radix ad supradicta est infirmior, cæterū flauam bilem expurgat.

## Pyrethrum.

Pyrethrum.

**R** Adix eius causticam possidet facultatem, qua dentes refrigeratos mitigat. Porro ad rigores ante periodum cum oleo confricatur: stupidosq; & resolutos adiuuat.

## Pyros, Triticum.

Pyros.

Triticum.

**F** Oris impositum, primi est ordinis calfacientium: \*cæterum nec siccare, nec humectare manifestò potest. Habet uerò etiam quiddam lentoris, obstruentisq; naturæ. Quod ex eo amyllum conficitur, ipso est tum frigidius, tū siccus. Quod ex pane fit cataplasma, magis digerit, q̃ quod ex tritico: salis & fermenti ratione. Fermentum quippe uim attrahendi habet, digerendiq; quæ in alto resident.

## Rhamnus.

Rhamnus.

**D** Esiccat & digerit excessu secundo. Refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente. Proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida.

## Rhaphanis, Radicula.

Rhaphanis.  
Radicula.

**E** Xcalfacit excessu tertio: desiccat uerò secundo. Agrestis in utroq; efficacior est. Semen etiam efficacius est planta. Ei enim inest digerendi facultas.

## Rheum, Rha.

Rheum.  
Rha.

**Q** Viddam habet terrestre frigidum, ceu indicio est astrictio: adiuncta est illi tamē quædam caliditas. Siquidem si mandatur plusculum, subacre conspicitur. Est etiam aeris cuiusdam substantiæ subtilis: particeps: quod indicat laxitas, leuitasq;. Quare con-



uulsis, ruptis, orthopnœæq; prodest. Sic quoq; liuentia & lichena; cum aceto illitum persanat. Astriktionis ratione, sanguinem expuentibus, coeliacis, & dysentericis confert.

## Rhetinæ, Resinæ.

**R**esinæ omnes desiccant & excalfaciunt. Lentiscina tamen (quam uocant mastichem) primæ debentur partes. Nam præter q̃q; paucula ei inest astrictio, qua stomachi, uentrisq; & iecoris imbecillitatibus, phlegmonisq; etiam accommodatur, desiccet insuper citra mordacitatē. Minimum enim acris est, & maximè tenuium partium. Inter ceteras præfertur terebinthina, manifestam quidem, non tamē similiter atq; mastiche astrictionem possidens. Verūm adiunctam habet quandam amaritudinem, per quam magis q̃ mastiche digerit. Per eandem etiam usq; adeò abstergit, ut psoras sanet. Quin etiam quæ in profundo resident, magis ceteris extrahit, ob maiorem tenuitatem partiū. Attamē pinea, & hac etiam magis strobilina, acriores ea sunt, sed non magis tamen digerunt, attrahunt uē. Media inter has sunt picea & abietina. Habet porrò & emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicuti cyparissina in ipsa acrimonia.

Rhetinæ.  
Resinæ.  
Mastiche.

Terebinthina.

## Rhodos, Rosa.

**E**x aquea substantia calida, duabus alijs qualitibus mista, astringenti uidelicet & amara, composita est. Flos tamen, magis q̃ ipsa rosa, est astringens: ac proinde etiam exiccatorius est.

Rhodos.  
Rosa.

## Rhodia Rhiza, Radix Rhodia.

**T**enuium partium & digerentis est facultas. In calfaciendo uerò secundi ordinis est cēsenda; aut certè tertij incipientis.

Radix rhodia.

## Rhododaphne.

**T**ota sua essentia uenenū est & hominī & plerisq;

Rhododaphne.

LIII ij



pecoribus. Porrò calfacit excessu tertio: primo autem desiccatur.

Rhoea, Malum granatum, siue punicum.

Rhoea.

Malum granatum, punicum.

**O**Mne malum granatum astringentem qualitatem sortitur: nō tamen in omnibus ea exuperat. Nam inter ea quædam sunt acida: quædam plus dulcia quā astringentia. Pro ratione quarum qualitatum uincetium, suos usus præstant. Porrò acini astringentiores, & exiccantiores sunt succo. Sicuti & his putamina: quæ fidia dicuntur. Ad similem illis uim habent flores qui cyrtini dicuntur.

Rhus.

Sumach.

Rhus, Sumach.

**A**D desiccandum & astringendū coriarij hac planta fruticosa utuntur. Medicis in usu sunt fructus eius & succus, austeræ admodū qualitatis. Exiccat itaque in tertio ordine: refrigerat uerò in secundo.

Rhypos.  
Sordes.

Rhypos, Sordes.

\* **S**ordes quæ à gymnasiorum statuis æreis abraditur, digerendi emolliendiq; uim obtinet: quæ autem ab ijs qui in palestra exercentur, quantum accepit pulueris, tantum ab ea est diuersa: atque hanc sordem πᾶτον Græci nominant. Prior igitur, quæ ob contractā æruginem, acrior etiam existit, cruda phymata digerit. Secunda autem, optimum est phlegmones mamillarum remedium. Constat enim ex puluere percussiente, oleo emolliente, ac denique sudore & sordibus digerentibus.

Sagapenum.

Sagapenum.

**L**iquor est calidus et tenuium partium, sicuti & alij liquores. Sed abstersionem quādam obtinet, quæ oculorum cicatrices expurgat, extenuatque. Suffusionibus etiam & hebetudinibus oculorum, quæ à crassitie humorum proueniunt, non malum est medicamen. At planta ex qua prouenit, ferculæ as similis, imbecilla est & inutilis.

Sampsychon, Maiorana.



**T** Eruium partium & digerentis est facultatis. De Sampsycum.  
 siccatur enim & calfacit ordine tertio. Maiorana.

**\*C** Saprotēs ξύλων, Caries lignorum.  
 Aries eorum precipuè lignorum quæ partici- Caries ligno-  
 pia sunt astrictiōis & absterfionis, ut ulmus, expur- rum.  
 gat, impletq; ulcera humida.

Sarcocolla.

**M** Istam uim habet ex emplastica quadam substan- Sarcocolla.  
 tia, & paucula amara. Itaq; citra morsum desic-  
 cat, ac proinde glutinare ulcera ualet.

Satyrium, Triphyllon.

**H** Vmidum calidumq; est temperie, ob idq; dulce. Satyrium.  
 Recrementitiam tamen & flatuosam humiditatē Triphyllon.  
 possidet. Quocirca ad uenerem incitat.

Selinon, Apium.

**A** Deò calidum est, ut & urinam & menses cieat. Selinon.  
 Flatus quoq; digerit, & magis semen q̃ herba. Apium.  
 Oreoselini & hipposelini similis uis existit. Verū hip-  
 poselinum imbecillius est; oreoselinum ualentius.

Seris, Cichorion.

**H** Olus est subamarum, & magis quod agreste est. Seris.  
 Id nāq; est frigida & sicca temperatura, secun- Cichorion.  
 do excessu. Cæterum domestica magis q̃ agrestis re-  
 frigerat. Porro utraq; astringentis qualitatis est parti-  
 ceps, ut chondrilla, quæ est etiam sereos species.

Seriphum.

**A** Bsynthio est tum specie, tum gustu simile. Cæte Seriphum.  
 rum non æquè astringit. Sed calfacit ualentius,  
 nec non amaritudinem quandam saluginosam refert,  
 uentriculoq; est infestum: magisq; absynthio lumbrico-  
 enecat. Calfacit itaq; secundo ordine intenso. Sic-  
 cat autem in tertio.

Seseli.

**A** Deò excalfacit tum radix, tū fructus, ut moueat Seseli.  
 urinas. Est etiam tenuium partiū, ut & comitia-

LIII ij



## Sesamon.

Sesamon.

**V**iscosum & pingue quum sit, emplasticum etiam existit, emolliensq; ac modice calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsius herba decoctum, eiusdem sunt facultatis.

## Sesamoides magnum.

Sesamoides  
magnum.

**S**emen eius ut helleborus purgat, similiterq; abstergit, calfacit, & desiccatur.

## Sesamoides album.

Sesamoides  
paruum.

**H**uius semen nonnullam \* acrimoniam sortitur, uehementerq; est amarum. Excalfacit itaq; rum-  
pit, extergitq;.

## Sideritis.

Sideritis.

**N**on nihil abstergit, sed plurima pars eius est humida & mediocriter frigida, cum exigua astrictione, qua phlegmonem sedat & glutinat. Sideritis autem Achillea, dicta superas astrictione, sanguinis eruptioni, dysenteriae, & muliebri profluuium est aptissima.

## Sicyos, Cucumis.

Sicyos.

Cucumis.

**M**aturus tenuioris essentiae est: immaturus crassioris. Sed incidendi & abstergendi facultas eis inest. Quare & urinam mouet, & corpus splendidum reddunt. Sunt enim humidi frigidiq; quasi in secundo ordine. At arefacta tum radix tum semine, siccant primo, aut secundo incipiente, ordine, magisque abstergunt, quam ipsius melonis caro.

## Sicyos agrios, Cucumis agrestis.

Cucumis agre-  
stis.  
Elaterium.

**T**um ipse, tum eius succus quem elaterium uocant, aut ex folijs & radicibus pressus, utilis ad medicaciones existit. Elaterium itaq; menses ciet, foetumque perimit applicatum, ceu alia omnia amara et tenuium partium. Summe siquidem est amarum, calfacitq; in secundo ordine, ac proinde etiam digerit. Sic enim eo angina laborantes inungunt quidam cum melle aut oleo



ueteri. Bonū item est regio morbo affectis infusum cū lacte in nares. Similiter dolores capitis sanat. Radicis atq; foliorum succus similem sed imbecillio rem facultatem fortiū. Radix etiam abstergit, digerit, emollitq;. Cortex potentius desiccatur.

Silphium, Laserpitium.

**S**ilphij liquor calidissimus est. Necnō folia, caulis, & radix, strenuē etiam sunt calida, omnia tamē flatulentæ magis essentia sunt, ac proinde difficilia concoctu. Foris autē imposita corpori, efficaciora, liquor præcipuē admodum trahentem facultatem possidens. Attamen & excrescentias exerit, & quandam liquandi uim possidet.

Silphium.

Laserpitium.

Sision.

**C**alidus & subamarus existit: Vnde urinam mouet, concoquit, menses prouocat, omnesq; uiscerum obstructions referat.

Sision.

Sion.

**Q**uantum gustu \* aromaticum est, tātum etiam excoficientis facultatis est particeps. Quare & digerit, & urinam mouet, & calculos renū frangit, & menses euocat.

Sion.

Sisaron.

**S**isari radix cocta stomacho grata est, & urinā mouet, secundo ordine excofaciens, cum amaritudine & astrictione leuicula.

Sisaron.

Sisymbrium.

**T**enuium est partium, facultatisq; digerentis, calfacientis, & exiccantis in tertio ordine. Quidam semen cum uino exhibent singultientibus, torminaq; patientibus.

Sisymbrium.

Sisymbrium, quod Cardaminem uocant.

**S**i siccum sit, tertij est ordinis calfacientium & excofacientium; si humidum, uirideq;, secundi.

Cardamine.

Scandix.



Scandix.

**A** Greste est olus, subacre & amarū. Calfacit itaq; & siccat secundo ordine intenso: ualenter mouet urinam: uisceraq; liberat obstructionibus.

Scilla.

Scilla.

**A** Dmodum quidem incidit: calfacit autem secundo ordine. Porro præstat eam assam aut elixam sumere, q; sic eius uehementia exoluatur.

Scolymos.

Scolymos.

**R** Adix eius, si quis illam in uino coctam bibat, graueolentem urinā abundanter elicit, foetoriq; alarum medet. Succus enim eius est purgatorius. Calfacit porro secundo & completo ordine, aut tertio incipiente: siccat uerò secundo.

Scordion.

Scordion.

**N** Onnihil amarum obtinet, & acerbū, & acre: ipsiusq; acrimonia, alij acrimoniæ est persimilis. Expurgat igitur, excalfacitq; uiscera: menses urinamq; prouocat: Conuulsa, rupta, doloresq; laterū ab obstructione & frigore obortos, epotū sanat: illitum uiride, magna uulnera glutinat: purgat sordida: inspersumq; aridum contumacia ad cicatricem per ducit.

Scorodon.

Scorodon, Allium.

Allium.

**D** Esiccat & excalfacit excessu q̄rto. Porro ophioscorodō, allium agreste est, domestico ualētius.

Scorodoprasson.

Scorodoprasson.

**V** T gustu & odore, sic uiribus inter allium & porrum mediam naturam sortitur.

Scorpiodes.

Scorpiodes.

**E** Xcalfacit ordine tertio. Desiccat secundo.

Smylax.

Smilax, Cactus arbor.

**F** Acultatis est uenenosæ.

Smyrna.

Smyrna, Myrrha.

Myrrha.

**S** Ecundi est ordinis calfacientium & exiccantium. Vnde capitis uulnera glutinat. Inest illi amaritas non exigua, qua foetum & lumbricos enecat, eijcitq;.



Habet etiam & abstergerendi uim moderatam. Quare ocularibus miscet medicamentis: & ijs quæ ad ueterē rursim, atq; anhelationem administrantur.

**V** Smyrna Boice, Myrrha Beotia.  
Im habet calfaciendi, fundendi, emolliendi.  
Smyrnium.

Myrrha Beotia.

**E**X eodem genere cum apio est & petroselino: fueritq; apio quidem ualidius, imbecillius uerò petroselino. Itaq; & urinas & menses proritat, calidum siccumq; tertio ordine.

Smyrnium.

Sonchus.

**D**Um uiridis est, aquea terreaq; essentia constat, utraq; leuiter frigida: nam & astrictionis cuiusdam est particeps, & manifestè refrigerat, tum illitus, tum estus. At arefactus, terrestrior reddit, modicam asciscens caliditatem.

Sonchus.

**D** Sparganium.  
Esiccantis est facultatis.

Sparganium.

Spartum, Genista.

**S**Parti (quo & uites alligant) tum fructus, tum succus uirgarum, ualentem trahendi uim possidet.

Spartum.  
Genista.

Staphilinus, Pastinaca.

**S**Atiua imbecillior, agrestis ad omnia potētiore est, urinas mensesq; puocat, abstergitq; nonnihil, quā herba quidem tota, tum uel maximè semen & radix.

Staphilinus.  
Pastinaca.

Stachys.

**C**Vstu est acri & amaro, tertijq; calfacientium ordinis. Vnde menses rationabiliter prouocat. Facit tamen abortum, atq; secundas eiicit.

Stachys.

Stœbe.

**F**Ructus eius & folia astringunt citra mordacitatē: desiccantq; in tertio ferè incipiente ordine. Quare decoctum eorum iniicitur dysentericis, auribusq; pure fluentibus: quod etiam magna uulnera glutinat, præcipuè cum uino atro & austero. Valenter enim desic-

Stœbe.



cat omnes præter naturam humiditates. Folia uiridia illita erumpentem sanguinem supprimunt, suffusionibusq; oculorum exictu medentur.

Stœchas.

Stœchas.

**A**mmara est & mediocriter subastringens, quum nimirum ex terrena essentia frigida exigua: & extenuata altera terrena copiosa, p̄stet. Quare obstructione liberat, extenuat, extergit, roboratq; & uiscera & uniuersum corpus.

Stratiotes.

Stratiotes.

**A**quaticus quidem humida & frigida facultate est: terrestris uerò, nonnihil habet astrictionis. Proinde & ulcera glutinat.

Struthion.

Struthion.

**R**adix eius est acris, calida, siccaq; temperamēto, ex quarto p̄p̄modum ordine excalfaciētium. Sed & abstergit, & irritat, p̄inde & sternutationē p̄uocat.

Styrax.

Styrax.

**E**xcalfacit, emollit, concoquit. Quamobrem tusi, catarrho, pituitæ destillationibus, raucedinibusq; auxiliatur. Tum menses, seu potum, seu admotum p̄licit. Combusti eius fuligo, thuris fuligini est similis.

Syca, Ficus.

Syca.  
Ficus.

**A**ridæ excalfaciunt ordine primo, aut secundo incipiente: habentq; partium tenuitatem quandam: quare tubercula dura concoquunt, digeruntq; tum ipsæ, tum ipsarum decoctum. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi uerò plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio. Porro quæ sunt pinguiore, magis possunt concoquere: quæ acriore, magis tum extergere, tum digerere. Ficus uirides, imbecilliores sunt. Vtræq; tamen & sicca & humida aluum subducunt.

Syce, Ficus arbor.

Syce.  
Ficus arbor.

**C**alida, tenuiumq; partium temperaturæ est, sicuti



indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim calfacit uterq; Itaq; non mordicat tantū, aut uehementer absterget, sed & ulcerat, & ora uasorū reserat, & uerrucas extirpat. Quin & uim purgatoriā habet. Porro lachryma & succus agrestis ficus, quam caprificum uocant, ad omnia, q̄ satiuæ, ualentior est. Ceterū ipsarum surculi adeo calidi sunt, atq; tenuium partiū, ut carnes bubulas duras, si coquendis adijciantur, friabiles ac teneras reddant.

Caprificus.

Symphytum petræum.

**H**abet quandam uim incidendi, qua collectum in thorace pulmoneq; pus expurgare potest: ac simul cōtrahendi facultatis est particeps, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: estq; humidū, ac non immodicè calidum, unde & dulce apparet, atq; odoratu iucundum. Ad hæc, mansum sitim extinguit, & arterie sanat asperitates. Liquet igitur ipsum etiā & digerere, & constringere posse. Vnde & enterocœlijs imponitur, et ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur.

Symphytum petræum.

Symphyton magnum.

**S**imilem dicto uim habet. Cæterū neq; uidet dulce, neq; odoratum. Est uerò secundum uiscositatē mordacitatemq; scillæ simile

Symphytum magnum.

Spondylon.

**F**luctus eius acris & incidens est: itaq; ad asthma & comitiale morbum aptum est medicamen. Prodest & aurigini. At radix ultra iam dicta, fistularū callos tollit, si sit circūrasa. Floris succus, ad diuturniora aurium ulcera conueniens reponitur.

Spondylon.

Schinos, Lentiscus.

**E**x aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca, constat. Desiccatur itaq; secundo ordine completo, aut tertio incipiēte; in caloris frigorisq; medio consistens, quodāmodo. Astringit autem ex quo, moderateq; omnibus partibus suis. Succus bibitur &

Schinos.



per se, & cum alijs medicamentis, quæ dysenterias & alui affectus sanât. Quin & ad sanguinis expuitiones, flores miliebres, necnō sedis uuluxq; p̄cidentias idoneus est, utpote ad hypocistida nōnihil accedēs p̄pe.

Schinu anthos, Schini flos.

Schini flos.

**M**Odicè calfacit, modicèq; etiam astringit, nec plānè à tenuitatis natura est alienus. Quare urinam & menses mouet, siue potione, siue som̄to adhibitus. Prodest etiam iecoris, stomachi, & uentris inflammationibus. Cæterū magis astringit radix: quanq; flos etiam astringat omnibus partibus suis. Proinde medicamentis quæ hæmoptoicis exhibentur, miscetur.

Schœnos leia, Iuncus læuis.

Schœnos leia.  
Iuncus læuis.

**Q**uidam oxyſchœnos, alius oligoschœnus dicitur: gracilior duriorq; oxyſchœnos, crassior laxiorq; oligoschœnos. Fructus huius somnū conciliat. Oxyſchœni autē duæ sunt species: altera sterilis, cuius nullus usus in medicina: altera quæ fert semen somni cōciliatiuū, sed minus q̄ oligoschœni. Vtrūq; si cum uino bibatur, uentris fluxus desiccet, & muliebri profluum rubrum sistit. Est itaq; eorum temperies composita ex terrena essentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida.

Terminthos, Terebinthus.

Terminthos.  
Terebinthus.

**C**ortex, folia, & fructus eius astringunt, & secūdo ordine excalfaciunt: unde etiam q̄ siccant, liquet. Porro fructus aridus propinquus est tertio ordini desiccantium: calfacitq; ualenter. Quare & urinam prouocat, & lienibus auxiliatur.

Teutlon, Beta.

Teutlon.  
Beta.

**N**itrosæ facultatis est particeps, qua tum digerit, tum extergit, & per nares expurgat. Cæterū cocta nitrositatem exuit, euaditq; leniter digerens. Ad detergēdum tamen, digerendumq; ualidior est beta alba.

Teucrium.



**I**ncidit et tenuium est partiū: quare lienes sanat. Ac *Theucrlum.*  
 exiccat quidē in tertio, calfacit autē secūdo ordine.

*Thephra, Cinis.*

**E**X partibus cum terrenis, tum etiā fuliginosis (que *Tephra.*  
 & tenues sunt, & cum aqua in qua macerati prius *Cinis.*  
 fuerint cineres, excolantur) constat. Pro materiæ tamē  
 combustæ differentia, cineris temperies uariat. Quare  
 haud scio qua ratione Dioscorides astringere cineres  
 omnes prodiderit: quum ficulneus cinis eiusmodi om  
 nis qualitatē sit expers: nimirum ipsa arbore nulla par  
 te sui acerbam quā alitatē reddente. At ex acerbis lignis  
 confectus cinis, non parum quidē astringit: meminiq;  
 me eo aliquando sanguinis suppressisse eruptionē. Ve  
 rū nullus unq; ad tale uti ficulneo audeat. Siquidem  
 hic acrimonię plurimum, urentisq; facultatis obtinet,  
 mistæ abstersioni. Est & calx cineris quēdam species, *Calx.*  
 cæterū tenuioris essentiæ, q̄ qui ex lignis fit. Porro  
 elota, medicamen est citra morsum desiccās, magisq;  
 si bis ter ue lauetur. Cæterū si marina aqua abluta  
 sit, admodum digerit.

*Telephium.*

**E**xiccandi & detergendi facultate est, non tamen *Telephium.*  
 insigniter calida, sed forsan secundi ordinis. Desic  
 cat etiam secundo, intenso tamen, aut tertij principio.  
 Proinde ad putrida ulcera congruit, & cum aceto u  
 tranq; uiriliginem sanat.

*Telis, Fœnum Græcum.*

**C**alfacit secundo ordine, desiccāt primo. Proinde *Telis.*  
 feruentes phlegmonas irritat: quæ uerò minus *Fœnū Græcū.*  
 sunt calidę, & magis duræ, eas digerendo persanat.

*Tithymalli.*

**T**ithymalli omnes uincentem habent acrem, cali  
 damq; potentiam, cum amaritudine quadam. Va  
 lidissimus eorum est liquor: Dein fructus & folia. Po  
 stremò radix. Hęc aceto incocta, sanat erosorum den

*Tithymallus.*



tium dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Cæterū si aliam partem contingat, cōtinuò adurit, ulceratq; illam, ex quarto existens calfacientiū ordine, qui ad exurētia pertinet. Sic pilos quoq; & uerrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo inūctus succus euellit: detergitq; lichenas & psoras, propter amaritudinem: necnon ulcerum phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia ualēter calfacit & desiccāt, aliquādo iuuare poterit. Ad hæc, fistularū callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus p̄stare possunt, sed ibecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiēdos, uti assolēt. Celerrimè enī ab illis in uertiginē acti, ac semimortui redditī, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint tithymallorum genera, ualentissimus est quem characiam maremq; nominant: & fœmina nūcupata myrsinites: & qui in petris nascitur arborecens. Deinceps qui phlomo assimilis est: & cyparissias. Dein marinus: ac deniq; helioscopius. Proportione autem facultatis ipsorum, & cinis & lixiuium existet.

Pisces reddunt  
vertiginosi, capiunturq; facili  
te, felis, fructibusq; tithymalli gustatis.

#### Tragacantha.

Tragacantha.

**E**Mplasticam facultatem similem gummi obtinet, necnon obtusioiorem acredinem. Ac sanè similiter illi desiccāt.

#### Tragion.

Tragion.

**T**Ragion folia, fructus, lachrymaq; trahentis digerētisq; sunt facultatis. Est uerò & tenuium partiū, & facultate in principio tertij ordinis calida. Stipites, & infixa corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet, drachmę pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisco simile. Alterū minus, cuius folia scolopēdrio similia sunt, uisitur quidem multis in locis, sed non parum habet facultatis astringentis: ut & ad fluxionum affectus conueniat.

#### Tragoriganon.



**D**E hoc in sermone de organo diximus.

Tribolos,

Tragoriganū

**E**X humida essentia modicè frigida, & sicca nō me-  
diocriter, cæterū similiter frigida, cōstat. Vnde  
contra phlegmonarum generationes, & contra omnes  
influxus congruit. Porro terrestris ipsius fructus, quū  
tenuium sit partium, potus renū calculos conterit.

Tribolus.

Tripolion.

**R**Adix huius est acris, & facultate calida in ter-  
tio excessu.

Tripolium.

Triphyllum.

**C**alfacit & siccatur in tertio ordine, ut bitumen, cui  
odore est simile. Proinde potū laterū dolores ab  
obstructione natos iuuat; & urinam mēsesq; puocat.

Triphyllum.

Trichomanes.

**E**Adem præstat quæ adiantum.

Trichomanes.

Trychnon, Solanum, Strychnon

**E**Sculentum quidem astringit, refrigeratq; in secū-  
do ordine. At eorum quæ esui non sunt, unum qui-  
dem dicitur Alicacabum, fructum habens rubeū, aci-  
no uuxæ persimilem. Alterum uerò est fruticosum, à cō-  
ciliando somno Hypnoticum appellatum. At tertium  
q̄ ad insaniam adigat, omnes manicū nominant. Ali-  
cacabum igitur, fructum fert ciendæ urinæ idoneum,  
compluribusq; facultatibus quæ ad iecur, uesicam, &  
renes accōmodantur, miscetur. Solani uerò hypnotici  
cortex radices, si cum uino bibatur, somnum accersit,  
drachmæ pondere sumptus, existens succo papaueris  
similis, nisi q̄ imbecillior: utpote tertij refrigerantium  
ordinis: quū ille sit quarti. Huius solani semen urinam  
ciendi uim habet. Si plus tamen duodecim corymbis  
hauseris, demētiā asciscet. Quod reliquū est ex solanis  
propositis, est ad medicationes intra corpus, inutile.  
Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mortem in-  
ferēt: si pauciores, insaniam. Vna certè innoxie sumi-

Trychnon.

Solanum.

Strychnon.

Alicacabum.

Solanū Hyp-  
noticum.

Solanum ma-  
nicum.



tur: nihil tamen utile præstat. At foris corpori illitum, ulcera maligna per sanat. Verum ad talia, radicis cortex præfertur, desiccās secundo ordine iam completo, aut tertio incipiente; secundo autē incipiente refrigerās.

Hyacinthus.

Hyacinthus.

**R** Adix eius bulbosa est, desiccās primo ordine: secundo autem, aut initio tertij refrigerās. Fructus leuiter extergit, astringitq; unde & regio morbo laborantibus exhibetur in uino, ordine quidem tertio desiccans, at in medio caloris frigorisq; consistens.

Hydnon, Tuber terræ.

Hydnon.

Tuber terræ.

**S** Vbstantiam habet uincētem terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permistam.

Hydropeperi.

Hydropeperi.

**N** On usque adeò calidum est, ut piper. Viridis ipsa herba cataplasmatibus instar imposita, sugillata & tumores induratos digerit.

Hyoscyamus, Altercum.

Hyoscyamus.  
Altercum.

**C** Vi semen atrum est, insaniam ac soporē inducit: cui uerò mediocriter flauum, propinquam ei obtinet facultatem. Vtriq; tamen fugiendi sunt, ut deleterij & inutiles. At cui semē & flos est candidus, sanitati idoneus existit, ex tertio quodāmodo refrigeratiū ordine.

Hypericum.

Hypericum.

**C** Alfacit & siccat, essentia tenui, adeò ut mēses urinasq; puocet. Illitum uiride, ad cicatricē omnia perducit ulcera. Siccum contusumq; si inspergas, mollia, humida, & putrilaginosa sanabis. Sunt qui & ischiadicis bibendum propinent.

Hypecon.

Hypecon.

**R** Efrigerat tertio ordine, parūq; à papaue r distat:

Hypoglosson.

Hypoglosson.

**R** Adix eius & succus, emolliendi uim possident.

Hyssopum.

Hyssopum.

**D** Esiccat & excalfacit ordine tertio, sed tenuium est partium.



est partium.

Phaci, Lentesc.

**V** Alenter astringunt, mediumq; tenent inter calorem & frigiditatem. Desiccant tamen in secundo ordine. Ipsum itaq; earum corpus siccant & sistit alium. Ceterum decoctum puocat. Proinde prior aqua abijcitur, ubi retentionis causa exhibentur.

Phaci.

Lentes.

Phacos, Lenticula palustris.

**H** Vmidæ frigidæq; temperaturæ existit, utrinq; ex secundo ordine.

Lenticula palustris.

Phaleris.

**S** Vccus, semen, & folia eius, commodè potari creduntur contra vesicæ dolores, ceu in se habeat tenue quiddam & calidum.

Phaleris.

Phalangites.

**S** Ic dicitur, quod morsus à phalangibus auxilio sit. Est autem facultatis tenuium partium, & exiccatis, quare tormina lenit.

Phalangites.

Phlomis, Verbascum.

**H** Vius herbae duæ sunt species. Quædam enim foliis est candida; quædam uerò nigra. Rursus, albæ quidem mas est, cuius folia angustiora; foemina cuius maiora uisunt. Est & alia phlomis agrestis, flores habens aureos & luteos; necnò alia quam phlomida appellant. Priorum duarum radix acerba gustu est, et fluxionum affectibus prodest, atq; adeò dentium doloribus: quæ folia digerendi uim habent. Similiter & aliarum folia. Omnium quippè folia desiccandi & detergendi uim possident.

Phlomis.

Verbascum.

Phlomis.

Phoenix, Palma.

**A** Strictorie facultatis est particeps omnibus partibus suis. Igitur ramorum succus austerus est, ex aquea substantia tepida, & terrea frigida constans. Similis facultatis est eius cerebrum, esui aptum. At fructus, et maximè, dulcis, non paruum obtinet caliditatem.

Phoenix.

Palma.

Tomus IIII. Mmm



Qui quidem quum edendo sit, magno est usui, non tã-  
tũ foris impositus, ubi roborare, desiccare, contrahe-  
re, stipareq; est consilium, sed tanquã cibus sumptus,  
& simul cum alijs, & per se. Porro tenerum palmę ger-  
men, eãdem cum eius cerebro facultatem sortitur. At  
cortex, astringit quidem, ac plus q̃ dicta omnia desic-  
cat: \* utpote minimum habens humiditatis. Quare ad  
ulcera putrescentia, laxatos articulos, hepatis & uentri-  
culi imbecillitates eo itus & foris administrato utunt̃.  
Radix citra morsum desiccat, cũ nōnulla astrictione.

Phormion.

Phormion.

**P**Hormij semine cum melle ad leucomata \* utunt̃.  
Sed spicula etiam extrahere creditur: ueluti & ipsa  
herba. Quare tenuium partium, & attrahendi digeren-  
diq; potentiam obtinet.

Phu.

Phu.

**O**Dorata quodammodo eius est radix, nardo ui-  
ribus similis: ad pleraq; tamen infirmior. Mouet  
autem urinam, ut nardus Gallica.

Phycos, Alga.

Phycos.

Alga.

**E**X mari exēptus & uirens, siccatur refrigeratq; in se-  
cũdo ordine: habet enim quiddã modicẽ acerbũ.

Phyllitis.

Phyllitis.

**A**Cerba quum sit, meritò & diarrhœas & dysen-  
terias epota iuuat.

Folium mala-  
bathri.

Phyllon malabathru, Folium malabathri.

**N**Ardo similem possidet facultatem.

Chalbane, Galbanum.

Chalbane.  
Galbanum.

**S**Vccus est plantæ ferulaceæ, molliendi & digeren-  
di ui: Calfacit enim ordine tertio incipiente, aut cõ-  
pleto secundo. Siccatur uerò secundo incipiente.

Chamædris.

Chamædris.

**V**Incentem habet qualitatem amaram. Est & quo-  
dammodo acris. Quare meritò lienes colliquat;  
urinas & menses prouocat: crassitudinẽ humorũ inci-



dit, uiscerumq; obstructiones repurgat. Calfacit itaq;  
& desiccatur tertio ordine; plus tamē calfacit q̄ siccat.

Chamæcissos.

**F** Los eius admodum amarus quā sit, iecur obstru- Chamæcissos.  
ctum aperit, daturq; & coxendice laborantibus.

Chamælea.

**V** Incentem habet qualitatem amaram. Quare ad- Chamælea.  
modum sordida ulcera, & quæ maximis inducta  
sunt crustis, purgare cum melle est potens.

Chamæleuce.

**C** Alfacit quodāmodo tertio ordine. Siccat primo. Chamæleuce.

Chamæleon.

**N** Igrī quidem radix, letale quiddam obtinet. Qua Chamæleon.  
re foris usus eius ad ea quæ absterisionem postu-  
lant, administratur. Præterea digerentibus & emolliē-  
tibus pharmacis commiscetur. Etenim siccat tertio or-  
dine. calfacit autem secundo absoluto. At albī radix q̄  
non sit perinde acris, potui datur cū uino austero, mē-  
sura oxybaphi, laborantibus aqua inter cutem.

Chamæpitys.

**M** Agis amara est quā acris. Quare abstergit, pur- Chamæpitys.  
gatq; uiscera, magis quā calfacit. Proinde auri-  
ginosis, & quibus facile iecur obstruitur, bonum reme-  
dium est. Quin & urinam, & menses ducit tum pota-  
tum illita cum melle. Viridis uulnera magna glutinat,  
ulcera putrescētia sanat: durities uberum discutit. Est  
enim in siccando tertij ordinis: in calfaciendo, secūdi.

Chamæsyce.

**A** Bstergendi simul & acrē uim possidet. Itaq; acro Chamæsyce.  
chordonas & myrmecias caules eius teneriores  
intriti, quiq; ex eis profluit liquor, auferūt. Cum melle  
crassas oculorum cicatrices detergunt: hebetudinem  
uisus à crassitie ortam, adiuuant: sicuti & suffusio-  
num principia.

Chelidonium.

Mmm ij



Chelidonium.

**A**dmodū extergit & calfacit. Succus eius ad acuē dum uisum est commodus. Quidam radicē eius ad auriginem ab obstructione iecoris ortā in uino albo cum aniso propinant. Mansa etiam confert dentium doloribus. Chelidoniū minus, quā maiori sit acrius, celeriter cutem exulcerat, unguesq; scabros eijcit. Succus eius p̄ nares purgat. Hæc itaq; siccatur & calfacit in quarto incipiente ordine. At chelidoniū maius in tertio.

Chondrila.

Chondrila.

**E**iusdem ferē est facultatis cum seri; nisi q̄ amariuscula est, ac proinde siccantior.

Chondrus.

Chondrus.

**N**utritum quidem est optimum, sicut triticū. Ut medicamen autem emplasticæ est facultatis, temperie tritico similis, nisi q̄ uiscosior existit, qua ratione plus illo nutrit. Est porro hoc semen ueluti materia quædam idonea excipiendis medicamentis siccantibus. Ipsum uerò ex numero concoquentiū existit, ut triticum, quæ minimè profecto desiccant.

Chrysocome.

Chrysocome.

**R**adix uincentes habet acrem & astringentē qualitates. Quare nō admodū multiusus est. Quāq; cocta in melicrato peripneumonij & morbis hepaticis auxiliatur. Sed & menstruis purgandis est utilis.

Pseudodictamnium.

Pseudodictamnium.

**V**im dictamni sed imbecillam sortitur.

Psyllium.

Psyllium.

**S**emen habet admodum utile ex secundo refrigeratium ordine. In desiccando uerò & humectando, quodammodo est symmetrum.

Ocimum.

Ocimum.

**E**x secundo est ordine calfacientium. Habet autem recrementitiam humiditatem: proinde nec commodum est, ut in corpus sumatur. At foris illitum, concoquit, digeritq;.



Ocimoides.

**S** Emen tenuium est partium, & citra morsum, fa. Ocimoides.  
cultatis desiccatoriæ.

## GALENI PERGA

MENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM.

Facultatibus. Lib. IX.



**Q**UOT plantarum sunt partes, fruct<sup>9</sup>, succi, & liquores, supra dicta sunt omnia. Nunc autem de reliquis medicamentis, quæ ex metallorū sunt genere, quæq; species ipsius terre existunt, differere propositū est. Post quæ deinceps nonnihil tractabitur, de partibus animalium, quibus ceu medicamentis ad curationes utimur. Meminisse autē in uniuersum oportet, astringentibus medicamentis facultatē inesse cum acribus pugnātiſsimā. Astringentia siquidē contrahunt, constipantq; & condensant substantiā nostram: ac proinde in quāuis corporis nostri partem extrinsecus imposita, continuo illam & rugosam, & contractā efficiunt: contra quæ acria, quæ admota cuti, perspicuè eam excalfaciunt, atq; in molem attollunt, rubente colore: ac si diutius immorentur, exulcerant. Hæc itaq; euidenter apparent incidere, excalfacere, à uicinisq; partibus ad sese sanguinē trahere. At astringentia, refrigerādo, contrahendo, cōstringendoq; in illis etiam cōtentum repellere. Porro combustorum nonnulla calidiora quæ antea redduntur, & ad gustum, & ad tactum, & ad eam quæ in usu cer nitur, facultatem. Quædam contra, ab uſtione minus apparet calida, id quod tactu & usu manifestè discer-

Astringentium facultas.

Acrium facultas.

Uſtorum differentia.

M m m m i ij



Combustorū  
nullum est fri-  
gidum.

nitur. Igitur acria multum caloris amittunt usta: quæ uerò non sunt eiusmodi, assumunt. Cæterum combustorum, nullum planè est frigidū. Relinquitur enim in illis ueluti acrimonia ignis, quæ per ablutiones extergitur: ita ut aqua in qua medicamentum ablutum fuerit, calidam facultatem comparet, eamq; tenuium parium: quod reliquum uerò est, sit terreum simul & frigidum, ac deficcare citra molestiam possit.

De differentijs terræ.

Terræ differē-  
tiæ.

**T**erra communiter ac secundum agricolas dicitur illa quæ agriculturæ est aptissima: quæq; humore macerata lutum efficitur. Atq; in ea sanè plures differentias constituunt: aliam exempli gratia pinguem esse dicentes, ex qua lutum fit uiscosum & lentum. Aliā contrario modo dispositam, hoc est quæ lutum efficiat friabile. Atq; hoc unum uocabulū terræ est omnibus usitatum. Alterum est solis Philosophis usurpatū, quū aiunt elementa corporum esse terram, aquam, aerem, & ignem. Corpus nāq; extremè siccum, & frigidum, terram nuncupant. Secundum quos nullum compositorum corporum terra censetur elementaris. Aiunt tamen quanto corpore fuerint duriore, tãto magis ea esse terrea: contra q̃ agricolæ, qui eam exactissimā esse terram contendunt, quæ q̃ longissimè à saxi consistētia recesit. Pro hoc itaq; secundo significato, quod à Philosophis celebrat, tribus claudunt generibus differentię ipsius terræ. Quorum unū genus est lapis: alterum corpus metallicum: tertium terra quæ colitur.

Elementa cor-  
porum.

De differentijs nominatæ passim terræ.

Terræ passim  
vocatæ differē-  
entiæ com-  
plures.

**T**erra itaq; uel Latinis etiā dicitur usitatè, quæ in- iecta aqua soluitur, & fit lutum. Quæ sanè quasdā differentias sortitur: secundum propriam quidē rationem: ut uidelicet pinguis si sit & uiscosa, quæ utiq; omnino & atra colore est: aut contra, friabilis, & pinguitudinis expers, quam argillam appellant, quæ quo-



dammodo candidior existit: aut si inter has maximè cō-  
trarias habeatur. Secūdum misturam autem alienorū  
corporum, ut dum dicimus lapidosam aut arenosam  
hanc esse terram. Porrò talis substantia admista, segre  
gatur larga aque affusione, maceratione q̄; donec uni-  
uersum perfluat. Sic enim q̄d lapidosum & arenosum  
est, subsidit, & terra exacta supernatat: in quem modū  
præparatur etiam & terra Lemnia, quam alij sphragi-  
da lemniam (ob impressum illi sigillum Dianæ sacrū)  
cognominant. Quæ quidem à Lemnia rubrica differt,  
q̄ contactu non contaminet, perinde ut illa: q̄ q̄; secū-  
dum collem in Lemno qui totus colore est fuluus, et in  
quo nec arbor, nec saxum, nec plāta nascitur, tantū  
huiusmodi terra uisitur. Cæterū eius tres differentiæ  
assignantur. Vna quam Lemniam sphragidem di-  
ximus: quam q̄; alij nemini, præter q̄ uni sacerdotissæ,  
contingere fas est: altera uerò eius, quæ milto est, siue  
rubrica: ac deniq; tertia, quæ detergendi uim habet.  
Utuntur autē priore illa, ad uulnera uetera & cōtuma-  
cia, ad omnes q̄; ferarum morsus, sicuti aduersus medi-  
camenta letalia. Distinguere itaq; ab ea terra quæ co-  
litur, medicamentosam oportet, qua ad curationes uti-  
mur. Tāetsi eius quoq; quæ colitur, si qua pinguis est,  
utilis ad curationes existit earum omnium partiū, quæ  
desiccari postulant. Desiccandi nāq; uim terra quæuis  
possidet. Quum enim eius corpus natura sit siccū, om-  
nino q̄; igneæ substātiæ expers, citra mordacitatē exic-  
cat. Ad quod quidem etiam ablutio iuuat.

## De terræ lotionē.

**A** Clauatur sanè terra omnis, ut lemnia. Primò si-  
quidem maceratur aqua, quæ nullā habet medi-  
camentosæ qualitatis suspicionem. Dein effunditur q̄d  
innatat, colligitur q̄; id quod est à lapidosis & arenosis  
secretum. Gustus autem docet, quæ nam terra lotionē  
indigeat: aut quæ minimè. At Lemnia, quum sit à sa-

Terræ purgan-  
di ratio.Lemniam sphra-  
gis.  
Lemniam ru-  
brica.Lemniam tres  
differentiæ.Terra quæuis  
desiccandi vim  
possidet.Terram abluē-  
di ratio.

M m m m i i j



certote abluta, rursus elui non exigit.

De terra Samia.

Samia terra.  
Samius aster.

Selinusia terra  
Chia terra.  
Abstergentia  
leuiter, produ-  
cendæ esse car-  
ni idonea.

**A**T Samiam ne lauari quidem est opus. Vimur autem altera eius specie magis, quā Samiū aste-  
ra cognomināt, ad sanguinis expuitiones, muliebriaq;  
profluuia, ueluti & Lemnio sigillo, necnō aduersus ul-  
cera dysenterica, prius q̄ putrescentia euadant. Quāq̄  
etiam & putrescentibus, quæ depascentia uocant, in-  
terdum Lemnia ipsa profuit: iniecta quidem per arnā  
glōssæ succum: bibita uerō ex oxycrato aquoso: prius  
tamen ablutis ulceribus: idq; primō quidem, melicra-  
to: dein autē, muria. Cæterū Lemnia terra q̄ Samia  
non parum efficacioribus esse uidetur uiribus. Quare  
ab ea, quæ phlegmone tentari cœperūt partes, exaspe-  
rantur: quum tamen à Samia iuuētur. Ex qua & oleo  
rosaceo mitissimum conficitur pharmacum, etiam cō-  
tra alias feruentes phlegmonas, incipiētesq; bubonas  
& fluxiones podagricas, & ad ea breuiter, quæ refri-  
gerare cum mitigatione est animus. Vnde constat Sa-  
miā refrigerare. Quin & magis aerea eius essentia exi-  
stet, collata ad lemniam: cuius argumento est leuitas.  
Æstimabis porrō omnem terram medicaminosam.  
tum leuitate, tum grauitate, præterea circa gustus aspe-  
ritate & lenitate: ad hæc tenacitate & abstergendi po-  
tētia. Tenax enim & uiscosus est Samius aster, quum  
& Lemnia sphragis eiusmodi paululum quiddam ha-  
beat. Abstersoriam quoq; facultatē moderatam obti-  
nent & Selinusia terra, & Chia: quamobrem mulieres  
quædam ijs ad faciem utuntur. Porrō quicquid abster-  
git leuiter, producendæ ulcerum carni est idoneum.  
Quod si etiam siccet, cicatrici inducēdæ est habile. At  
omnium aptissima sunt & ad ulcera quæ in summa cu-  
ræ cōsistūt, & ad ambusta, illa quæ citra morsum exic-  
cant, nec manifestō excalfaciunt, nec refrigerant. Quō  
circa terra Selinusia et Chia, pulcherrima sunt ad am-



busta ulcerum remedia. Iam uero Cimolia terra, quā  
 mistæ sit facultatis, partim sanè refrigerat, partim leui-  
 ter digerit, operaturq; pro natura illorū quibus misce-  
 rur. Verū unicè ambustis conuenit: ueluti & alię om-  
 nes, illitę ex aceto, aut oxycrato: nimirum bullas existe-  
 re prohibentes. Aduertendum tamen est, corpora mol-  
 lia, ualentem medicaminum uim haud posse perferre:  
 dura uerò posse. Terra itaq; mistionis experts, uim ha-  
 bet citra morsum siccandi. Quum autem nullum repe-  
 rire sit corpus à mistione alienū, inspiciūdum est, qua-  
 lem nam miscellam ipsa terra sortiatur. Si qua ergo in  
 ea astrictio sentiatur, tantū frigiditatis assumpsit, quan-  
 tum habet astrictionis. Sin acrimonia, tātum scito illi  
 inesse caliditatis, quantū & acrimoniæ. Similiter, quā-  
 to leuior terra ipsa fuerit, tantō acrior existit. Quanto  
 grauior, tanto etiam syncerior terra. At proprium ter-  
 ræ est, q̄ igni admota non soluitur, aut liquefcit: id q̄d  
 accidit plumbo, stanno, auro, & argēto. Quum igitur  
 audis nominare terram argenteam, aut auream, mini-  
 mē intelligas ipsum argentum, aut aurum, per totū ter-  
 ræ corpus misceri: sed particulas quasdam exiguas tū  
 auri, tum argenti, illi coniunctas, atq; contiguas existe-  
 re: easq; ab igne in fornacibus fusas coire inuicē. Eun-  
 dem in modum quæ uitrum cōtinet terra, arenosa est.  
 Sed & auri quoq; glebulę exiguę frequēter nō paruō  
 numero in quibusdam repēriuntur arenis. Terrarum  
 autē id genus omnium quæ in metallis sunt, ubi ab eis  
 separatur id metalli aut gr̄is quod cōtinent, reliquiæ ui-  
 dentur lapideæ, nec macerari, rigari uē, aut humectari  
 per totam substantiam possunt: ut medicaminosa illa,  
 quæ cum aqua in lutum degenerat: quæq; uiti circūli-  
 ta nascentes in ea uermes interimit, unde ampelites uo-  
 catur. Cadmia etenim ex illarum lapidearum est gene-  
 re: neq; rigari potest. Terra Cretica admodum imbe-  
 cilla est, multum habens, substantiæ aeris. Inest tamē

Cimolia terra.

Ambustis quæ  
conferant.Corpus nullū  
dari a mistio-  
ne alienum.Terra igni ad-  
mota non sol-  
uitur.Vitrum conti-  
nens terra.Aurum repe-  
ri in arenis.Ampelites ter-  
ra.

Cadmia.

Cretica terra.



Eretrienſis ter-  
ra.

ei quædam citra morſum eius extergendi. Eretrienſis, q̃ Lemnia, ualentiorẽ poſſidet aſtrictionem: hæte- nus tamen ut nondũ mordicet. Expedit uerò hanc ter- ram bis terq̃; lauare, ut Cimoliã, quo moderatior red- datur. Eam etiam urunt, ut ſubtiliorẽ, acriorem, & ma- gis digerentem efficiant. Quòd ſi poſtea q̃; combuſta fuerit, abluatur, replendis & cicatrice inducendis ul- ceribus multò magis opitulatur. Cæterũ quæ colo- re cinericio eſt, illi quæ alba exiſtit, præferẽ. Eſt & alia

Pignites.

Boli Armeni  
deſcriptio.

terra dicta Pignites, tota quidẽ facultate terrę Cimoligæ aſſimilis, cæterũ atra colore, quẽadmodũ Ampelites. At terra, ſiue lapis, ſiue bolus Armenus, colore eſt pal- lido, promptiſſimẽq̃; ſoluitur in læuorẽ omnino equa- lem, ut calx, ualidamq̃; deſiccandi uim poſſidet. Siqui- dem ad dyſenterias, uētris profluvia, ſanguinis expui- tiones, catarrhos, et putreſcentia oris ulcera, in primis competit. Quin & illos magnificẽ iuuat, quibus ex ca- pite in thoracem fluxio decumbit. Quare & n̄s quibus ex tali occaſione, anhelitus difficilis eſt, ualde auxiliãt. Sed & eos, qui tabe laborant, adiuuat; ulcus enim ipſo- rum deſiccat. Maximẽ etiam confert Armenus bolus contra peſtilentes affectus. Ii ſiquidem uſu eius non perſanantur, qui prorsus immedicabiles ſunt. Cæterũ bibitur ex uino albo, cõſiſtẽtia tenui, modicẽ diluto, ſi is qui morbo eſt correptus, aut planẽ febri careat, aut leuiter ea teneatur. Sin grauius febriat, admodum aqueo. Non ſunt tamen calore uehementes febres peſtilentiales.

Febres peſtilẽ-  
tes nõ eſſe ue-  
hementer cali-  
das.

#### De lapidibus.

**E**X corporibus ſponte natis ſunt lapides, hoc diuer- ſiã uulgo nuncupata terra, q̃ rigari nõ ſuſtinent. Vires habent partim ſecundum totius ſubſtantiaẽ p- prietatem: partim ſecũdũ qualitates effectrices. Nunc autem ſermo nobis eſto de illis uiribus, quæ ſecũdum effectrices agunt qualitates: in quibus ſanẽ eſt & utẽ.



di ratio & methodus. Nam facultates quę proprietatis totius substantię ratione insunt, à methodo sunt atq; ratione alienę, & per solam experientiam noscuntur. Nam cur hic lapis tacto uulnere unde sanguis prorumpit, cursum eius reperimat, haud nouimus. At cur hæmatites lapis in oculares facultates indatur, nouimus: qđ sit rationis inuentum. Nam si in cote oculari cum aqua cum teras, donec accipiat crassitudinem mellis, astringentem facultatem percipies. At didicisti qđ gliscentes etiãnum phlegmonas restringentibus medicamentis repercutere oporteat: ubi autem iam sanguis non fluit, astringentibus medicamentis digerentia adiungere, & sensim ad ipsa sola transire. Itaq; de ijs lapidibus prius differam, qui mortarij aut cotis attritu, in liquorem soluuntur.

Ciferis, Pumex.

**P**umex quidem abstergit. Sed Smiris acrimonię quiddam obtinet. Proinde causticis & desiccantibus facultatibus additur, eisq; quę curant gingiuas laxas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior Smire, eosdem ad usus.

Lapides qui in spongijs reperiuntur.

**F**Rangendi uim obtinent, non tamē ita ualidam, ut lapides in uesica comminuāt. Rumpunt eos tamē qui coguntur in renibus: ueluti qui aduehuntur ex Cappadocia.

Ostracites.

**H**Vnc lapidem aiunt desiccandi ualenter facultatē habere, temperatam ex astrictione, acrimoniãq;: ut Geodem expurgare pupillas, uberumq; & testium sanare phlegmonas, inunctum ex aqua. At Cotis Naxiæ ramentum uirginibus māmās prohibet tumescere: sicuti & testes puerorum: tanquam facultatis refrigeratorię sit particeps.

Ophites.

Facultates quę proprietatis ratione insunt, eē a methodo alienas.

Hæmatites lapis comminatus ocularibus medicamentis miscetur.

Phlegmonarū generalis curatio.

Ciferis.

Pumex.

Smiris.

Spongiarum lapides.

Ostracites.

Geodes.

Cotis Naxiæ ramentum.



Ophites.

198

G A L. P E R. D E

**E**Xtergendi confringēdiq; uim possidet, ceu etiam uitrum. Admodū enim ipsum ex uino albo ac tenui epotum lapides uesicæ conterit, atq; confringit.

Iaspis uiridis.

Iaspis uiridis.

**V**Entriculum adhæsu, ipsiusq; os adiuuat. Porro Ophitem lapidem suspensum, iuuare morfos à uipera tradit. Sed eiusmodi facultates non constant methodo. Veluti etiam quum Hieracites & Indicus profluentem ex hæmorrhoidibus sanguinem sistunt.

Hieracites.

Indus lapis.

Sapphyrus.

Sapphyrus.

**I**Ctos à Scorpione iuuare creditur.

Aphroselinus.

Aphroselinus.

**L**iberat comitiali morbo uexatos: id quod nōdum sumus experti.

Thyites.

Dioscoridis Thyites.

**S**vbuiridis est ut Iaspis, soluiturq; in succum colore quidem lacteum, gustu uerò acrem: ac proinde nemo illum oculorū miscet medicamentis, nec fluxiones reperiētibus, nec ulcera sanantibus. Sed eo tantum utuntur ad purgandum & abstergēdum quæ pupillam absq; phlegmone offuscant: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

Iudaicus.

Iudaicus lapis

**C**olore est candido, specie concinna, lineas habēs ceu torno ductas. Utuntē ad uesicæ lapides in cocte soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Præcipuè uerò ad eos qui in renibus hærent, est efficax.

Pyrites.

Pyrites.

**V**alidam possidet facultatem, eoq; utimur digerenti emplastro admisto. Adijcitur etiam ei & schistos. Ab hoc medicamine & pus sæpenumero, & consistentia grumosa in spatijs intermedijs musculorum nata, per halitum sunt degesta. Nisi autē dum in usum ueniunt, pollinis instar comminuantur hi omnes lapi-



des, ut profundū corporū quibus applicantur subeāt, assimiles manent istis marinis fluuiatilibus q̄; arenis: quæ & ipsæ cōmunem omnium lapidum uim possident. Siquidem exiccant tumentem ab aqua inter curam carnem, si in ipsis excalfactis decumbat eger. Nō ramen ad aliud quippiam eis utimur.

Phrygius.

**H**oc semper utor combusto quidem ad ulcera putrida: id q̄; ipso aut p se, aut ex aceto, aut œnomete, aut oxycrato. Ad oculos uerò ex eo permisto alijs, medicamen siccū efficio. Validè enim desiccāt, habēs quiddam astrictionis simul & mordicationis.

Ageratus.

**A** Stringit simul & digerit. Atq; astrictione quidē euidēter iuuat phlegmone columellas grauatas.

Assius.

**C** Olore & consistentia est topho similis, friabilis, laxisq̄; Innascitur ei quiddam instar farinæ tenuissimæ, qualis in molarum parietibus adherescit. Appellant hoc medicamen petræ Assiæ florem. Est uerò & tenuiū partium, ut sine morfu nimis fluidas carnes eliquet. At petra ipsa in qua nascitur, actionis uehementia est inferior. Habet etiam & salsedinem quādam ipse Assiæ petræ flos, ita ut inde uideatur ducere originem, quòd ros ex mari in petram residens, à sole postea exiccetur.

Gagates.

**C** Olore est atro, qui ubi igni fuerit admotus, persimilem bitumini odorem exhibet. Confert autem ad discutiendos flatulentos tumores consistentes in genu, diuturnosq̄; & ægrè curabiles: ac præterea cruenta uulnera glutinat. Est et lapis Thracius, cuius in hūc modum Nicander meminit.

Si lapis uratur candenti Thracius igne, &  
Post madefiat aqua, flagrabit totus: ac idem

Arena quomodo, exiccet tumētē ab aqua inter cutē, carnem.

Phrygius lapis.

Ageratus.

Assius lapis.

Petræ Assiæ flos

Gagates.

Thracius lapis.  
Nicander.



Mox oleo affuso penitus restinguitur, Et c.  
Nullus tamen eius in medicina usus, nisi quod suffitu  
abigit feras.

Magnitis.  
Magnes.

**A** Magnitis, Heraclia, Magnes.  
Ssimilem hæmatiti uim obtinet.

Arabius lapis.

Arabius.

**L** Apis est elephanto similis, desiccantis abstergen-  
tisq; potentia.

Alabastrites.

Alabastrites.

**C** Ombustus in medicinæ usum ingreditur. Quidā  
eum bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Smiris.

**V** Ehementer quidē abstergit. Quare ipso ad annu-  
los exculpandos utunt, & ad dentes purificādos.

Hæmatites, Galactites, & Melitites.

Hæmatites.  
Galactites.  
Melitites.

Dulcis succus  
omnis a tēpe-  
rato calore p-  
ficiscit, ut astringens  
a frigore

**H** æmatites & Galactites lapides, à colorum simi-  
litudine, quos repræsentant, sic nominantur. Ille  
siquidem sanguinis, hic in succum solutus, lacti uidet  
similis. At Melitites, non à colore, sed à sapore mellis  
talem nomenclaturam sortit. Quum igitur succus om-  
nis dulcis à temperato calore proficiscatur, astringens  
uerò à frigore, habebit sanè hæmatites lapis tantū fri-  
giditatis, quantum et astrictionis: Melitites uerò tem-  
peratam caliditatem: at mediam utriusq; temperiem.  
Galactites. Meritò itaq; ocularibus medicamentis la-  
pis hæmatites miscet. Ac solo eo uti possis supercilijs  
exasperatis, si quidē cum phlegmone sint aspera red-  
dita, ex ovo ipsum diluens: ac si magis, etiam per deco-  
ctum scænigræci. Sin uerò citra phlegmonem, ex aqua.  
Hic idem lapis similiter in cote cōtrit, sanguinis ex-  
puitioni cōducit, ulceribusq; uniuersis. Porro fccus,  
reductusq; in tenuissimum pollinē, reprimit excrescē-  
tia: ipsaq; oculorum ulcera solus per se cicatrice inclu-  
dit attritus, cæterū aut affusus, aut inunctus.

Schistos.



**H**æmatiti perſimilem uim obtinet, ſed infirmiorē Schiſtos: ac poſt eū Galactites. At Melitites nō nihil caliditatis aſciuit. Vt igitur unusquiſq; leuiter ac ſenſim ab hæmatitis facultate recedit, ita in uſum oculorum accōmodatur. Eſt tamē mitior. Etenim mitiora remedia partibus etiānum phlegmōe afflictiſ ſemper graviora ſunt. Quæ quidem, liberis iam à phlegmone partibus, infirmiora ſunt, q̃ ut perſanare ualeant. Porro quum lapidibus omnibus cōmune ſit, ut deficcant, quotquot ex ijs in ſuccum ſoluti, aut redacti in poſſinē, nullam continuò qualitātē in gūſtu obtinent, hos putandum eſſe eſſe tum infirmiſſimos, tum mitiſſimos, tum minimē mordaces. At qui manifeſtam qualitātē exprimūt, n̄ pro qualitatis rōne potentiā poſſident. Ac ſi q̃dem aſtringtā, ad cōprimēdū, cōſtringēdū, ſpiſſandū, & contrahendū: ſi uerò mordicēt, ad excalfaciēdū, digerendum, et colliquandum. Medij eorum ſunt, qui abſtergēt citra mordicationē. Igitur Hæmatites, Schiſtos, Galactites, & Melitites, in ſuccū uertunt. Quāq; ſunt & alij in ſuccū ſolubiles, ut Moroxus qui in Ægypto naſcitur, omnium dictōrū minimē qualitatis particeps. Quare tantū deficcandi uim poſſidet.

Metallica medicamenta.

**M**etallica medicamēta appellare medicis mos eſt, quorum generatio in metallis conſiſtit, ſiue ſpontanea, ſiue per fornacem facta. Vt igitur lapidibus uniuerſis, & terræ medicaminofæ cōmune eſt ut ſiccant, ita metallicis quoq; medicamentis omnibus. Eſt enim eſſentia eorum terrea, ſecundum elementaris terræ ſignificatum. Porro caliditate diutina, miſtam ex terra & aqua, nonnunq; etiam aere, ſubſtantiam uniēte, tēperanteq; ac poſtea deficcante, metallicorum medicamentorum conſiſtentiæ proueniunt. Quemadmodum igitur in differētijs terræ plurima eſſentia terræ elementaris habetur, paulum uerò aeris, ita in metallicis mul

Schiſtos.  
Galactites.  
Melitites.

Lapides oī  
communitē  
ſiccant.

Moroxus.

Metallica quę  
dicantur.

Metallica om  
nia ſiccare.



Metallicis plu-  
rimū igneꝝ sub-  
stantiæ esse im-  
mistum,

tum igneæ substantiæ est immistum. In medio autem eorum sunt lapides. Proinde alia metallicorum semel aut bis, alia frequentius lota, idonea sunt, ut citra morsum exiccent. At locorum, in quibus hæc proueniunt, natura, pro ut plus, minusq; est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelatq;.

Hales, Sales.

Hales,  
Sales.

**S** Al partim ex mari fit in salinis; partim è terra effoditur. Ceterū utriq; uis est assimilis, ipse uelut exiccatrix. Porro aphronitri sapor amarus est, & abstergens; salis uerò, tanto in abstergendo inferior, quāto in astrictione superior. In utriusq; medio sapor nitri consistit.

Armeniacum.

Armeniacum,

**V** Im habet extergentem cum leuicula tum acrimonia, tum astrictione. Vnde meritò miscetur ocularibus facultatibus. Præterea ipso per se redactio in pollinem, atq; sicco, utuntur ad pilorum in supercilijs incrementum; ubi præ humorū acrimonia partim excidunt, partim nec crescunt, nec nutricantur.

Arrhenicum, Auripigmentum.

Arrhenicum,  
Auripigmētū,

**F** Acultatis est causticæ, tam combustum, q̄ ustionis expers. Ceterū per ustionem tenuiorum partium efficitur. Utuntur porro ipso ad denudandam pilis quāuis particulam. Verūm si diutius hæreat, necuti quidem parcit.

Aphronitrum.

Aphronitrum,

**A** Phronitum ab aphonitro differt. Nitri enim spuma medicamentum exiccatoriū existit, aspectu triticeæ farinæ similis. Etenim alba est, non ut Asie petra flos cinericea. Aphonitrum uerò farinæ speciē nō habet, neq; solutū est, sed concretum & congelatum. Quod quidē adeò extergit, ut nō modò sordes expurgat, sed etiam pruritus sanat. At spuma nitri, eiusdem cum nitro est tum naturæ, tum facultatis; licet essentie

tenuioris



tenuioris. Dictum autē est paulō ante in medio aphronitri et salis, facultatē nitri cōsistere. Aphronitro enim sola inest uis detergendi: sali uerò etiam astringendi, sed multò magis, q̄ detergendi.

## Gypsum.

**G**ypsum quidē tum desiccāt, tum uires habet em-  
plasticas. Quare siccis medicamētis quæ ad san-  
guinis eruptiones accōmodantur, utiliter commiscet̃.  
Nam ipsum per sese lapidosum sit, coactum & conge-  
latum. Ac proinde diluendum est oui tenui & candida  
albugine, q̄ & ad ophthalmias est utilis, admisto illi te-  
nuissimo farinæ triticeæ pollione, qui residet in mola-  
rum parietibus. Excipere uerò quod sic maceratū est,  
tenellis leporis pilis, aut q̄ pinde sint molles, expedit.

## Gypsum ustum.

**N**on habet æquē emplasticā uim, ceterū tenuio-  
rum est partium, & ualentius desiccāt. Quin &  
repercussorium est, maximè si maceretur oxycrato.

## Diphryges.

**M**istam habet tum qualitātē, tum facultatē. Habet  
enim in sese qddā & mediocriter astringēs, & medio-  
criter acre: unde ulcerū rebellū optimū medicamēt est.  
Eo siquidē ad putrescētia oris ulcera, siue per se, siue cū  
melle, cum detracta erat spuma, tum ad anginam, ubi  
iam per astringentia medicamenta constitit quod in-  
fluebat, ac breuiter ad columellam præcisam, puden-  
diq; & ani ulcera cicatrice obducenda, sum q̄ toelici-  
simè usus. Porro quo pacto adulterētur dictorum me-  
dicamentorum singula, non uidetur pretium operæ  
scribere, quum talia posse discere homines sceleratis-  
simi in lucro ponant.

## Theion, Sulfur.

**S**ulfur omne trahendi uim possidet, estq; tempera-  
menti calidi, atq; essentia tenuis, adeò ut ad multa  
uenenatorum animalium resistat, si siccū ictui insper-

Gypsum.

Albugo oui ad  
ophthalmias  
utilis.

Gypsum ustū.

Diphryges.

Adulteria me-  
dicamentorum  
cur docenda  
non sunt.Theion.  
Sulphur.



gatur: aut cum salua, aut urina, aut oleo ueteri, aut mel-  
le, aut resina terebinthina illinatur. Quin & pforas, &  
lichenas, & lepras, non raro hoc medicamêto cum resi-  
na terebinthina sanaui. Extergit enim omnes id genus  
affectus, absq; hoc ut in profundum repellat.

Ios, Ærugo.

Ios.  
Ærugo.

Epuloticorum  
opera.

**G** Vstantibus acrem exhibet qualitatem, digerens,  
detrahens, & liquans non teneram modò, sed &  
duram carnem. Hallucinâtur igitur qui talia medica-  
menta, epulotica appellant, hoc est, quæ cicatricem in-  
ducant: quum nimirû epulotica pharmaca contrahât,  
constipent, & in calli morem ipsam carnem indurêt.  
Quin & gustum mordicat ærugo, non tantû ulcera.  
Quòd si pauculû eius cerato non pauco admisceas, id  
quod ex ambobus mistum est, citra morsum extergat.

Cadmia.

Cadmia.

Cadmie diffe-  
rentie.

Cadmie uires.

**C** Admia fit, ubi in fornacibus æs paratur: nempe  
tota terra, aut lapide ex quo æs gignitur, in subli-  
mem partem fornacis egerente ueluti fuliginem aut fa-  
uillam quandam. In argenteis etiam metallis simili se-  
cretionem efficitur. Quin & ex pyrite lapide in fornaci-  
bus usto fit cadmia. Cæterû absq; fornace in Cypro  
cadmia inuenitur, quam iure quispiam lapidem uocet.  
At eius quæ combusta est, aliam botryitin, aliam pla-  
citin Medici nuncupant. Botryitin quidem, \* quæ in  
editioribus ipsius fornacis muris colligit. Placitin ue-  
rò, quæ in humilioribus. Ac liquet sanè Botryitin par-  
tium esse tenuiorum: crassiorum uerò Placitin: utrâq;  
autem ui desiccandi, ac mediocriter digerendi prædi-  
tam. Quæ autem colligitur in fornacibus, igneæ qua-  
litatis necessariò etiam aliquid habet. Meritò itaq; eâ  
abluentes, medicamen efficiunt mediocriter tum desic-  
cans, tum extergens absq; mordicatione: utile ad caua  
ulcera præhumida, & putrescentia, quæ in oculis & in  
toto corpore habentur. Igitur respicientes ad tempera-



tam & mediam inter omnes excessus naturam, leuiter desiccatoriam abstersoriamq; cadmige inesse facultatē dicimus In caliditatis autem et frigiditatis differentia, cadmia quodammodo temperata existit.

Cinnabari.

**M**odice acrem facultatem obtinet. Habet uerò & astringentis quippiam.

Ciferis, Pumex.

**I**n sarcotica medicamenta inditur, & ea quæ dentes extergunt, partim ustionem non expertus, partim etiam exustus: quādoquidem alijs omnibus combustis similiter, substantiæ tenuioris efficitur. Cæterū ustione quiddam acquirit acrimoniæ, quā rursus lotionem exuit. Videri autem poterit, & conciliare splendorem, nō tantū facultate, sed etiā asperitate: ueluti si smirnam, aut testam tritam admoueas. Eundem in modum cornua deusta dentes reddunt splendidos.

Conia, Lixiuum ex cinere.

**A**bluto cinere fit. Cinerem autem, ustorum corporum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixiuū pro eius quod eluitur natura. Cineris siquidē qui acrimoniam igneam habet acerrimam, ipsum quoq; acerrimū est: eius quod tale non est, etiā moderatius. Quare & putrefacientibus medicamentis miscetur: utpote causticam facultatem possidens: sed propter substantiæ suæ tenuitatem, citra dolorem adurens.

Cyanos, Cæruleus.

**A**crem possidet facultatem, ac tum detrahendi, tum digerendi, q̃ cinnabari, potentiorē. Inest quoq; ei nonnulla astrictio.

Lepis, Squama æris, & ferri.

**S**quama, alia est æris, medicamē multo utilissimū: alia ferri, & stomomatis: alia deniq; quam nōnulli uocant helitin. Atq; omnes sanē uehementer siccant. Cæterū helites principem in desiccando locum ob-

Nnn ij

Cinnabari.

Ciferis.  
Pumex.

Exusta omnia  
reddi substantiæ  
tenuioris.

Cornua deusta  
dentes reddunt  
splendidos.

Conia.  
Lixiuum  
Cinis.

Cyanos.  
Cæruleus lapis

Lepis.  
Squama.  
Helitis.



tinet: nam subtilissima omnium substantia est, nimirum quæ æruginis nonnihil assumpserit. Maiorē obtinet astrictionem squama ferri, & hac etiam maiorem stomomatis. Quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt quæ squama æris. Detrahit & liquat carnem potentius squama æris, & hac etiam ualentius helitis. Omnes autem squamæ non instrenuè mordaces sunt. Quare essentia ipsarum non est admodum tenuis. Siquidem inter ea quæ parem uim possident, minus est mordax quod est tenuius.

Mordacia minus esse quæ sunt tenuiora, si parem facultatē obtineant.

#### Lithargyros.

Lithargyros.

**D**esiccat quidem, sed omnium moderatissime: & secundum alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio consistit. Modica tamē astringendi, abstergendi quæ facultas ei inest. Cæterum ad intertrigines semorum utilis medela est. Iure itaque medi ordinis in metallicis habebitur. Proinde frequenter utimur lithargyro ceu aliorum materia: sicuti in liquecentibus ad pleraque medicamenta adhibemus ceram, tanquam materiam mediam eorum quæ ualentem possident facultatem.

Cera.

#### Nitrum.

Nitrum.

Aphronitrum inimicum stomacho.

**I**nter aphronitrum & salem uires medias fortitur. Cæterum ustum propius ad aphronitrum accedit, utpote ex ustione tenuius redditum. Desiccat itaque & digerit: quæ si intra corpus sumatur, secat & extenuat crassos & lentos succos, multo potētius quæ sal. Aphronitrum uerò, nisi grauis urgeat necessitas, deuorandum non est, nimirum inimicum stomacho: quandoquidem plus etiam nitro incidit. Porro ad suffocantes fungos, nitro usto simul & non usto, & multo etiam magis eius spuma, uti consueuimus.

#### Melanteria.

Melanteria.

**V**alde quidem astringit, astringentia quæ omnia per modum tenuitate superat.



Melan graphicum, Atramentum scriptorium.

**A** Dmodum & ipsum desiccatur aqua solutum. Ulcera autem igni ambusta protinus illitum iuuat. & si acetum quoque habeat, multo magis.

Misy.

**I** N metallis ipsis, super chalcitim nascitur misy, ut ærugo super æs. Ac suspicor etiam fori longo tempore mutationem in chalcitim posse accipere. Quare mirum non est, tria hæc medicamina eiusdem genere facultatis esse, fori dico, & chalcitim, & misy, tenuitate & crassitudine inter se diuersa. Crassissimum enim est inter ipsa fori, tenuissimum misy, mediam utriusque facultatem habet chalcitis. Adurunt uniuersa hæc tria, & escharas efficiunt. Attamen non nihil etiam astringunt. Cæterum misy ad motum corporibus duris minus chalcitide mordicat, tametsi ea non minus sit calidum: id quod beneficio tenuitatis sortitur. Porro quum utraq; hæc in decoctionibus fundatur, & magis chalcitis, quam misy, fori tamen non liquefit: nimirum quia lapidosius sit, & uehementius compactum: sicuti rursus misy, quia à congenito calore elaboratius est, ac proinde ficcius chalcitide, ideo merito quoque liquefit ægrius.

Molibdæna, Plumbago.

**S** Imilem lithargyro uim possidet, tantum à media temperie ad frigidius paulum quid recedens. Sed neque abstergentis facultatis est particeps. Vtrumque autem medicamentum liquari potest, celerrimeque, ubi oleo non nihil aceti est additum. Liquantur tamen etiam admixta aqua, sed coctione longissima. Vidi equidem molibdænam proiectam plurimum, cum multis alijs lapidibus in ea uia quæ ad ergasteria ducit à Pergamo.

Molibdos, Plumbum.

**F** Acultatis est refrigeratoriæ. Siquidem non modò multam habet substantiam humidam à frigore congelatam, sed & aeriam: paucam autem terream. Igitur

N n n n iij

Atramentum  
scriptorium.

Misy.

Ærugo.

Sori.

Chalcitis.

Molibdæna.

Plumbago.

Molibdos.

Plumbum.



**Plumbum vni  
cū mole & pō  
dere augetur.**

**Plumbeū mer  
tariū conferre  
ad conficiēda  
medicamenta  
refrigerātia.**

**Plūbi lamina  
admota lūbis  
nocturnas pol  
lutiones coer  
cet.**

**Plumbū vstū  
qbus cōducit  
affectibus.**

q plurimum habeat essentiae humidæ coactæ à frigo  
re, indicium tibi esto, q ubi admotū est igni, celeriter  
funditur fluitq; . Quodd uerò & aeris sit particeps, hoc  
habeto signum. Omnium quæ nouimus unicum plū  
bum tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur  
in ædibus subterraneis, aerem habentibus turbidum,  
ita ut quæcunq; illic ponantur, celeriter situm contra  
hant. Iam uerò si in mortario plumbeo liquorem quē  
libet plumbeo pistillo cōtriueris, ita ut ex pistillo ipso,  
atq; etiam mortario exprimatur etiam aliquis succus,  
id quod ex utroq; conflabitur, multò erit frigidius, q  
liquor infusus fuerat. Cæterū si uis magis refrigera  
torium medicamen efficere oleum omphacinū, aut ro  
saceum, aut mellinum, aut myrtinum, sit liquor is, quē  
infundes: eritq; remedium optimū ad sedis phlegmo  
nas cum ulcere aut rugis, & ad eas quæ in pudendis, te  
stibus, uberibusq; consistunt: similiter aduersus cæte  
ras omnes fluxiones quæ articulis accidunt. Sed & ul  
ceribus rebellibus etiam utile est. Nam ad canculos eo  
utens, uirtutem medicamēti miraberis. Quodd si celeri  
ter multum succi plumbei uelis colligere, conare in so  
le terere, aut quocunq; certè modo aere excafacto.  
Multò autem utilisimum habebis medicamentum, si  
affuso refrigerantium succorū aliquo teras, ut semper  
uiui, cotyledonis, intybi, lactucæ, condriles, psylli, om  
phacis, portulacæ. In laminam etiam diductum plum  
bum, lumbisq; admotum, pollutionem per insomnia  
coercet, nimirum haud obscurè refrigerās. Sed & bra  
ctea tenuis probè ganglio illigata, ipsum dissipat. Illi  
gabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit  
in ipsam noxam potius firmandum, q hinc uel inde.  
Porrò plumbum ustum, ac dein ablutū, refrigerat, cō  
fertq; ad implenda ulcera, eademq; cicatrice obducen  
da. Conuenit & chironiis dictis, & omnibus cācrosis  
ulceribus. Ante lotionem autem, ulceribus pertinaci



bus etiam auxilio est.

Ostracon, Testa.

**D**Esiccandi abstergendiq; uim possidet, maximè, quæ ex fornacibus est. Ex qua quidem præperata emplastrum, optimè cicatricem inducit.

Ostracon.  
Testa.

Pompholyx, Spodium.

**P**ompholyx fit & i æris fornace, ueluti & cadmia: fitq; & dum in fornacibus cadmia uritur, nimirum ab ipsa cadmia in tectum fornacis quadam fauilla ascendente; quæ dum colligitur est pompholyx. Nā quod reflectens in pauimentum recidit, nominatur spodium. Cui uidetur similem habere facultatem, quod antispodium appellant. At ego illo usus sum nūquam, quum largè mihi semper pompholyx suppetere. Nec enim quisquam ubi hæc adsit, spodio uti uelit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum propè omnium quæ citra morsum desiccant, si elota fuerit, præstantissimum. Quamobrem ad ulcera cæcrofa idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; inditur collyrjs quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæq; bullas in eis natas curant. Præterea ad puendorum & sedis ulcera optimum est remedium.

Pompholyx.

Spodium.  
Antispodium.

Pompholyx  
quibus utilis

Sandarache.

**V**rentis est facultatis, ut arsenicū. Meritò itaq; digerētibus facultatibus & extergētibus cōmiscet.

Sandarache.

Sandix.

**Q**ua sit facultate prædita, in sermone de psimythio explicabitur.

Sandix.

Scoria.

**S**coria omnis resiccatorium est medicamen: potissimum autem ferri. Siquidem ad leuorem redigēs ipsam in aceto q̄p acerrimo, posteaq; decoquens, ad aures iampridem fluentes pure, ea uitor pro medicamento maximè exiccatorio.

Scoria.

Stimmi.

Nnan iij



Stimul.

**C**um facultate desiccatoria habet astringentem adiunctam. Quamobrem & ocularibus medicamentis miscetur.

Stypteria schiste, & Strongyle, & hygra. Alumen fissile, rotundum, & humidum.

Stypteria.  
Aluminis differentie.

**A**lumen uehementis simè astringit. Ceterum quò sit crassarum partium, tenuius quodammodo est quod uocatur fissile. Proximum est rotundum, & astragalotum: Admodum crassum est tum liquidum, tum placites & plinthites dictum.

Titanos, Calx.

Titanos.  
Calx.

**V**itula quidem uehementer urit, adeò ut crustas efficiat: extincta uerò protinus etiam crustam molitur & ipsa: at post diem unum & alterum minus urit, minusq; inducere crustam potest. At uerò temporis progressu prosum nec crustam quidem gignere ualet, tametsi etiamnum calfaciat, carnemq; liquet. Porro si lauetur in aqua, suam mordacitatē exuit, efficitq; nūcupatum lixiuium. At ipsa absq; morfu desiccatur.

Hydrargyros, Argentum uiuum.

Hydrargyros.  
Argentū uiuū.

**N**on est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex his quæ parantur, ueluti psimythium, ærugo, psoricum, lythargyros. Cæterū interimat ne deuoratum aut admotum extrinsecus, nondum feci periculum.

Phycos.

Phycos.

**F**acultatem eius, ubi de psimythio age, exponam. Chalcanthos, Atramentum futorium.

Chalcanthos.  
Atramentū futorium.

**C**alcanthos (qui in Cypro ex uiridi quadam aqua cōcrescit) extrema sui parte in chalcitim temporis processu degenerat. Habet autem cum astringentia maxima, caliditatem non uulgarē coniunctam. Vnde omnium maximè cōdire seruareq; carnes humidæ potest: nimirum caliditate humiditatē absumēs, astringentiaq; substantiam contrahens, atq; constipans. Constringit itaq; siccat, & cōtrahit in sese totius substantiā carnis.



## Chalcitis.

**M**istas habet astringentem acremq; facultates. Ceterum uincit acris, utpote adeò uehemens, ut carnem urat, necnon inducat escharā. Vstum hoc medicamentum minus mordicat, nō tñ minus desiccāt. Verum non parum astrictiōis remittit. Itaq; melior est undequa; chalcitis tum adusta, tum lota: quum euadat sic minus mordax.

Chalcitis.

## Chalcos cecaumenos, Æs ustum.

**H**abet & acrimoniam quādam, sed & astrictiōis est particeps. Proinde si lauetur, pulcherrimū est medicamentum cicatrici inducendæ.

Chalcos cecaumenos.  
Æs vstum.

## Chalcu anthos, Flos æris.

**T**enuioris essentia; est q̄ aut æs ustū, aut squama. Quare ex eo factis collyrijs extergunt, auferūtq; superciliorum magnas asperitates.

Chalcu anthos  
Flos æris.

## Chryfocolla.

**C**arnem liquat, non tamen ualēter mordicat: q̄ sit facultate admodū digerente, exiccanteq;. Preparare autem hāc chryfocollā debes tempore æstiuo, aut aere prorsus calido: urinam pueri, mortario & pistillo, utroq; ex rubro ære, p̄tundens. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus contumacibus, tum per se, tum alijs mistum. Nam quanto plus q̄ chryfocolla metallica desiccāt citra morsum, tanto etiam ipsam excellit tenuitate.

Chryfocolla  
duplex.

## Psimythium, Cerussa.

**S**i ex acri aceto soluatur, gustu tamē neq; acre erit, neq; mordax, sed emplasticū, & refrigeratorium. Cerussa adusta, in sandyca transit, medicamentū seipso tenuius, non tamē exalfaciēs. Phycos autē seruata cerussæ frigiditate, tenuitatem assumpsit.

Psimythium.  
Cerussa.  
Sandyx.  
Phycos.

## Pforicum.

**C**onficitur dupla chalcite admista lithargyro: ante tamē utrisq; acerrimo aceto solutis, sicq; in ol-

Pforicon.



lam nouam coniectis, quam fimo estate media diebus  
quadraginta obrutam sepelies. Hoc medicamen ma-  
gis desiccatorium est, minusq; chalcite mordax: quum  
partibus sit tenuioribus.

# GALENI PERGA- MENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber X.



**P**XPOSVIMVS igitur quinque  
cōmētarijs prioribus qualitates quas  
secundas appellant, in medicamētis  
quæ effectricibus qualitatibus agūt,  
pro earūdem effectricium specifica-  
rumq; qualitatū mistura nasci. Ostē-  
sum preterea est, quo pacto uniuersalis facultas unica  
experientia inueniatur, neq; ea uulgari, sed quæ certis  
adhibeatur limitationibus. Porro in sexto, septimo, &  
octauo libro, materiam quæ ad plantas pertinet, expli-  
cauimus: in nono autem, eam quæ circa terrena & la-  
pidosa uersatur. Reliquum uerò nunc est, ut eam quæ  
ab animalibus sumit in hoc decimo persequamur ma-  
teriam. Nam ad finē undecimi agemus de ijs quæ pro-  
uenientia in aqua, nec plantæ, nec terra, nec lapis, nec  
animalia sunt.

Hæma, Sanguis.

Hæma.

Sanguis nullus  
est frigidus.

Sanguis suillus,  
temperie est hu-  
mano persimi-  
lis.

**P**RO natura animalium uariat. Huic siquidē anima-  
li est liquidior: siccior illi: calidior alteri. Nullus au-  
tem sanguis est frigidus.

Sanguis suillus.

**H**UMIDUS & minus calidus est, temperie humano  
persimilis. Siquidem & carnes suum similes hu-



manis existunt. Vnde quidam ab hospitibus prauis appositas, auidissimè humanas carnes ederūt. Etenim ex ipso sanguine, tum generatio prima, tum postea nutritio ipsis carnibus constat. Itaq; quisquis humanum sanguinem morbo alicui utilem esse ait, in fuillo primum id comprobet. Nam & si aliquatenus inferior is sit humano, saltem asimile quippiam efficiet: quo cognito, ab humano pleniorē fore utilitatē sperabimus. Porrò similia efficere posse similia, experti sumus. Nam columbæ sanguinem, qui capitis ossa cō fracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum effundere assolent. Quidam autem, quum nō esset columba ad manum, palumbi sanguine est usus, fœliciterq; successit. Alius turturem eundem ad usum applicans, nihil hominem lēsit. Similibus siquidem ad eosdem affectus utimur, ubi quę antea experti sumus non adsunt.

Hæma peristeras, Sanguis columbæ.

**E**O ad hyposphagmata in oculis consistentia quidam utuntur, uenis ad alarum exortū incisis, quo sanguis calidus effluat, ut sic ad multos usus idem p̄duret animal. Alij pullorum tenerorum extractas penas, quæ humore redundant, in ipsum oculum expriment. Quancūq; sunt nobis collyria uaria hyposphagmatis oculorum aptissima, cuiusmodi est quod plurimum recipit myrrhæ, & quod multum thuris admittit; necnon quæ ex croco conflantur. Quin & fœnigræci succus sanguini colūbino in hoc utiq; præstat. Præterea sexcentos noui eorū quibus Romæ perforata fuerit capitis ossa, nec quicūq; ab usu rosacei, citra sanguinem columbinum, offensos. Quare id calidū sit æquē atq; columbæ sanguis, necesse est. Cæterū præter moderationem caloris (cuius fortē contactu iuuat) leuiter etiam astringit. Itaq; melius inuenire nihil possis in capite perforato, q̄ ut probo rosaceo utaris.

Hæma nycteridos, Sanguis uespertilionis.

Colūbinū sanguinem infundendi p̄ cranii fracturas.

Sanguis colūbinus hyposphagmatis cōfert.

Hyposphagmatis quæ cōueniant.

Rosaceum cōmode infundendi p̄ cranii fracturas, effectq; nō minus calidum sanguine columbino.



Sanguis ves-  
pertilionis.

Sanguis nullus  
in totū est fri-  
gidus.

Sanguis viri-  
dium ranarū.

Gala.  
Lactis optimi  
notā.

Lactis vsus.  
Lac alteratur  
omnium facil-  
lime.  
Lac muliebre  
est homini fa-  
miliarissimū.

**S**I ubi hoc sanguine axillas illeueris, postea chalcantion aut cicutæ semen inspergas, Xenocrates quidem ait, aut sub illis prorsum pilos nō prodituros, aut certē lanuginosos. Alij uerō & puerorū pudendis sanguinē uespertilionis illinūt, ut glabras illas partes conseruent. Ergo ex refrigeratione partis uehemēti, eiusmodi quippiā posse contingere, non est à ratione alienum. Non tamen adeò frigidæ facultatis est sanguis uespertilionis; quum in totum nullus sanguis sit frigidus. Porro hædinum sanguinem seruēfactum cum pari aceti portione, hæmoptoicos iuuare prodidit etiam Xenocrates. Quod remediū tutò experiri poteris, ubi nullum aliorum ad manum suppetet.

Sanguis uiridium ranarum.

**Q**Uum affereret quidam illitum hunc prohibiturum quo minus euulsi semel palpebrarum renascerentur pili, falsum esse id experimento didici-

Gala, Lac.

**P**erfectissimum lac, nempe qđ ab omni aliena qualitate est immune (hoc est odoris exps, aut exiguū bonum odorem referens, præterea gustu suaue, pauculam habens dulcedinē, sicuti & saluberrimus sanguis, ex quo & lacti generatio cōstat) ad acres & mordaces fluxiones est commodissimum, non abluēs modò eas ratione seri ab afflictis particulis, sed etiam ob pinguitudinem corpora illinens, ut non in nuda cadat, quod defluit. Porro quum lac omnium alteretur facillimè, præsertim si ambiēs fuerit calidus, multum à dicta facultate amittit, nisi p̄tinus quis ab uberibus effuso ipso calido utatur. Maximè igitur mulieris bene habitæ & bonam uictus rationem seruantis, lacte utendum: nam id humano corpori est longè familiarissimū. Deinde aliorum animalium, quæ quidem ab humana natura non longissimè absunt: id quod scies ex carniū odore. Nam fastidiosus est eorum quæ multum diuer-



fam habent temperiem, ut canis, lupi, leonis, pardalis, uulpis, hyænæ, urfi, & similiū. Non iniucundus est eorum quæ nō porro absunt, ut suis, capræ, equæ, bouis, ouis, & asinæ. Quocirca etiam homines docti experientia, caprino, ouillo, bubulo, asininoq; lacte utuntur, & caseos ex eis conficiunt, excepto asinino. Nā id planè tenue est, & plenū humoris serosi, ueluti bubulū crassum; cæterum consistentia medium caprillum est. At sus crudum aqueumq; lac obtinet. Iam uerò lac omne ex tribus cōstat essentijs, caseosa, serosa, et pingui. Hāc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo butyrum conficitur, facultatis concoquentis & relaxantis. Quare maximè illo utuntur ad parotidas et bubonas.

Serum lactis.

**A**T serum extergendi potentiam possidet, adhibeturq; subducendi uentris gratia, ac per clysteres inijcitur, extergens & abluens sine mordacitate acrimoniam intestinorum. Præterea si quis ulcera quæ sanie infestantur acri, uice aquæ sero colluat, optimè sanè fecerit. Quæcunq; etiam medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero q̃ aqua diluere. At quod lacti caseosum inest, illitū adhæret magis: ob idq; acrimoniam retūdit. Atq; ubi aliam quāpiam desiccantem facultatem habuerit adiunctā, optimū est dysenterix remedium, & oīum uentris acriū fluxionum. Eam autem accipit à lapidibus, aut etiam ferreis cylindris, qui prædecocto lacti inijciunt igniti. Ferrum siquidem astringentis facultatis etiam est par

Lac asinum  
est plenū hu  
moris serosi.  
Lac bubulū.  
Lac caprillū.  
Lactis substan  
tia triplex.

Serum lactis q̃  
præstat.

Caseosq; lactis  
substantię vsus.

Ferri facultas.

Lactis vsus.

mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus



ipsum & utero exulcerato. Sic eo & ad sedis & pudendorum ulcera utimur, & ad omnia breuiter, quæ leniri postulant. Ea propter & cæcrosis applicatur ulceribus, medicamentis anodynis commistum, qualia sunt quæ constant ex pompholyge. Collutum etiam, oris phlegmonas mingat: nec non tonsillas, columellâ, anginâ phlegmone affectas, ac proinde etiam anginam lenit. Est itaq; medicamen leniens, totam quidem substantiam habens mordacitatis experte, sed multo magis ubi concoctione moderata, potissima pars seri consumpta fuerit. Sic mihi uidentur etiam Medici ad uenena quæ erosionem interimunt, lac ppinare: ueluti sunt lepus marinus, & cantharis. Sunt etiam qui & merito id exhibent, ijs qui aconitum & thapsiâ deuorauerunt.

## Caseus.

Caseus.

Caseus inueteratus ē acrior.

**V**bi pinguitudo cū toto lacte concreuit, seroso distaxat' humore per coagulationē secreto, pinguis caseus efficitur. Qui quidem qualiscunq; sit, temporis spatio acrimoniam acquirit, quam deprehendes gustu & olfactu. Cæterum impense acris inueteratus q; iam redditus, maceratus q; decocto suillarum carniū, topophos arthriticorum discutit. At recēs caseus et mollis, mirè uulnera glutinat: nam reperiendi uim possidet, leuiter nimirum refrigerans. Cæterum oxygalactinus, præter hæc, digerendi etiam quandam uim lenem obtinet.

## Butyrum.

Butyri facultas.

**F**acultatis est concoquentis, paulum etiam habēs digerentis potentiæ, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem atq; mollitiem. Nam corporum planè durorum tumores præter naturam, hoc nequit medicamen digerere. At quæ in mollibus sunt phlegmongeas & cōcoquit & digerit faciliè. Nam parotidas, & bubonas, & oris inflammationes, prorsus illo solo curamus: nimirum puerilibus corporibus, mu-



liebribusq; eas perpetiētib. Sed & gingiuis puero-  
rum dentientiū assiduē illitum, nihilo imbecillius mel-  
le, extenuat exitum dentibus: cæterosq; oēs oris phleg-  
monosos affectus, postea q̄ fluxio restiterit, digerit pa-  
riter, concoquitq;. Proinde cataplasmatibus inditur quæ  
extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs,  
bubonibusq;. Deuoratū etiam, distributumq;, magni-  
ficè confert expuitionibus ex pulmone, idq; in pleuri-  
ticis peripneumonicisq; affectibus: cum hoc quod eos  
etiam concoquat. Quod si solum lingatur, magis qui-  
dem concoquit, uerū educit minus: si cum melle &  
amaris amygdalis, plus educit, sed minus concoquit.

Pytia, Coagulum.

**C**oagulum omne acris & digerentis potentiæ est,  
atq; etiam exiccatoriæ; nā necessariò id superio-  
ra comitatur. Ac leporis quidem coagulum comitialē  
morbum, si cum aceto bibatur, præterea profluuiū mu-  
liebre sanare proditum est: necnon coactum in uētre  
lac dissoluere: id quod nos sumus haud dubiè experti,  
non solū in leporino, sed in aliorum etiam omniū ani-  
malium coagulo. Sed & sanguinem in uentre concre-  
tum simili modo epotum coagulum leporinum dissol-  
uit, ac efficacius quidem cæteris, uerū non solū: quū  
hoc omni sit commune coagulo.

Coagulum phocæ.

**H**ic nonnulli uires castorij tribuunt.

Chole, Fel.

**H**ic succus omnium qui in quoq; sunt animalium  
calidissimus est. Cæterū pro uaria animalium  
temperie, calor eius uariat. Sunt autem in uniuersum  
quatuor in singulis animalium sanguine præditorum,  
humores: sanguis uidelicet, pituita, & bilis tum flaua,  
tum atra. Verū dum absolutè dicimus bilem, semp  
intelligimus flauam, quæ in iecoris uesica colligitur.  
At ipsam flauam bilem interdum Medici pallidā no-

Butyrum exte-  
nuat ifan-ium  
exitū dētib.

Butyrum uora-  
tū pleuriticis  
expuitionibus  
confert.

Pytia.  
Coagulum.  
Coaguli lepo-  
rini facultates  
insignes.

Coagulum oē  
dissoluit lac et  
sanguinē in vē-  
tre concretū.

Chole.  
Fel.  
Humores san-  
guine prædita  
omniū cōmu-  
nes, sunt qua-  
tuor.



Flauæ bilis pal-  
lidæq; disca-  
men.

Castratum ani-  
mal reddi simi-  
le foeminae.

Bilis quo pa-  
cto accommoda-  
tur oculis.

Aures pure flu-  
entes, qua spe-  
cie bilis iuuen-  
tur.

Bilis differēti-  
æ animalium  
diuersitate.

minant. Sciendum tamen est flauam tanto esse pallida-  
calidiorē, quanto & crassiorē. Nam seroso recremen-  
to flauæ bili permisto, pallidam constitui contingit: si-  
cuti & flauam plusculum exalfectam, consistētia red-  
di crassam, colore autem flauam. Quin & in animali-  
bus apparet flaua quidem, ijs quæ magis sunt calida:  
quæ uerò minus, pallida. Et ubi animalia calida, aut fa-  
me, aut siti torquentur, ad atrū colorem uergit, interim  
illum habens æruginosum, interim cæruleum, interim  
accuratè fuscū. Porro ubi ocularia medicamenta pre-  
parant, callionymi, scorpij marini, hyæng, galli, perdi-  
cis, et aliorum quorūdam animalium bilem admiscēt.  
Quare color eius est explorādus. Iam uerò taurorum  
bilis calidior & ficcior est, q̄ boum castratorum: nam  
castratum animal semper simile redditur foeminae, &  
ijs quæ sunt etatis minoris. Itaq; ut hæc humore supe-  
rant adulta & perfectā, uincunturq; ab iisdem calidita-  
te: ad eūdem modum bos castratus à tauris. Vt igitur  
urina à modica portione modicè pallere, & sitim fa-  
memq; & multum laborē perpessis, flaua esse conspi-  
citur: impletis uerò, atq; inebriatis, albicans: ita bilis  
colores mutat. At uerò q̄ hic humor sit acris, hinc dis-  
cas licet, q̄ referat hæmorrhoidas, q̄q; illis ipsis qui  
utuntur mordicare percipitur. Ac proinde cauemus,  
ne ad alium morbum, aut symptoma, bilē usurpemus  
solam, atq; per se. Quippè dum oculis ipsam accomo-  
damus, miscemus illi tum mel, tum fceniculi succum,  
tum opobalsamum. Domesticarū suum bile (quæ im-  
becillima omnium, ac maximè aquea existit) utuntur  
quidam ad aurium ulcera: medicamento certè non re-  
probo. Cæterū ubi ulcus diuturnum fuerit, ac mul-  
tam saniem & pus cōtineat, etiam ficciorē bilem per-  
feret, puta ouium, quæ paulò est acrior suilla: hac etiā  
magis caprarum: cui adsimilis quodāmodo est urforū  
& boum. At taurorum his ualentior est: inferior tamē  
bile



bile hyænarum; et hæc quoq; inferior bile callionymi, et scorpij marini, & marine testudinis. Volatiliū biles oēs tum acriores sunt, tum sicciores q̄ quadrupedum; & inter ipsas quoq; uolucres, gallinarum & perdicū biles ad medicinæ usum probatiores habent. Miluorum uerò & aquilarum, impendio acres sunt: erodentesq;: quamobrem colore ærugineo uidentur, ac non nunquam atro. Licebit itaq; tibi secundum exigētiam affectuū, hæce differentias bilis methodo ad experimentiam reducere.

### Hydros, Sudor.

**E** Andem quam urina & materiam & modum generationis sortitur. Siquidem utriq; generatio ex bibito humore constat, ex calfacto simul in corpore, et biliosæ non nihil substantiæ adeptæ. Verū sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutē usq; permeatis omnibus quæ intersunt partibus, peruenit. Sudores autē inter sese & urinas differre necesse est, tum p animalium tēperaturis, quæ & natura, & ætatum ratione nō parum à seinuicem sunt diuersæ: tū pro ambiētis nos aeris temperie. Quòd sudor saluginosæ qualitatis sit particeps, gustus testimonio p̄batur. Nā sepe numero nolentibus in os defluens, dictam qualitatem indicat. Sæpe uerò etiam non obscuram præfert amaritudinē. Sed color etiam, eius naturā designat. Nam sicuti urina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Porrò tennes exercitatorum sordes, plus percipiūt q̄ sudor: minus autem digerunt. At ubi sudor illis p̄mixtus est, multum facultatis digerentis acquirunt. Quare tumores præter naturam discutiunt: ad phlegmonasq; uberrimum, præstantissimo sunt remedio. Quòd si sicciores esse sordes uideantur, cyprinum superungito: aut eodē ipsas, si ualde sint siccæ, subigito. Si uerò cyprinū ad manū non sit, rosaceū bonū miscuisse sufficit. Hoc medicamentū est admodū utile, ad restinguēdū & discuti-

Hydros.  
Sudor.

Sudorē esse sal  
uginosum.

Sordes exerci  
tatorium.



Vrina.

Vrina omnis,  
 facultate est ca-  
 lida.

**Q**uanta est in animalibus bilis diuerfitas, tanta  
 item est in urinis. Atq; omnes quidem faculta-  
 te sunt calidæ, sed plus tamen animalium calidorum;  
 minus autem frigidorum.

Vrina humana.

Vrina huma-  
 na.

**H**æc aliarum omnium est imbecillima, excepta il-  
 la quam reddunt porci domestici, quibus execti  
 sunt testes. Quorum ut temperies, ita urina fimilis hu-  
 manæ existit. At montanorum aprorum, ualida est, ut  
 uel ex odore acerrimo cõstat. Sed et in animalibus cæ-  
 teris ex odore uim eius conijcere licet. Nam degustare  
 ipsorum urinas, planè fuerit abominandum: quum ne  
 pueri quidem urinam uir quidã honestus uita pariter  
 & moribus, ebibere sustinuerit; etiã si pestiferè egro-  
 taret in Syria, ubi multi ab humanæ urinae potione sese  
 liberatos profitebantur. Etenim urina hominum, ut si  
 quid aliud, extergendi uim obtinet; id quod satis fullo-  
 nes indicant, qui sordida uestium expurgant usu illius,  
 atq; extergunt. Quod conspicati nonnulli Medici, ea  
 psoras & lepras detergunt, pfunduntq; ulcera phumida,  
 & sordida, multoq; magis, cõputrescentia. Sed & pu-  
 dendis ubi sic afficiuntur, urinã infundunt, & auribus pu-  
 re fluentibus. Quin & achoras & fursures ea curant, ca-  
 put idẽtidem perfundentes. At nos hæc facere odimus,  
 quum ad manum sint alia, quæ illis conducant, medi-  
 camenta. Quãq; ulcera digitorum pedis, maximè quæ  
 ex illusione inflicta essent, sæpenumerò, ubi carerent  
 phlegmone, et ipse urina curauit; idq; in seruis, et homi-  
 nibus rusticis. Ceterũ medicamentum quod ex urina  
 pueri cõficitur, quod quidam Chrysocollam appellat,  
 quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera diffi-  
 cilia sanatu optimũ esse assero. Fit autẽ id, ubi in mor-  
 tario æris rubei, pistillo etiam ex rubeo ære confecto,

Vrinae humane  
 potione multi  
 sese liberatos  
 a pestiferi mor-  
 bo pfessi sunt.

Vrinae humane  
 facultas.

Chrysocollæ fa-  
 ciendæ ratio.



puerilis urina tandiu sub calido coelo tunditur, donec ob eliquationē attritionemq; pistilli & mortarij, mel-  
lis crassitudinem contrahat.

Sielon, Saliua.

**V** Turina & bilis, sic etiam saliua, sumpto quidem cibo, imbecilla est; ualida & acris eorum qui in-  
genti aut siti, aut inedia premuntur: in medio utriusq;  
est, eorum qui probè concoxerunt quidem, nōdum ta-  
men cibum potum uel hauserunt. Hac ergo saliua nu-  
trices pueris lichenas curant, paruum uidelicet digitū  
rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes. Sed  
& triticum mandentes rustici non pauci furūculis im-  
ponunt: nam celeriter eos digerit, concoquitq;: quum  
si macerarent aqua, non eque prodesset. Ex quo liquet  
saliuam iuuandi robur adferre. Atq; corporibus mol-  
libus, aut puerorum, panem, non triticum, imponunt  
ore cōmansum. Porro cōmansa omnia digerunt & su-  
gillata, & cetera ecchymomata omnia, maximè ubi pa-  
nis simul cum pauco radicula fuerit cōmansus. Iam ue-  
rò uniuersa substantia sua uel maximè aduersa est sali-  
ua bestijs hominem interficientibus.

Stercus caninum.

**S** Tercus omne uim maximè digerentē obtinet. Cæ-  
terum canis, qui solis ossibus fuerit integrū biduū  
nutritus, durum, candidum minimeq; foetens stercus  
est: quod quidem exiccatum, redactumq; in pollinē,  
ad anginam, dysenteriam, & summè inueterata ulcera  
optimè accommodatur. Ad anginam quidem, ijs mi-  
stum, quæ alioqui huic affectui conueniunt: ad dysen-  
teriam autem, iniectum lacti decocto, & quod filices  
candentes, aut cylindros ferreos extinxerit.

Stercus humanum.

**S** Tercus pueri siccū, & cum melle Attico ad læuo-  
rem tritum, illitumq; sanat gutturis phlegmonas.

Stercus lupinum.

Sielon.

Saliua ieiuni  
uentriculi ad q̄  
conferat.  
Triticum man-  
sum furūculos  
q̄ celeritē  
concoquit.

Saliua huma-  
na aduersa be-  
stijs hominem  
perimentibus.

Stercus caninū  
quibus affecti-  
bus conferat.

Stercus huma-  
num.

Oooo ij



Stercus lupinū  
qbus conferat

Lupi & canes  
quomō & me  
iant, & cacent.

**Q**uidam lupinum stercus candidum, quale ubi ossa ederint, lupi solent excernere, quodq; non decidisset in terrā (lupi enī ut canes suspēso altero posteriorū crurum, & meiunt & cacāt, in eminente quopiam ex terra loco) aut uino albo, aut aqua distemperatum, colicis potandum dabat: nec tantū in ipsis paroxysmis, sed etiam in interuallis, si quidem uacarent phlegmone: felicissimeq; cedebat illi negotium. Verū illud etiā in eo mirabar, q̄ uel appensum illis uinculo confecto ex lana ouis à lupo laniatā, aut ex ceruina pelle, euidenter aliquoties iuisset,

Stercus capril-  
lum.

Stercus caprillum.

**O**mnium creberrimē utimur caprillo stercore, digerētis & acris facultatis: adeo ut induratis scirrhorum in modum tumoribus cōgruat, non lienis modo, sed etiam aliarum partium. Miscere tamen illi solemus farinam fabaceam, necnon oxycratum. Quin & ad aquam inter cutem, & ad spleneticos, uariē caprillo stercore utimur. Sed & ustum tenuioris quidem essentia, uerū haud manifestō redditur acrius. Quamobrem sanē ad alopecias cōgruit, & omnia uitia, quæ extergentia medicamenta postulant, ut psoras, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & diuturniores bubonas. Est enim uis eius tū usti, tum non usti, abstesoria, & digerens, nec eam parum habet digerendi potentiam. Nam eo etiam ex aceto quidam medicus utebatur in agris ad uiperarū morsus, ac multo magis aliarum bestiarum: ac profectō ex ijs complures seruauit. Idem etiam ad auriginem spyrrathos ipsas propinauit ex uino: & ad profluuium muliebri cum thure apposuit. Acrius tamen est medicamen, q̄ ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Jam uerō animalium temperatura sicciorum, exiccantius stercus est,

Morsus a uiperā  
stercus capril-  
lum auxilio  
est.



sicuti & calidiorū, magis excafactorium. Verūm nūllum omnino sterco refrigerat, sicuti neq; ullum humectat. Pro natura etiam eorum quæ edūtur, multa reperitur diuersitas. Proinde in hominibus maior est, q̃ in cæteris animalibus; quandoquidem hoc animal diuersissimis maximeq; uarijs utitur cibis.

Stercus nullū  
nec refrigerat,  
nec humectat.

Stercus bubulum.

**F**acultatem habet exiccatoriam, atq; attractoriam etiam, ut sanè ostendit, dum apū, uesparumq; moribus auxiliatur. Quidam autē medicus aqua inter cūtem laborātes bubulo stercore oblinens, in solē exposcebat. Idem partibus rusticorū phlegmone obsessis, humidum illud Vere collectum, dum herbam boues pascūtur, admouit. Est enim id moderatius alio, quod à paleis comestis excernitur; ac proinde accommodatius ad phlegmonas.

Stercus bubu-  
lum vesparum  
moribus auxi-  
liatur.

Stercus ouillum.

**I**lle idem medicus, ouitū utebatur stercore ad achordonas, & myrmecias, & thymos, & furunculos duos, aceto uidelicet diluens. Quin & ulcerum ambusta, ad cicatricem illo ducebat; id cerato rosaceo commiscens.

Stercus ouillū,

Stercus columbinum.

**S**tercore columbarū nomadum sicco, trito, & cribrato, unā cum nasturtij semine, uice napyos utor, ad ea quæ rubrificari postulant; nēpe ad omnes inueteratos affectus, cuiusmodi sunt coxædix, hemicrania, scotomata, uertigines, cephalæa, & in lateribus, scapulis, ceruice, ac lumbis, antiqui dolores; nec non nephritides, affectus cœliaci, & podagricæ arthritides: quando in articulis nondū concreti sunt tophi. Est autē hoc sterco minimè foetidum, præcipuè si sit arefactum.

Stercus colum-  
binum quibus  
auxiliatur affe-  
ctibus.

Gallinaceum sterco.

**T**ritum, ppinatumq; cum tribus quatuor uē oxy-  
crati aut oxymelitis cyathis, eos celeriter iuuat,

Stercus galli-  
nacenm.

O o o o iij



Exercitata o-  
tiosis sicciora  
sunt.

qui à comestis fungis anguntur: nimirum per uomitū  
crassissimos humores eliciens. Est autem hoc stercus  
minus calidum colūbino. Porrò ut animalia quæ exer-  
citantur, otiosis sicciora sunt: & quæ cibis utuntur cali-  
dioribus siccioribusq; ijs quæ frigidis atq; humidis:  
sic etiam eorum & excrementa, & partes. Quare colū-  
barum domesticarū stercus multo imbecillius est eo,  
quod à montanis excernitur. Gallinarū præterea quæ  
conclusæ seruantur, & furfuribus alūtur, longè etiam  
infirmius stercus est, q̃ earum quæ in agris pascuntur.

Stercus anserum, & ciconiarum.

Stercus anseri-  
num.

Stercus cico-  
niarum.

**A**nserinum stercus præ nimia acrimonia inutile  
est. Colligo etiam ita esse & accipitrum, & aquila-  
rum. Sunt qui ciconiarum stercus morbo comitali  
mederi scriptitent. Quo epoto credulus quidam nihil  
adiutus est.

Stercus murium.

Stercus muriū.

**S**ic enim & murium stercus alopecias curare pro-  
ditum est.

Stercus crocodilorum terrestrium.

Stercus croco-  
dilorum.

Stercus sturno-  
rum.

**C**rocodilorum terrestrium stercus, & sturnorum,  
cum solam oryzam ederint, utrūq; abstergēdi,  
desiccādiq; moderatam facultatem sortitur: ac multo  
moderatiorem sturnorum stercus. Porrò crocodilorū  
stercus, quod mulierum iuxus pretiosum reddidit, ut à  
facie ephelin tollit, ita & uiriliginem, & lichenas.

Rhypos, Sordes hominum.

Rhypos.  
Sordes homi-  
num.

**Q**uod aurium sordes paronychys sit utilis, pro-  
ditum est. Quæ uerò in tota cute puenit, illius  
sordis quam paton uocant nōnihil actionem adiuuat.  
utpote desiccandi uim habens, cum nonnulla calidita-  
te. Porrò ea sordes quæ lanis ouīū inhæret, ex qua cefy-  
pon conflāt, similē butyro concoquendi uim possidet:  
paulum etiam digerentis facultatis sortita.


Oesypen.



## GALENI PERGAS

MENI DE SIMPLICIVM  
MEDICAMENTORVM

Facultatibus. Liber XI.



PER Æq; ptes sunt animalibus uni-  
uersis communes; nulla tamē est equē  
communis, ut caro. Hanc enim habet  
omne animal. Cæterū eam quæ re-  
peritur in musculis, solam Medici car-  
nis appellatione dignantur. Nam car-  
nem uiscerum nonnulli parenchyma uocandam cen-  
sent, propterea q̄ ex uenis effusus sanguis, circū uasa  
omnia (ut ipsi arbitrantur) concreascit. Sed nos nomi-  
num contentione neglecta, persequamur propieta-  
tes particularum.

Caro uiperæ.

Non omnes animalium carnes hominem nutriūt,  
sed quorūdam etiam letales sunt. Tum inter eas  
quæ hominem nutriunt, quædam tantū sunt nutriti-  
um: quædam etiam medicamētum. Nam uiperarum  
carnes palam uidere est excalfacientes, & exiccantes,  
ubi condiuntur, ceu anguillæ, oleo, sale, anetho, porro,  
& aqua: horum omnium seruato modo. Quòd autem  
rotum corpus per cutim uacuent, uel hinc tibi discere  
licet, q̄ elephantici quidam prorsus sint restituti, ex po-  
tu uini, in quo uipera quædā fuerat extincta. Præterea  
nos elephāticum quendā, misso prius sanguine, atraq;  
bile medicamento purgata, uiperis quas capiebat uti  
iussimus, præparatis in olla, anguillarum more. Atq;  
ita sanatus est, euaporato per cutem affectu. Porro ui-  
perarum caro, adeò ualentem obtinet desiccandi uim  
ut quidam qui eam esitarūt, uehemētissima fuerint siti

Carnem omne  
animal possi-  
det.Caro pprie q̄  
dici mereatur.

Parenchyma.

Carnis uipe-  
ræ facultas, et  
cōcinnādē mo-  
dus.Elephantiasis  
curatio.Viperarū esus  
sitim maximā  
infert.

Oooo iij



Viperę cur ap-  
pellen-ur di-  
psades.

Carnes anima-  
liū cum cibis  
mutari.

Viperę caput,  
nō caudā abii-  
cē oportet ad  
cōficiendos ar-  
tiscos theria-  
cos.

Artiscos the-  
riacos cōficiē-  
di ratio.

Carnis viperę  
vires.

Caeochymia  
symptomata.

cruciatī. Quamobrem eas dipsadas nomināt. Sunt ta-  
men qui dicāt demorsos à uiperis satiari potu nō pos-  
se, sed dirumpi potius q̄ liberari siti. Cauendum autē  
est, ne ī locis mari proximis, saluginosis ue, uenemur  
uiperas, seu ad esum, ceu ad Theriaces antidoti prepa-  
rationem. Quum uerisimile sit, earum quæ in id genus  
locis capiuntur, carnes salsas existere. Siquidem cum  
cibis etiam animalium mutantur carnes. Porro quo-  
niam ex more dū artiscos Theriacos paramus, non tā-  
tū caput, sed earum etiam caudam abijcimus, subiit  
mihi frequenter rationabile fortassis esse, caput quidē  
totum abijci, ob uenenum quod ore continent; uerū  
à ratione alienum esse adimere & caudam. Theriacos  
autem ipsos artiscos sic preparamus. Purgatas illas in  
aqua cum anetho elixamus tandiu, donec à carne sepa-  
rari facilē possint spinæ. Mox pani purissimo, probē  
cocta in clibano, salisq; & fermenti quod sit satis ha-  
benti, ac breuiter reficcato, & ad læuorem trito necnō  
macerato cum ipso uiperarum decocto, carnem prius  
in mortario tufam miscemus. Postea uerō paruos ar-  
tiscos fingentes, atq; in ædibus calidis & siccis siccan-  
tes, in talibus eos tandem reponimus. Hos ergo ineun-  
te æstate conficimus, sicuti & salem ex deustis uiperis,  
quo potissimum tempore optima ipsarū est caro. Ut  
mur eis postea cōtulis denuō & cribratis, rursusq; ad  
læuorem redactis, adijcentes nonnihil & salis, ad sua-  
uitatem compositi; cuius etiam aliquid ipsi theriacæ  
inijcimus. Itaq; caro uiperę siccatur, ualenterq; digerit;  
excalfacit uerō mediocriter. Properat enim uis eius ad  
cutem, per eam uidelicet, quæ in corpore sunt recremē-  
ta exigens. Quibus igitur copia mali succi in corpore  
abundat, ijs pediculorum numerosa multitudo exoritur;  
& à cute ceu quædam squama abscedit, deciditq; cu-  
ticula extrema, ad quam utiq; solēt sisti crassi terrosiq;  
humores; à quibus sanē psoræ, lepræ, & elephātes na-



scuntur. Quòd autem ad animalia cetera pertinet, pro  
 portione qua in temperatura excedūt, & carnes quoq;  
 eorum differunt atq; exuperant. Proinde taliū anima-  
 lium carnes pperuò exhibere oportet, quale uolumus  
 corpus humanum reddere. Nec parua existit carniū  
 differentia, dum quasdam sale cōdimus. Nam interdū  
 animalis temperie humidissimi, caro salita, longè exic-  
 cātor euadit ea, quæ sicca natura existit. Verū inter  
 eas quæ salitæ non sunt, sicciior est assa, q̄p quæ in aqua  
 est elixa. At uerò caro mustelæ, arefacta, ualenter dige-  
 rit, desiccātq; : pinde morbo comitiali afflicto iuuat  
 epota. Salitorum etiam heluorum carnem ad leuorum  
 contritam, palos & spicula educere aiunt, impositam;  
 sicuti & Mutulorum carnem ulceribus à mordēte ca-  
 ne inflictis cōgruere. At cochlearū caro, prius in mor-  
 tario contusa, ac postea ad læuorem redacta, omnium  
 ualentissimè desiccāt partes superfluo humore graua-  
 tas: adeò ut conueniat hydericis. Ipse autem humor so-  
 lus, thuri, aut aloe, aut myrrhæ permistus, quo ad cera-  
 ti accipiat crassitiē, medicamen fit tenax, desiccātq; pu-  
 rulentos aurium humores. Sed & fronti impositum he-  
 ret, oculorum fluxiones exiccans. Quidam etiā ad pa-  
 los eximendos utuntur totis unā testis ad læuorem tri-  
 tis: alij ad sistendos menses. Carnes etiam solæ cum fa-  
 rinæ polline trite, contusorum uulnera glutinant. Ipsa  
 cochlearum humiditas pilos superciliorum præter na-  
 turam habentes glutinat.

Pinguedo & adeps.

**D**iffert à pinguedine adeps, q̄p crassior sit: ac pro-  
 pterea animātib; totam naturam terrosiorē ha-  
 bentibus, ut bobus & capris, adeps prouenit: humidio-  
 ribus autē, ut suis benè habitis, ipsa pinguedo. Pro-  
 inde pinguedo celeriter in ignem posita, colliquescit:  
 nec facillè ubi semel liquata fuerit: rursus cōcrescit, aut  
 cogitur. At adeps, nec facillè funditur, liquescit uē &

*desiccata carniū*

Carnes assæ  
 sunt sicciiores  
 elixis.  
 Mustelæ caro  
 epilepticis au-  
 xiliatur.

Cochlearū car-  
 nes, & succus.

Pinguedo.  
 Adeps.



Dysentericæ au-  
xiliatur capril-  
lus adeps.

Adipum disse-  
rentiæ.

Castratus ma-  
sculus eiusdem  
generis fœmi-  
næ semp assi-  
milatur.

fusus celerrimè congelatur. Porrò adeps suillus, alio-  
rum omnium est humidissimus, ob idq; actione sua ui-  
cinam oleo uim possidet: q̄q; oleo magis tum emol-  
liat, tum concoquat: quam obrè cataplasmati quæ ad  
phlegmonas accommodari solent, miscetur. Qui uerò  
mordicationes perpetiuntur, aut in recto intestino, aut  
in colo, ijs potius caprillum adipem q̄ suillum injci-  
mus: nō q̄ plus acrimonias obtundat, sed q̄ concreascit  
citius: suillus autem instar olei defluat. Quare capril-  
lus potius dysentericis & tinesmosis injicitur, quando  
morsum eorum mitigare est consilium. Quamq; ob te-  
nuitatem essentia nonnulla magis acrimonias retun-  
dunt, ubi in alto mordicatorum corporum, quod mole-  
stum est, hæserit. Hac ratione adeps anserinus magis  
obtundit quæ in alto corpore mordicant: præterea suil-  
lo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceo-  
rum & gallinarū adeps. Porrò calidior semper & sic-  
cior est masculorum animalium adeps: & horum ipso-  
rum exectorum minus tum calidus, tum siccus. Quip-  
pè mas castratus eiusdem semper generis fœminæ as-  
similatur. Omnis igitur pinguedinis facultas est hume-  
ctatoria & excafactoria humanorum corporum. Cæ-  
terum pinguedo suis, ut ad nos quidem, largius hume-  
ctare potest, sed nō æquè excafacere, sicuti neq; oleū:  
talem quippè caliditatem obtinet, qualis spectatur in  
nobis. Taurorū adeps suillo multo calidior & siccior  
est. Sic & adeps uitulinus taurino minus tum calidus  
est, tum siccus: & hœdorum q̄ caprarum. At caprarū  
minus q̄ hircorum. Rursus taurorum minus q̄ leonū.  
Nam horum adeps omnium propemodum adipe po-  
tentius digerit. Quippè & caliditate exuperat, & par-  
iū tenuitate. Quare nimis ulcera & phlegmonas irri-  
tat. Inueteratis tamen tumoribus, atq; scirrhi in morē  
duratis, tum neruorū curuaturis aptissimus est, in qui-  
bus sanè suillus uidetur minimè efficax. Taurinus au-



tem, quanto calidior sicciorq; suillo est, tãto superatur à leonino. Itaq; tanquã in medio consistens, meritò utriq; medicamentorum miscetur generi, & ei scilicet quod scirrhis medet, & ei quod phlegmonas ad supurationem perducit, cuiusmodi est tetrapharmacum, ex cera, resina, pice, & adipe constans. Verũ omnibus quibus caro est mollior, adeps suillus cõuenit magis. Duram autem & siccam habentibus, taurinus. At uerò adeps dũ inueterascit, seipso & calidior, & acrior, & tenuior efficitur: ac proinde ualētius siccans & digerens, id quod omnibus inueterascentibus accidit, nisi interim computrescant. Porrò urforum adipem alopecias curare uerè est proditum: quũ tamen ad eum affectum probatiora remedia habeamus.

## Myelos, Medulla.

**V**im habet corpora indurata & scirrhis emolliendi. Optimam semper sum expertus ceruinã: dein uitulinam. At hircorum et taurorum, tum acrior est, tũ siccior. Itaq; durities scirrhisas mollire nequit. Ex uitulina igitur et ceruina pessi componuntur ad emolledos uteros. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla parantur, uim emolliendi habentia. Accipitur autem nō solũ medulla ex ossibus, quæ sanè re uera est medulla: sed ex spina etiam: quæ tũ durior, tum siccior est altera. Vtranq; autem hyeme collectam, in sicca editaq; domo cum folijs lauri siccis repono: ne uidelicet computrescat. At si quando ambiente existẽte calido, austrinoq;, medullas aut adipẽ uelis reponere, uteris ad id cubiculo q̃ maximè fieri poterit temperato, quodq; ad aquilonem obuersum, apertas habeat paruas fenestras, ut perpetuò flatus in spirantes excipiat.

## Caput mænidum.

\* **M**ænidum sale inueteratarũ capitibus ustis ad sedis fissuras utebatur quidã: et ad columellam

Myelos.  
Medulla.

Medullas reponendi ratio.

Caput mænidum.



diu indurata. Videtur ergo uis illarum esse desiccatoria, non admodum acris. \* Nam ut acrimonia adustarum nonnullis inest, sic omnibus uis exiccandi.

Caput leporinum.

Caput leporis

**A**lius capite leporis usto utebatur ad alopecias cum adipe ursino.

Caput saurarum.

Caput sauræ

**S**Auræ caput contritum quidam palos & spicula extrahere prodiderunt memoriæ: tum myrmecias, acrochordonas, & clauos eximere.

Cerebrum leporis.

Cerebrum leporis.

**I**Dattritum & esum, utile dicimus esse pueris dentibus. Quidam etiā aduersus tremores utiliter edid cerebrum hoc prodidere.

Cornua ceruina & caprina, usta.

Cornua ceruina & caprina usta.

**D**entes candidos reddunt, fluidasq; gingiuas contrahunt. Quod si ceruinum ab uisione lauatur, dysenteriam, & sanguinis excreationem, præterea coeliacos affectus sanat. Aurigini etiam dicunt id esse utile. Ex quo quidem duo exhiberi cochlearia ad omnia ista præcipiunt. Quidam etiam ipsum miscuerunt collyrijs desiccantibus oculorum fluxiones.

Pulmo agninus & porcinus.

Pulmo agninus, porcinus, vulpinusq.

**I**ntertrigines à calceamentis curare credit. At uulpinus si bibatur siccatus, asthmaticos iuuat.

Iecur canis rabidi.

Iecur canis rabidi.

**S**I assum edatur, remediū existere ijs qui ab ipso rabiente cane fuerint emorfi, quibusdā proditum est.

Iecur caprinum.

Iecur caprinū.

**Q**uidam ipsum assantes, sanientq; excipientes fluentem, ea utuntur ad nyctalopas. Vaporem autem eius, dum elixatur, oculis apertis excipiendum præcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eosdem affectus accommodari aiunt, & eos qui comitiali morbo sunt obnoxij, coarguere. Idem potest hircinum hepar,



Iecur lacertæ.

**E** Rosis impositū dentibus, eos dolore liberare nō nulli scriptis mandarunt. Iecur lacertæ.

Venter mergi.

**Q** Vod de hoc & de interna tunica uentriculi galinarum proditum est, id uanam esse promissio nem comperimus. Venter mergi.

Castorium.

**T** Esticulos castoris uocant castorium, medicamen & celebre & multi usus. Euidenter siquidem cal facit. Quum autem calfacientia omnia, quæ consisten tia sunt sicca, ubi contactæ substantiæ quippiam dige runt, continuò etiam illa desiccant: manifestum utiq; est, castorium etiam desiccare haud obscure: id quod illi cum multis est medicamenti cōmune. Quia uerò impensè subtilium est partium, ob id plus ualet q̃ alia, quæ similiter ut ipsum tum calfaciunt, tum siccant. Nā quæ tenuium sunt partium medicamenta, ijs quæ sunt crassarum, efficaciora sunt, etiam si parem sortita sint facultatem: nimirum quia magis penetrant. In conuul sione igitur à plenitudine, quæ in neruis est, orta, & bi bendum castorium exhibe, et cuti foris etiam impone. Vbi uerò ex siccitate nimia conuulsio obuenerit, scito hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem modum ijs qui præ plenitudine aut tremunt, aut singul tum patiuntur, est utilissimum: aduersissimum uerò ijs, quibus id ab inanitione, aut acrium humorum morsu accidit. Vbi itaq; excalfactione, aut resiccatione, aut utraq; simul actione est opus, maximam in usu casto ri experiere cōmoditatem: nec ullam parti alicui noxā afferet, potissimū si homo non febriat, aut febrim non admodum calidam perpetiatur, sed tepidā, quales ma ximè in cataphoris & lethargis accidit. Ac multis sanè castoriū unā cum pipere albo, utrūq; mensura cochlea ri, ex melicrato propinauimus: nec quisq; ullam per-

Castorii, vires

Lethargicorū  
febres esse te  
pidas.



Menses educē  
di ratio.

cepit noxam. Sed & retentis mensibus, ubi per uenam  
que in talo est, modicè euacuassent sanguinem, oblato  
castorio unà cum pulegio, aut calamintha, semper me-  
dicamen hoc sum expertus, purgationē ciere, citra ullā  
assumentis læsionem. Præterea locos morantes eijcit:  
eaq; omnia ex melicrato potū efficit. At quibus ab oc-  
casionē frigida ita uenter flatu distenditur, ut ægrè cu-  
rationem admittat, eos ex oxycrato potum castorium  
adiuuat. Quæ porro iuuat in corpus intrò sumptum,  
ijs prodest quoq; cuti impositum, cum sicyonio, aut ue-  
teri oleo. Quæ uerò ampliori calore indigent, ijs etiam  
per se infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius  
prunis impositi, inspiratione hauriat, illos p̄cipuè affe-  
ctus, qui in pulmone consistunt, aut capite. Attamen le-  
thargicos & cataphoricos affectus, qui quidē habent  
adiunctam febrim, p̄stat nō dictorum oleorum aliquo  
macerātes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloq;  
imponere.

#### Lumbi scincorum.

Scincorū lūbi.  
Semen q̄ pro-  
moueant, & ar-  
ceant.

**Q**uæ circa renes scincorum sunt, bibuntur, tanq̄  
pudenda intendere ualeant. Cōtrarium autem  
moliri uidetur semen lactucæ potum ex aqua.

#### Vngues caprarum & asinorum.

Vngues capitil-  
li, asininiq;.

**Q**uidam ungues caprarum deustos, moxq; ace-  
to perfusos, alopecijis illinunt. Itaq; fuerit & ta-  
lis cinis facultatis exiccatoriæ. Sunt qui combustos asi-  
norum ungues comitalem morbum curare dicant, si  
scilicet assiduò bibantur. Si uerò macerati oleo appli-  
centur, digerere chœradas. Sed & ipsum cinerē, si sic-  
cus inspersus fuerit, sanare perniones.

#### Ossa combusta.

Ossa cōbusta.

**A**dmodum digerentem, exiccantemq; uim obti-  
nent: maximeq; (ut quidam ferunt) humana. No-  
ui siquidem nostratium quosdam \* combusta ossa hu-  
mana potui exhibuisse, ac multorum sic epilepsiam



& arthrim curasse.

Seneſta ſerpentis.

**H**anc ſcripſere quidam in aceto bullitam, dentiū Exuuiū ſer-  
mederi doloribus. pentis.

Pellis ouina recens detracta.

**C**ircumpoſita uerberatis, eos die ac nocte una p Pellis ouilla.  
ſanat. Concoquit enim & diſcutit ſub cute con-  
cretum ſanguinem.

Equorum lichenes.

**E**as aceto tritas comitiales curare ſcriptum qui Equorum li-  
busdam eſt. Alij uerò & ad cuiuſuis ferg morſum chenes.  
adhiberi conſulunt.

Tela aranei.

**H**anc ſcribunt nonnulli à phlegmone tueri ſum. Tela aranei.  
mæ cutis ulcera.

Coria uetera uſta.

**E**orum cinis exiccatorius exiſtit. Quare ulcera ex Coria vetera  
attritione, & ambuſta, et intertrigines, quæ in foe uſta.  
minibus ſunt perſanat.

Oſtreia.

**O**ſtreia quidam nuncupât teſtacea omnia: oſtreū Oſtreia.  
autem, unam tantum teſtaceorum ſpeciem.

Buccinæ & purpuræ.

**B**uccinarum & purpurarum teſta uſta, redacta q; Buccinæ.  
in tenuiſſimum pollinem (quod ſit tibi commune Purpuræ  
præceptum in teſtaceis & lapidoſis omnibus) deſiccâ  
di uim obtinet, ac proinde ulceribus malignis opitula  
tur: id quod etiam cômune eſt omnium quæ citra inſi  
gnem morſum uehemêter deſiccant: quippè quū alio  
qui fluxionum cauſa exiſtant. Hoc etiam eſt omnium  
id genus commune, quod ex aceto, aut oxycrato,  
aut œnomelite, aut oxymelite, idonea ſint ulceribus  
putreſcentibus.

Oſtreia.

**O**ſtreorū teſta uſta ſimilis eſt facultatis buccinarū Oſtreia.



testis, tametsi minus crasse. Etenim omnia id genus co-  
gendi quandam in se facultatē obtinent, per quam cō-  
densata eorū essentia, dura terrosa q̄; sunt reddita. Quā  
ubi per uestionem posuerint, digerentem facultatē asci-  
scūt. \* Quod si ea, ubi uista fuerint, laueris, quicquid ha-  
bebant igneum, in aqua ponūt. Quare aqua sanē ipsa  
excalfaciens cum tenuitate redditur, adeò ut putrefa-  
ciat interdum: reliquū uerò terrosum, morsus expers  
efficitur: maxime q̄; implendis & cicatrice claudendis  
humidis ulceribus auxiliatur. Cæterū ulceribus ca-  
uis et fistulosis, fluxioni q̄; obnoxijis ulceribus, ex suillo  
adipe inueterato foris circūpono ipsum: in sinum autē  
aliquid eorum quæ talia cauere implent, impono, qua-  
le existit diaphanes ustum. Quin & dentes splendido-  
res testarum cinis efficit, non tantū extergendi poten-  
tia, sed & asperitate substantiæ, ueluti & pumex, & te-  
sta clibani. Verū in usu eiusmodi nō est necesse quæ  
sic uista sunt, admodum læuigare, sicuti dum inspergū-  
tur ulceribus. Porro excrementiam mediocriter exte-  
rūt, comprimunt q̄; Ad hæc, uista omnia id genus cum  
sale, dentium sinegma efficacius reddūt, ut non modò  
laxitatē molliem q̄; gingiuarum desiccet, uerū etiam  
ulcera putrescentia adiuuet.

Sepiæ testa.

Sepiæ testa.

**S**epiarum testa ad modum laxa est, non ut ostreorū  
lapidosa. Itaq; absterasio illi cum alijs testis cōmu-  
nis est, ueluti & desiccatio: cæterū partium tenuitas  
eximia illi præ cæteris inest. Quocirca uista ea utimur  
ad uutiligines, ephelin, lentes, & psoras. Quin & fossilis  
fali mista, in oculis existentes ungues, & sycofis uoca-  
tas eliquat. At anteq̄ uratur, dentibus splendore con-  
ciliat, & ulcera desiccat.

Opercula purpurarum.

Purpurarum  
opercula.

**E**A quidam prodiderunt memoriæ turgidos lienes  
sanare; suffitu eas quæ uteri suffocatione periclitantur,  
iuuare;



iuuare; præterea retentos eijcere locos.

Lana succida.

**I** Donec excipit irrigationes, quæ adhibentur contu-  
sis, aut quouis modo percussis, ut quæ utilitatē ex  
illis proficiscentem promoueat: idq; propter æsypon.  
Lota uerò, apta est humoribus qui irrigantur, excipien-  
dis. Porro uista uim habet acrem, pariter et calidā, unā  
cum partium tenuitate. Itaq; molles præhumidasq; ul-  
cerum carnes celerrimè eliquat. Inditur & in medica-  
men desiccatorium. Vrito eam tanq̃ alia plurima, ol-  
iam implens nouam, quam tegat operculum multis fo-  
raminibus pertusum.

Lanæ succidæ  
vſus.

Osypen.  
Lana vſita.

Lanam vředi  
ratio.

Pili uſti.

**S** Imiliter uſtæ lanæ excaſfaciendi exiccandiq; poſ-  
ſident facultatem.

Pili vřti.

Ouorum facultates.

**O** Va partes animalium non sunt, sed proportionē  
respondent ijs quæ agnascuntur. Sunt autem fa-  
cta ad propagationē generis, perpetuitatemq;: ac sunt  
utilia, ceu nutrimenta. Porro ouorum album & tenue  
illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est  
medicamentorum mininè mordicantium. At unā pra-  
uitatem solūm patiuntur oua, quam scilicet affert uetu-  
stas: eamq; facillimè effugias, si utaris recentibus. Est  
autem ouum symmetro temperie frigidius. Utendum  
autem est oui albumine, non tantūm ad oculos, sed ad  
alia omnia, quæ medicamenta requirunt suauiſſima:  
ut sunt uniuersa sedis & pudendorū ulcera contuma-  
cia. Miscetur quoq; idoneè medicamētis profluuium  
sanguinis ex cerebri inuolucris reprimētibus, quæ ni-  
mirum citra morsum illinuntur, astringuntq;. Cæterū  
& ipse uitellus assimilis est naturæ, ac proinde miscet  
ceratis morsus expertibus. Verūm quanto plus defic-  
cant quæ sunt assa oua, tanto minorem mitigandi uim  
obtinent. Miscetur & cataplasmatibus phlegmonem ex-

Ouorum facul-  
tates.

Oui tēperies.

Albumen oui  
quibus affecti-  
bus conferat.

Vitellus oui.

Ouo toto ad  
quæ uiatur.

Tomus IIII.

Pppp



Ouū in aceto  
percoctū, esum  
q̄, dysenteriae  
auxiliatur.

Ambustis ouū  
opiulatur im-  
positum.

Anacollemata

Ouum sorbile  
quibus conue-  
niat.

Echinus.  
Erinaceus.

Cochleæ.  
Limaces.

Dysenterig  
optimum me-  
dicamen.

tinguentibus. Iam uerò crudo toto ouo, utimur admi-  
sto rosaceo, ad palpebrarum aurium, māmaram, alia-  
rumq; omnium partium phlegmonas. Adhæc, in ace-  
to coctum ouum si edatur, uentris fluxiones desiccet.  
Quod si etiam eorum quippiam, quæ ad dysenteriam  
aut celiacum affectum cōueniunt, adiunxeris, atq; in  
igne modico, fumiq; experte frixeris, edēdumq; ita p̄-  
beas, nōminimè sanè ita laborātes adiuueris. Ad am-  
busta etiam ouum est, protinus impositum, utile, siue  
quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana exci-  
piat: siue etiam cum uitello confundens, comiscensq;  
applicet. Mediocriter enī refrigerat, & citra morsum  
desiccet. Tale quū sit, & ad anacollemata uocata, quæ  
fronti imponuntur, eo utimur, & pilos palpebrarū ag-  
glutinamus: nimirum admisto idoneorum quopiam,  
cuiusmodi est thus, potissimum pingue, ac non inuete-  
ratum & ficcum. Ouum igitur, medicamentis quæ hu-  
miditates desiccāt, aut elixum, aut assum, aut frictum,  
tanquam materia miscetur: ijs uerò quæ lentorem hu-  
morum in pectore pulmoneq; incidunt, sorbile: id qđ  
in aqua eo usq; elixari debet, donec incalescat. Simili  
modo sumptum gutturis, stomachi, uentris, intestino-  
rum, atq; uesicæ medetur asperitatibus.

Echinus, hoc est, erinaceus combustus.

**E**Rinacei utriusq; tum marini, tū terrestris corpus  
ustum, cinerem efficit facultatis tum extergentis,  
tum digerentis, tum extrahentis.

Cochleæ: siue limaces.

**C**Ochleæ si totæ cum testis urantur, admista galla  
omphacitide, simulq; pipere albo, mirè profunt  
dysentericis, in quibus ulcera computrescere non cœ-  
perunt. Conuenit autem ut piperis sit pars una: gallæ  
uerò duæ: quatuor cochlearum. Hæc ubi ad unguem  
læuigaueris, cibus inspergito, bibendumq; aut ex aqua  
aut ex uino albo & austero, præbeto. Cæterum absq;



gallæ mistione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nonnihil ex ustione calidum. Porro cochleg quæ ustionem non sunt expertæ, si unâ cum testis tritæ imponantur, & toti uentri aqua inter cutem laborantium, & in articularum tumoribus, ægrè quidem diuelli poterunt, cæterum impensè deficiant: uel si uiscidus crassusq; humor in alto contineat. Et sanè inhærere sinere oportet, donec sponte decidât. Idem faciendum in tumoribus ex ictu natis, difficile solubilibus.

Carcini, hoc est cancri, usti.

**F**luuiatilium cancrorum cinis, q̃p̃ similiter prædictis exiccatorius est: substantiæ tamen proprietate mirabilis est eius in ijs q̃ à rabiente cane sunt morfi, effectus: isq; tum solius, tum cū gentiana, & thure multo præstantior. At thuris partem esse unam oportet: quinq; gentianæ: cancrorum decem. Ex quo quidem medicamine Æschrion Empiricus, conciuus atq; preceptor meus, ijs qui à rabido cane emorfi fuerant, quotidie diebus quadraginta mensuram cochlearis magni cum aqua bibendam dabat. At si non protinus ab initio, uerū aliquot post dies, curâ cepisset demorfi, tūc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uerò uulnus applicabat emplastrū, q̃d ex pice brutia, opopanace, acetoq; cōficitur: habēs picis libram unā: aceti acerrimi sextarium unum Italicum: opopanacis uerò uncias tres. Hæc itaq; monita uolui de cancris, quum nullus eorum qui usi illo medicamento fuerunt, extinctus sit.

Chelidones, siue hirundines, ustæ.

**S**ed & hirundinum cinere permisto melli permulti utuntur, cōtra omnes affectus gutturis. Utuntur et ad acuendū uisum nonnulli hoc cinere. At aliq̃ cæcæ factas drachmæ pondere bibendas exhibent.

**C**icadis etiam nonnulli utuntur ad colicos affectus,

Tettiges: hoc est cicadæ.

Icadis etiam nonnulli utuntur ad colicos affectus,

Pppp ij

Carcini.

Cancro usti.

Galenī præceptor fuit Æschrion Empiricus.

Morfos a rabido cane curandi ratio.

Chelidones.

Hirundines ustæ.

Tettiges.  
Cicadæ.



cum paribus numero piperis granis. Alij assas edēdas offerunt, quibus affecta uesica est.

Corydos, Galerita.

Corydos.  
Galerita.  
Corydalis.

**G**alerita, auis illa pusilla, quæ in capite ueluti gale-  
rum ex pilis habet conflatum, in iure elixa colicos  
adiuuat, ueluti & ipsa herba corydalis appellata. Verū  
assiduè eam simul cum iure esse est necesse.

Alectorides, Gallinæ.

Alectorides.  
Gallinæ.  
Gallorum ius.

**G**allinarum ius simplex retinendi uim possidet, uti  
gallorum subducendi. Concoquendi autem sunt  
cum sale diutissimè.

Gale, hoc est mustela.

Gale.  
Mustela.

**E**i ius cinerem cum aceto illitum podagricos iuuare  
est proditum: ipsam uerò arefactam, prodesse co-  
mit'alibus morbis.

Ranæ ustæ.

Ranæ ustæ.

**R**anarum inspersum cinerem sanguinis eruptio-  
ni mederi referunt; cum liquida autem pice sana-  
re alopecias.

Hippocampus.

Hippocampus

**H**uius etiam cinerē alopecijs prodesse est proditū:  
facultatisq; exiccantis & extenuantis existere.

Tellinæ salæ.

Tellinæ salæ.

**S**alæ tellinas ustas, adeò urētem efficere cinerem  
aiunt, ut is cum cedria euulsos radicitus ex palpe-  
bris pilos, instillatus in locum, eos renasci prohibeat.

Intestina terræ, siue lumbrici.

Intestina terræ.  
Lumbrici.

**C**ontrita, neruisq; diuulsis imposita, mirum in mo-  
dum ea prodesse est proditum. Præterea cum ui-  
no pota, medicamen esse mouendæ urinæ idoneum.

Cimices.

Cimices.

**E**as cum aceto bibitas, eijcere hircudines aiūt: quas  
nos semper esu alliorum eiecimus.

Cantharides.

Cantharidarū  
facultas.

**C**um idoneis emplastris impositæ, adeò, scabros



ungues educūt, ut toti cadant. Præceptorum meorum quidam, earum nonnihil solet diureticis medicamētis inijcere. At nonnulli solas alas & pedes inijciunt: alij contra. Cæterum nos totas indimus. Porro aptiores sunt ex cantharides, quæ inuēte in frumēto, lutea trāsuerſim in alis cingula obtinent.

Cantharidas eligendi ratio.

Buprestis.

**A** Nimal est cantharidi tum specie, tum uiribus siſe.

Buprestis.

**E** Pityocampe, Eruca picearum,

Eruca picearum.

Iusdem sunt facultatis.

Salamandra.

Salamandra.

**S** Alamandræ cinerem quidā septicis, lepricis, pſoricisq; miscent facultatibus.

Narce, Torpedo marina.

Narce.

**S** I applicetur uiua cui caput dolet, fieri potest ut dolore liberet, siſt alij quæ sensum obſtupefaciūt.

Torpedo marina.

Draco marinus, & Trigle, & alia id genus.

Draco marinus.  
Trigla.

**V** tuas etiamnum hæce animantes apertas, & protinus partibus affectis appositæ prodesse traditū est. Nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum: similiter & Triglā in draconis: mures domesticos in ictum scorpij, ueluti & sauram: mygalem in suum ipsius & sauram chalcidicā, quam ex uino bibendam præbent, tanquā suum ipsius morsum sanet. Porro scorpium suum ipsius morsum curare, si tritus imponatur, necnon si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs qui à uipera sunt emorſi: ascalabotā uerò ijs qui à scorpio. Referunt etiam et in Ægypti regionibus arefactum assiracum exhiberi ijs qui à scorpio percussi sunt: & uocatum cybiū utiliter uulneri à cane inflicto adhiberi. Cæterum in oleo frictis totis animalibus, ipso oleo utebantur nostratium Medicorum quidam: sed & superiorum nonnulli ad pilorum effluuiū: nempe pityocampis, urticis marinis, lepore marino, & scolopendro marino: ad aurium uerò dolorem, siſt.

Mus.

Saura.

Mygale.

Scorpius.

Ascalabota.

Assiracus.

Cybius.

Pityocampe.

Urtica marina.

Lepus marinus.

Pppp iij



Silphi.  
Onisci.

phis in oleo coctis, & ijs quos Græci oniscos, Latini  
multipedes uocant.

Vulpes.  
Hyæna.

Vulpes, & hyæna.

Oleū, vulpinū  
summe auxi-  
liari morbis ar-  
ticularibus.

**O**leum in quo elixa uulpes est, non est potentio-  
ris in digerendo facultatis, q̄ in quo hyæna: quæ  
si similiter in oleo elixetur, oleum ipsum lōgè potentis-  
simæ facultatis in digerendo redditur. Talia autē me-  
dicamenta uim habent ea quæ in alto corpore delite-  
scunt, ad extimam cutē trahendī, atq; eo nomine quan-  
doq; dolores sedandi. Quare qui utuntur uulpibus, &  
ipsi oleum digestorium efficiunt, atq; inde impletis eo  
alueolis, totos arthriticos in eos demittunt, multo tem-  
pore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, ut non tantū  
qui circa articulos sunt tumores uacuentur, sed etiam  
uniuersum corpus. Vnde certè magnum consequitur  
cōmodum, quum nihil p̄terea amplius in affectas par-  
tes sit defluxurum, nimirum euacuato iam corpore.

Adarcion.

Adarcion.

**E**ssentia quidem sua ueluti spuma est aque salse cō-  
creta, id q; circa arūdines & farragines. Est autem  
acerrimum, simulq; calidissimum pharmacum: proin-  
de & per se inutile. Verū cōmisceri solet ijs que uim  
eius retundunt: sicq; fit multo utilissimum in ijs affecti-  
bus, qui exalferi postulant, foris impositum. Nam id  
intra corpus sumi impossibile est.

Alcyonia.

Alcioniorū fa-  
cultates et dif-  
ferentia.

**A**lcyonia omnia detergunt, ac digerunt, qualitātē  
habentia acrem & calidā. Est autem eorum unū  
densum & graue, odoris prauī. Olet enim pisces putri-  
dos, spongiæ in specie simile. Alterum uerò figura lon-  
giuscula, leue, & raram, odorem habens similem phy-  
cns. Aliud tertium uermi simile specie existit: colore pur-  
pureo, consistentia molli: uocāt id Milesium. Post que  
quartum secundo quidem iam posito similiter & leue  
& raram, uerū lanis succidis simile. Deniq; et quin-



tum extima superficie læui, cæterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre. Quod sanè omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut pilos deurere possit. Itaque quum duo prima lichenas, alphos, psoras, leprasque adiuuent, præterea cutem splendidiorem efficiant, idem præstare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim proinde ut illa cutem duntaxat summam extergit, sed etiam ex coriat, ita ut ulcera inducat. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium tenuissimum est. Quare ustum alopecias curat illitum cum uino, colore quidem fuluo, tenui tamè essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei, uires obtinet, uerum haud parum imbecilliores.

Sal.

**S**al eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: uerum hoc differunt, quod salis est terra effossa substantia magis compacta sit, ac proinde in eo maior partium crassities, et astringendi potentia. Marinus itaque affusa aqua liquefcit protinus, id quod non accidit fossilis. Eiusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam saluginosis nascitur: æstate uidelicet aquis ex his æstu absumptis: cuiusmodi est Tragalius, non procul à Sminthio. Igitur quum qualitas salsa digerat simul & contrahat contactam ab ipsa substantiam, aphronitrum in hoc differt, quod in ipso unum saporem exuperantem sit uidere, quem uocant amarum, uim habentem digerendi: haud item contrahendi, uti sal. Nam hic, quicquid in corporibus humidum est, id totum absumit: et quod reliquum est substantiæ solidæ, astrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua carnes seruat, à putredineque tuetur. Quippe quæ putrescunt, excrementitium humorem continent, substantiamque tum dissolutam, tum minimè compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum uest supflua humiditas, ceu melli optimo, & substantia solida & compacta est, ut lapidi-

Salis differentiæ

Salis qualitatis facultas, Aphronitrum.

Salis facultas.

Putrescentium substantia.

Putrescere quæ nullo modo possunt.

Pppp iij



bus, ea ut putrescant est impossibile. Quare in his salis non probatur usus: sed in illis tantum, in quibus suspecta est putredo.

Sal ustus.

Sal vltus.

**D**igerit quidem potentius, quam ustionis expers, quanto scilicet subtilius ipsius corpus, accepta ab igne facultate, redditur.

Litrum, Nitrum.

Litrum.

Nitrum.

**O**stensum est hoc medicamen in medio salis & aphronitri vires habere.

Halos anthos, Flos salis.

Halos anthos,

Salis flos.

**L**iquidum est medicamen, tenuiusque quam sal ustus: præterea qualitatis acris, facultatisque admodum digerentis.

Halos achne, Spuma salis

Halos achne.

Spuma salis.

**S**pumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris naturæ, quam ipse sal. Quare & extenuare, & digerere quam ille multo plus potest. Verum quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit.

Asphalton, Bitumen.

Asphalton.

Bitumen.

**V**Num & ipsum est ex his que in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam quæ non est marinæ dissimilis, ut in Apollonia Epiri, ubi reperitur hoc medicamen in aquis sponte nascētibz, ueluti spuma quædam innatans. Quo sanè tempore est molle: postea uerò reficcatur, pice sicca durius efficitur.

Bitumen proueniens in mari mortuo.

Bitumen quod  
in mari mortuo  
nascitur.

**O**ptimum uerò bitumen in mari quod mortuum uocāt, prouenit. Cuius medicaminis uis est tum reficcatoria, tum excalectorum in secundo excessu. Merito itaque utuntur eo ad cruentorum uulnerum glutinationem, & ad alia omnia quæ exiccari debent, ceu modica excafectione.

Spongos, Spongia.

Spongia vlt.

**S**pongia usta, acris est & digerentis potentiæ. Vtebatur ea præceptorum meorum quidam, ad sangui-



nis eruptiones, quæ manuali opera indigent. Por-  
rò admovebat eam partibus sanguine profluentibus  
etiãnum ardentem, ut & crusta parti induceret, & ip-  
sum spongię corpus, ceu operculũ adhæreret. At uerò  
spōgia noua, nō sicut lana aut lanimentũ, materia dū-  
taxat est, q̃ humores irrigãdos excipiat, sed etiam ma-  
nifestè desiccat. Quare uulnera glutinat, si aqua, aut  
oxycrato, aut uino admoveat imbuta, à qua sanè, quæ  
antiqua est, longo spatio relinquatur.

Spongiã ardē-  
tem auxiliari  
eruptionibus  
sanguinis.

Garus.

**E** Acultatem habet admodum calidam atq; siccam.  
Proinde eo quidam ad ulcera usi sunt putrescētia:  
tum dýsentericis ischiadicisq; iniiciunt.

Garus


Halme, Salsugo.

**S** Imiliter garo ad putredines accōmodatur: & ad is-  
chidas & dysenterias iniicit. Etenim acrimonia  
sua humores coxam infestãtes attrahit: ob idq; per in-  
testina euacuat: putrescentia uerò ulcera in dysenteria  
colluit, & siccat. Maximè tamen salsugine salsorũ silu-  
rorum & mænidum ad talia Medici utuntur.

Halme.  
Salsugo.

## G A L E N I L I B E R

### D E S V B S T I T V T I S .



**S** V B S T I T V T A medicamenta  
dicuntur, quæ in alterius locum sub-  
stitui possunt: quorum sanè cognitio,  
plurimum ad medendi usum confert.  
Plerunq; siquidem destituti Medici  
ijs quæ ad morbum exterminandum  
maximè expedire arbitrantur, neq; expendentes ea  
quæ similem ferè uim obtinentia, uice illorum assumi  
possunt: ægris opitulari nesciunt. Quod ne tibi aliquan-  
do contingat, en subdimus omnia pharmaca substitu-  
ta, ordine literarum disposita.



## Pro

## Substitues

A Abr otono  
 Absinthio  
 Acacia  
 Acoro  
 Ærugine  
 Amianto  
 Agallocho  
 Agarico

Alga  
 Aloe Indica

Alumine  
 Ammi  
 Ammoniaco thym,  
 Ammoniaco sale  
 Amomo  
 Amylo  
 Amygd. amar.  
 Anchusa  
 Aniso  
 Arace  
 Aristoloch. rot.  
 Argemone,  
 Armenio lapide  
 Asbesto  
 Aspalatho  
 Asphodelo  
 Asaro  
 Asio lapide

Auripingmento

Origanum.  
 Abrotonum.  
 Succum lentisci.  
 Radicem asari.  
 Atramentum sutorium.  
 Aphronitrum.  
 Calamum odoratum.  
 Euphorbium, aut epithy-  
 mum.  
 Anchusam.  
 Aloes uiridis folia, folium,  
 uel glaucium, uel simum  
 ibis, uel Lycium, uel cē-  
 taurium.  
 Salem fossilem.  
 Anisum.  
 Propolim.  
 Cappadocum salem.  
 Acorum.  
 Gyrin siccam.  
 Absynthium.  
 Hyacinthum.  
 Daucum.  
 Sefamum.  
 Aristoloch. long.  
 Sifymbrium.  
 Atramentum Indicum.  
 Adarcem.  
 Ericis semen, aut uiticis.  
 Succum betæ.  
 Zingiber.  
 Gagatem, aut salem Am-  
 mon. tostum.  
 Sandaracham.



# S V B S T I T V T I S

235

Pro

Sustitues

Balauſtio	B	Malicorium
Bdellio		Sphagnum odoratum.
Bitumine		Picem Brutiam hum.
Brutia pice		Picem in aceto feruefactā.
Buccina		Ostreum.
Bupreſti		Laſer, aut hirudinem.
Butyro		Lac bubulum coactum.
Cadmia	C	Leucographin Ægyphiā.
Calamo odorato		Sphagnum.
Canchri		Baccas lauri.
Cantharidibus		Phalangia.
Capparis radice		Ericæ radicē aut myricę.
Cardamomo		Fructum myrti.
Cafia		Cinnamomi dimidium.
Caſtorio		Silphium.
Cedria		Ladanum.
Ceraunio		Leucographin.
Ceruina adipe		Anſeris adipem.
Cera		Fabam freſam cum propo li coctam & tritam.
Cerui cornu,		Caprinum.
Ceruſſa		Scoriam plumbi.
Chalbane		Sagapenum.
Chamaedry		Lapathi radicem.
Cicuta		Semen coriandri.
Cinerula Cypria		Cienerem ſol. oliuæ.
Cinnabari		Rofaceos paſtillos.
Cinnammomo		Caffiæ duplum.
Clinopodio		Heliotropium.
Cnico		Viticiſ ſemen.
Colocynthide		Ricini ſemen.
Colophonia pice		Apochyma.
Corallio		Moly, aut ſymphytum.



Costo	Cedri fructum.
Cotiledone	Anagallin.
Crinanthemo	Aphrodisiam.
Croco	Crocomagma.
Crocomagmate	Agallochum Indicam.
Crocodili adipem	Canis marini adipem.
Cumino	Brassicæ semen.
Cynosbato	Solani uesticariæ semen.
Cypero	Iuniperum magnam.
Cyphi	Caricam ustam.
<b>D</b> Damasonio	Eryngium.
Dauci semine	Sij semen
Dictamno	Saluiam.
Diphryge	Phrygium lapidem.
Dorycnio	Alterci semen.
Dracontio	Aron.
<b>E</b> Ebena	Loti arb. lignum.
Ebisci radice,	Folia mori.
Elaterij succo	Eiusdem herb. succum.
Elleboro nigro	Papyri radicem.
Enneaphyllo	Poramogitonem
Epithymo	Colocynthidis semen.
Ericis fructu	Gallam immaturam.
Erini folijs	Stercus ibis.
Erucae semine	Erysimi semen.
Erucis pini	Vespas cum cedria.
Eryfimo	Struchij succum.
Euphorbio	Stercus columbe agrestis.
Eupatorio	Chamæpityn.
<b>F</b> Felle camelli	Fel Ascalaboti.
Felle mustelæ	Fel cameli.



# S V B S T I T V T I S 237

Pro

Substitues

Felle hyænæ	Fel perdicis.
Felle uiperæ	Fel ichneumonis.
Flore æris	Squammam æris.

Galla	G	Palæstræ sordes.
Gentiana		Radicem apij odorati.
Glycyrrhizæ succo		Mori succum.

Hederæ succo	H	Persex succum.
Hedychroo		Amaricinum.
Hyacintho		Flos Isatidis.
Hyenæ adipe		Vulpis adipem.
Hyoſcyamo		Solani ueſicariæ ſemen.
Hippuri		Aiugam.
Hyperico		Anethi ſemen.
Hypociſthide		Acaciam.
Hyſſopo		Thymum.

Iri illyrica	I	Helenium odoratum.
Iunco odorato		Cardamomum.
Iunco paluſtri		Polygoni radicem.

Lapathi radice	L	Pyrethri radicem.
Lapide Phrygio		Lapidem argyritem.
Lapide Aſio		Gagatem lapidem.
Lapide pyrite		Lapidem pyrobolon.
Lauri baccis		Serpillum aridum.
Lathyri		Granum Cnidium.
Lentiſco		Terebinthum.
Lepidio		Rubiam.
Lepidij radice		Folia capparis.
Lepore marino		Leporem fluuialem.
Lini ſemine		Fabulum.
Loti ſemine		Betæ ſemen.



Pro

Substitues

Lupi adipe

Vrsi adipem.

Ligustico

Pastinacæ semen.

Lyfimachio

Spinæ Aegyptiæ semen.

M

Magnete

Hematitem lapidem.

Malabathro

Nardum Indicam.

Malo cydonio

Melilotum.

Malua

Fœnumgræcum.

Mandragora

Dorycnium

Manna

Thuris corticem.

Mastiche

Lentisci caulem.

Medulla cerui

Vituli medullam.

Meliloto

Lotum herbam.

Melle

Sapam.

Melle Attico crudo

Mel despumatum.

Mæo

Myrobalanum.

Myrsinite

Succum mori.

Molybdæna

Lithargyron.

Mori succo

Rubi folia.

Myrobalano

Glaucium.

Myrrha Trogloditide

Calamum odoratum.

Myrti oleo

Mori succum.

Myfi Cyprio

Ochram Cypriam.

Myfi tosto

Diphrygem.

Nardo Syriaca

Iuncum odoratum.

N

Napi

Rapæ semen.

Nepita

Agrestem mentham.

Nucleis pineis

Cucumeris semen.

Nuce pinea

Gallam.

O

Ochra

Myfi Cyprium.

Ocymo

Sisymbrium.

Ocymoide

Mentam agrestem.

Oenanthes succo

Vitigineum succum.



## Pro

## Substitues

Oesypo  
 Oleo Cicino  
 Oleo ueteri  
 Oliuæ lachryma  
 Omphace,  
 Opobalsamo  
 Opopanace  
 Oryza  
 Orminio  
 Ormithogali.

Vituli medullam.  
 Laurinum aut uetus oleū.  
 Feruefactum duplum.  
 Hypocisthidis succum.  
 Gallam immaturam.  
 Guttam myrrhæ.  
 Lac sycamini.  
 Farinam hordei.  
 Lini semen.  
 Anthyllin.

Papaueris succo  
 Phu  
 Pipere  
 Pipere albo  
 Polij semine  
 Polypodio  
 Polytricho  
 Pompholyge  
 Populi gemmis  
 Propoli,  
 Psyllio  
 Punice  
 Pyrethro

P Mandragoræ succum.  
 Sphagnon.  
 Zingiber.  
 Nigri duplum.  
 Erucae semen.  
 Chamæleonis radicem.  
 Absinthium.  
 Cadmiam ustam.  
 Sampsuchum.  
 Ladanum.  
 Lentem palustrem.  
 Terram Creticam.  
 Zingiber.

Quercus uisco

Q Chamæleonis uiscum.

Rapa  
 Raphanino oleo  
 Resina pini  
 Roseis pastillis  
 Rosis siccis  
 Rhu Syriaco  
 Rubigine

R Heliotropium.  
 Ricini oleum.  
 Terebinthinam.  
 Sinopidem.  
 Perseæ folia sicca.  
 Oxycanthæ fructum.  
 Squammam ferri.



## Pro

## Substitues

S Sagapeno	Resinam pini siccam.
Saluia	Calamintham.
Salamandra	Lacertam uiridem.
Sale ammoniaco	Salem Cappadocium
Sambuco	Spinæ uiridis folia.
Sampsucho	Rhus coquinarium.
Santonico	Abrotonum.
Satyrio	Eruca semen.
Scammonio	Ricini semen.
Scylla	Bulbum esculentum.
Scoria plumbi	Plumbum productum.
Scoria Cypria.	Melanteriam egyptiam.
Semperuiuo,	Lactucam.
Sepiæ crusta	Punicem.
Sesamo	Lini semen.
Sesamoide	Amaranthi cremorem.
Sinapi	Nasturtium.
Sifone	Anisum.
Sisymbrio	Ocymum.
Solano uescaria	Semen solani hortensis.
Sphagno	Iuncum odoratum.
Spondylis	Folia oliuæ.
Stercore uulturis	Columbinum stercus.
Stercore turturis	Stercus columbi.
Stercore felis.	Ichneumonis stercus.
Stibio	Æris squammam.
Struchi radice.	Ellebori nigri radicem.
Succo calpasi	Succum myrti.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succum.
Succo rhododaphnes	Viscum quernum.
Succo cyrenaico	Syriacum succum.
Succo papaueris	Mandragoræ succum.
Succo salicis	Hederæ nigræ succum.
Succo gallæ	Succum mori.
	Succo



Pro		Substitutes
Succo panacis		Lac sfsamini.
Succo polygoni		Succum plantaginīs.
Sulfure uiuo.		Sandaracham.
Symphyto		Centaurium.
Seri		Lithargyrum.
Terra Samia	<b>T</b>	Leucographem terram.
Terra crethria		Calcem Thebaicam.
Terra alana		Plumbaginem.
Terra asteri		Cimoliam.
Terebinthina		Mastichem.
Thapsiæ succo		Chamæleonis nigri succū.
Thymo		Satureiam.
Tithymallo		Chamæleon.
Thure		Ampelitin terram.
Veruenaca	<b>V</b>	Chamæleucem.
Viola		Florem radiculae.
Vino rhodio		Austerum uinum.
Vino Falerno		Vinum Mendesium.
Visco quercino		Chameleonis albi uiscum.
Vulpis adipe		Vrsinum adipem.
Vulturis stercore.		Columbinum Stercus.
Vua domestica		Pulpam palmularum Syriacarum.
Xylobalsamo	<b>X</b>	Radicem uiolarū albarū.
Zingibere	<b>Z</b>	Pyrethrum.

F I N I S.

Tomus IIII. Qqqq



## GALENI PERGA

## MENI DE COMPOSITIONE

## MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera Liber Primus.



VANDOQVIDEM ex com-  
mentario quem iam pridem de com-  
positione medicamentorum conscri-  
psi, priores duo libri, qui exierant, in  
lucem, una cum alijs in apotheca, que  
ad uiam sacra est, perierunt: dum Pa-

Pacis delubrum  
conflagrasse cli,  
et cum eo biblio-  
thecas palatii,  
& nonnullos com-  
mentarios Ga-  
leni.  
Sophistas ex-  
terminandos  
esse.

cis delubrum totum, & ingentes Palatii bibliothecae  
maximo conflagrarunt incendio: equidem amicorum  
precibus uictus, cogor nunc illos eosdem recudere: idque  
ab eodem initio auspicatus, a quo in illis exorsus fue-  
ram. Siquidem statim in auspicijs primi commentarii  
monebam, esse exterminandos sophistas, qui traditio-  
nem medicaminum compositorum e medio tollunt: non  
nullisque simplicium peculiare quasdam facultates in-  
esse inficiantur: eos etiam excipientes scomate, qui de il-  
lis aliquid prodiderunt. Qui quidem adeo vires medi-  
camentorum ignorant, ut nesciant prorsus, a marino  
lepore pulmonem solum exulcerari: uescam solam, a  
cantharidibus. At uero Empirici cognoscunt quidem  
ex aerugine cerato simplici admixta, confici optimum  
sarcoticum medicamentum: tamen si neutrum eorum per se,  
carnem gignere possit: qua autem ratione id contin-  
gat, ignorant.

Sarcoticum opti-  
mum confici ex  
aerugine cera-  
to simplici ad-  
mixta.

Resinae omnes  
calfaciunt.

Sunt igitur vires medicamentorum simplicium, non  
generatim tantum, sed particulatim etiam inuestigan-  
dae. Siquidem non sat est nosse hoc pharmacum calfa-  
cere, nisi etiam quo gradu id efficiat noris. Calfaciunt  
quippe resinae omnes: attamen maioris minorisque ra-  
tione plurimum inter se earum calores differunt. Atqui



In curatione particulæ impensè refrigeratæ, medicamē admouebimus admodum calfaciens: illi uerò quæ paululum ab habitu naturali recessit, calore modico præditum. Merito itaq; nos quatuor excalfaciētium ordines statuimus, separantes à modicè calidis ea quæ euidenter eiusmodi qualitate præcellunt; tum quæ magnatim quæ uehementi adeò, ut urere iam uideantur: atq; in singulis hisce ordinibus latitudinem momentaneā constituētes: similiq; in excessibus reliquarum qualitatum, ratione. Porro medicamētorum materiæ, quædam sanè à plantis: quædā à metallis: nonnullæ ab animalibus proficiuntur. Iam uerò, præter simplicium omnium medicaminum facultates, omnium etiam præter naturam affectuum differentias ad unguem nouisse expedit. \* Quippe primus curationis scopus à morbificis dispositionibus nascitur: cum quibus simul indicat curationem natura particulæ affectæ. Sed aeris etiam nos ambientis temperiem, constitutionemq; præterea ætatem, tempus, regionem, uitæ studia, & mores, multi præstantissimi Medici unà cum illis inspiciunt.

Ergo si simplicibus tantum medicamentis, uniuersos præter naturam affectus curare liceret nobis, nunquam egeremus compositis. Quum autem sæpe numero aliquatenus calfacere corpus uolētes, simplex nullum, quod præstare id possit habeamus, ex uarijs unum conficimus medicamen, quod eodem, quo affectus, gradu, à mediocritate recedēs, id quod ex usu est, moliatur. Taceo nonnulla simplicia, citra alterius medicamenti miscellam, nō posse adhiberi in emplastrū: alia, nisi retūdant, aut mitigent, administrari nō posse. In morbis etiā q cōtrarias simul facultates desiderāt, ut repellendi et digerēdi: detergendi ac lauiigandi: uel attenuādi simul & incrassandi humores: maximus cōpositionis medicamentorū est usus: nec secus ubi uni-

Calfaciētium ordines quatuor, quos etiā reperire est in cæteris qualitatib;

Medicamentorum materiæ vni de proficiuntur.

Scopus curationis primus à morbificis dispositionibus nascitur.

Cōpositis medicamentis utimur.

Qq q q ij



Phoenicini  
pharmacii com-  
positio et usus.

cum medicamē habere cupimus, qđ multis uenenum  
eiaculātibus feris, ac pharmacis exitialibus aduerſet.  
Quum autem oleum uetus & adeps, uim digeren-  
di fortiantur: chalcitis autem & palmę succus, repel-  
lendi, astringendiq;: ex his ipse pharmacum phoeni-  
cinum dictum composui, glutinandis ulceribus, cica-  
trice obducendis, & phlegmonis curandis accommo-  
dum: quo iam complures utuntur. Etenim ratio com-  
positionem inuenit: experientia, de inuentorum uirtu-  
te decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithar-  
gyrus, donec consistentiam consequatur emplasticā.  
Adeps porrò ipse sit tum insulsus, tum uetus; quemad-  
modum etiam oleum: quę sanè quo uetustiora fuerint,  
eo digerent promptius, phlegmoneq; diuturniori atq;  
contumaciori erunt magis accommodata. Verū ad in-  
cipientes atq; augescentes phlegmonas, ut quas astringe  
atq; refrigerare oportet, præstat emplastrū ipsum  
ex uino, uel aceto, uel aqua, uel oleo imaturo, uel astringe  
gente, liquare. Cōmunis autem compositionis modus  
est talis. Vetus adipis, lib. ij. Olei ueteris, lib. iij. Li-  
thargyri, tantūdem. Chalcitidos, vnc. iij. Liquato adi-  
pi reliqua eleganter atq; artificiosè misceantur, ferue-  
ſcantq; simul, ac rudicula palmæ uiridi & succulenta  
moueantur, donec sibi emplastri consistentiā contra-  
xerint. Quo quidē medicamine, ad ulcera quæ non fa-  
cilè cicatrice obducuntur, & ad cruenta est utendum.  
Auxiliatur etiam inflammationibus, articulorum mor-  
bis, bubonibus, phymatis, ambustis, pernionibus, fra-  
cturis, contusionibus, rheumaticisq; uniuersis consti-  
tutionibus, cuiusmodi plures solent Romæ inualesce-  
re. Cæterū in phlegmonarum principijs uim repul-  
soriam esse ualidiore oportet; in incrementis uerò, hæc  
imminuenda: quæ digerit uirtus, augenda est. Vigen-  
te phlegmone, pares inuicem esse conuenit facultates;  
nisi uehemens dolor, pharmacum leniens requirat. At

Romæ inuale-  
ſcere cōplures  
dispositiones  
rheumaticas.  
Phlegmonarū  
curatio.



inclinante phlegmone, uim digerēdi augebis. Qua ex  
 methodo licebit tibi secundum uarias indicationes uti  
 p̄dicto emplastro uarijs oleis, atq; succis liquato. Ego  
 uerò ad phlegmonas erysipelatodes soluto ipso ex ro-  
 faceo utor. Cui etiam, si æstas fuerit, uuæ acerbę simul  
 & portulacæ, uel semperuiui, succum immisceo. Quip-  
 pè uuæ acerbæ liquor per se, plus q̄ oportet, astringit:  
 tanta autem astrictio lædit erysipelata: ut quæ calorē  
 ipsorum, cutē densando, includat. Igitur in exactis ery-  
 sipelatis, ea quæ aduentitia sua frigiditate auxiliantur,  
 ubi cœperint incallescere, sunt mutāda. Postea uerò q̄  
 incendium cōquieuerit, aut si nec perfectum planē ab  
 initio erysipelas fuerit, \* haud amplius āscititiam fri-  
 giditatem desyderabimus: uerūm ijs succis diluemus  
 phœnicinum emplastrum, qui moderatē refrigerent.  
 Ab his iam & lini seminis, & chamemeli succum mi-  
 scebimus: ipsoq; solo, sed fuso postea utemur empla-  
 stro: nihil aliud illi miscntes. Quod si quādo liuidum,  
 ob refrigerantium usum, erysipelas ipsum euaserit: so-  
 lum phœnicinum emplastrum, ueteri oleo liquatum, id  
 discutere potest: quo tempore partes liuidæ, aqua souē-  
 tur calida, atq; etiam scarificantur. Sunt qui calcis uiuę  
 nonnihil ipsi pharmaco immisceant. Intrepidē itaq; in  
 rheumaticis affectiōib⁹ hoc utitor medicamē: utpote  
 quod tum astringat, tum digerat, tum robur particula-  
 rum confirmet. Etenim non semper ob calorē immo-  
 dicum fluxione affliguntur particule. Sæpe siquidem  
 ob propriam imbecillitatem, quæ ab intemperie frigi-  
 gida ut plurimum proficiscitur, tali corripuntur affe-  
 ctu. Quare si humectet eas quispiam, calfaciatq; medi-  
 camentis laxantibus, dissolutę prorsus & imbecillę fiēt.  
 Sin tumores uehementer astringat, initio quidem, iuua-  
 re uidebitur: cætetūm quod ex eis reliquum est, contu-  
 max atq; scirrhosum reddiderit. Sed neq; id genus di-  
 spositiones ferunt nimis astringentia medicamenta:

Omphaci fa-  
cultas.

Erysipelatis  
curatio.

Liuentis ery-  
pelatis curatio

Emplastri phœ-  
nicini facultas

Fluxionū cāx.

Qqqq ij



Dolor inflāma  
ta exasperat,  
fluxionibusq;  
occasione præ-  
bet.

ut à quibus dolore & tensione affligātur. Atqui omnis dolor, inflammata exacuit, irritatq;, & fluxionibus occasionem præbet, uel si rheumatica intemperie æger non afficiatur.

Lithargyri fa-  
cultas.

Sunt autem complura medicamenta, quæ phar-  
ma-  
co cui miscentur, uim nullam, aut per exiguam exhi-  
bent; cōmoditatem uerò materiæ præstant, ut uel em-  
plastri, uel cerati speciem referat. Atq; ex eorum sanè  
genere existit argenti spuma: nullā insignem possidēs  
facultatem, præter siccandi modicam. Quā ratione at-  
trita femora ex itinere adiuuat. Est autē ex ijs pharma-  
cis quæ liquefieri possunt, etiam argenti spuma, quam  
Græci lithargyron uocant: ut chalcitis quoq;, & misy.

Chalcitis om-  
niū celerrime  
funditur.

Candidū medi-  
camē Galeni.

Cæterū chalcitis quidem omnium celerrimè fundi-  
tur: tardissimè argenti spuma: at in horum medio æru-  
go & misy consistūt. Porrò candidū medicamē, quo  
ad parua ulcera utor, ex oleo, aqua, & argenti spuma,  
conficitur: ita ut libris duabus aquæ, tres q; purissimi,  
splendissimiq; olei, totidemq; spumę argenti injecian-  
tur. Debent autem simul coqui ad ignem minimè su-  
midum, idq; in loco sub dio atq; soli exposito. Siquidē  
ut aer nubilus pharmacum ipsum denigrat, sic synce-  
rus ad candorē eius plurimū confert. Hoc autē fiet glu-  
tinātius id medicamen, quo plus liquoris indideris.

Aerem nubilū  
denigrat phar-  
maca, syncerū  
conferte ad eo-  
rū candorem.

Aquæ propria  
facultas.

Cālidū empla-  
stri Galeni fa-  
cultas.

Aqua etenim substantia ppria semper humectat,  
refrigeratq;. At oleum si recens sit, pharmaco mi-  
nimè reluctatur. Permanet itaq; humidum, ac mo-  
dicè frigidum: quali maximè tenera corpora & caco-  
chyma indigent. Ergo huiuscemodi emplastrum, pru-  
ritus, desquamata, & ut uno uerbo expediā, ulcera exi-  
gua p̄sanat: utpote exulceratis partibus ne quid ifluat,  
impediens: & quod iam influxit, denuo ad partes cir-  
cumstantes retrudens. Aduerte autem, nullum hume-  
ctans nec propria ratione, nec ex accidenti esse ulce-  
ribus utile.

Ulcenibus ni-  
hil humectans  
est utile.



Conficitur etiam pharmacum id ex oxelæo & lithargyro. Cæterum medicamen mediocriter siccans fit, si utriusq; nempe olei & aceti, duplo maior portio quàm argenti spumę misceatur. Copiosior uerò duplo utriusq; mensura, ualentius facit pharmacū. Ipse enim triplam utriusq; nonnunq̃ miscēs, tota die medicamē coquere soleo. Atq; hoc sanè modo confectum, colore atro splendescit, maximaq; siccandi potētia pollet: ita ut curet ulcera contumacia, cruenta glutinet, fistulasq; in callum nbn induratas, adducat, ac breuiter, citra morsum exiccet.

Ex œnelæo etiam lithargyroq; similiter medicamē paratur. Equidem per æstatem sub sole ardenti, ex uino Falerno, aut alio tenuium partium, lithargyrum conterere soleo, idq; continuis quindecim diebus. Quibus exactis, medicamen ipsum exiccans, repono: quo postea ex oleo soluto, in rheumaticis affectibus utor: necnon ad uulnera glutinanda.

Cruda itaq; ac per se, argēti spuma, attritiones corrigit. Ex aceto autem aut uino trita, siccataq; , ulcerum quæ ob humiditatem ægrè cicatricem recipiunt, remedium fit. Quod si ipsam cupis rosionis expertem, elota utitor.

Ac minimum quidem rosionis exhibet, si uino uel aceto abluatur. Conuenit tamen curiosè toto die contritam, cum liquore per noctem relinquere: quem postero die mane effundemus, alium denuò instillantē, ac postea rursus tundētes: id quod singulis diebus facere sub feruenti sole (hoc enim sit commune præceptū in lapidosi omnibus) minimè desistemus, donec unā cum humore ceu quidam flosculus ipsius argenti spumæ cernatur.

Quæ ex lithargyro componuntur, fieri possunt etiā ex molibdæna. Cæterum molibdæna substantiæ crassioris, ac frigidioris quàm lithargyrus est: ac medi

Lithargyri præparandi ratio.

Lithargyri facultates.

Lithargyrus reddit expert rosionis, si ex uino uel aceto abluatur. Lapidosa oīa quę abluimus, sub ardēti sole sunt ex humore aliquo laxanda. Molibdæne facultas.

Qqqq iij



camenta quæ ex ipsa parantur, cineritia redduntur. Quum igitur discutere quid uolueris, lithargyro potius quàm molibdæna utitor.

**Cerussæ** vñs.

**Terebinthina.**

**Larix.**

**Ceræ** abluenda ratio.

At cerussam uel coloris causa ad emplastra candida conficienda Medici lithargyro immiscent: uel ut quandam astringendi refrigerandi quæ uim medicamento concilient. Sed resinam etiam iniicere assolent, quo sequax ac sibi continuum fiat pharmacum. Verum quum mitissimæ omnium resinæ sint tum terebinthina ipsa, tum illa quæ larix dicitur, has miscere præstiterit, dum conficere tale medicamen est animus. Multo etiam leniora tactu omnia sunt, tum quæ resina constât, si ceræ quid adijciatur: tum quæ ex cæra, si modicum resinæ recipiant. At candido emplastro alba cera desideratur. Quam, si sponte sit nata, prius abluere oportet: nimirum liquâtes ipsam, ac mox in aqua fontis mergentes, commouentes, & repurgâtes: qua ratione etiam pix, resina, & phylæma, abluenda sunt.

**Ulcibus** incipientibus potiora est astringentia.

**Anodynū** pharmacum.

Thus carnem signit.

Laxantia plethris et cacochymis admota, fluxum ad affe-

ctis, ut minimè inficiant manus, cera simul cum resina fuerit admista, candidum emplastrum habebis: cui aquam aut oleum miscere poteris. Ex oleis autem, Omphacium, Hispanicum quæ pharmaco uim astringentiam adijciunt. Histricum uerò cum exigua astringentia quædam amaritudinem refert. Atqui principio ulceris, finis quæ potiora sunt astringentia: dulcia autem in mediis.

Pondus ergo huiusce emplastri sit tale. Cerussæ, lithargyri, singulorum lib. j. Olei, lib. ij. Cere, lib. s. Terebinthinæ, vñc. ij. Quibus omnibus licebit tantum thuris, quantum & terebinthinæ, aut etiam dimidiâ portionem addere. Qua industria medicamen maximè anodynū reddet: sed ad cicatricem inducendam ineptius: quâdoquidem ex ipsius usu caro ulceri excrescet, quantum sit facultate sarcoticum. Taceo laxantia medicamenta corporibus plenis & cacochymis admota, fluxum



sum ad affectas partes citare. Satius itaq; fuerit, tñ ad cicatricem inducendam, tum ad digerendum exactius, aluminis scissilis, candidiq; , vnciam unam : piperis semunciam miscere.

Candidi ex pipere medicamenti, quod ad senum ulcera, & eorum qui mollem sortiuntur cuticulam, persananda est efficax, quodq; refertur ad Attalum Regem nostrum, qui olim Pergamensibus imperabat, compositio habet in hunc modum, Argenti spumæ, cerussæ, sing. lib. j. olei, lib. ij. ceræ, lib. S. terebinthinæ, vnc. ij. thuris uel tantūdem, uel media pars. aluminis, drach. vj. piperis, drac. ij. Verum apud Romanos, librari quidem dicuntur solida: ut mensurari humida. Metallica in primis sub sole coquuntur, donec duriusculā consistentiam adipiscantur: quibus reliqua postea misceri debent artificiose. Hoc pharvacum ulceribus humidioribus, atq; abrasis medetur.

Alba quæ oleo receti & aqua citra piperis atq; thuris misturam confici docuimus, uehementer commorfas partes offendunt. At minus illis Attalicum lædere solet: eo qd terebinthina, oleum uetus, thus, & piper adiecta sunt. Ad commorsa nāq; minimè alumen conducit: quum opus hñc sit non astringentibus, sed abundè extrahentibus eā quæ in alto neruos punctos affligit, & uenenatam animalium saluam. Distinguenda autē sunt cacoethe ulcera, ab ijs quæ non facile ad cicatricē perueniunt: quum non omnia cacoethe ulcera ægrè cicatricem admittant. Porro si blandius medicamentū, ad sedandumq; dolorem commodius, conficere uis, aliquid adipis anserini, uel gallinacei, uel porcini imiscebis. Sic nāq; magis anodynum effeceris: minus tamē idoneum cicatrici inducendæ. In uniuersum autem, ne mo probè uti possit medicamento composito, qui simplicium uires prius non accuratè didicerit.

Aliud albū Andromachi. Lithargyri, cerussæ, sing.

as partes cōciliant.

Attalus Rex Pergami, patriæ Galeni. Candidi ex pipere cōpositio

Librantur solida. Mensurantur humida.

Comorfas quæ conueniāt medicamenta.

Cacoethe vlcerā nō oia dysepulotica esse.

Compositis recte nemo uti poterit, q simplicium vires prius non didicerit.

Candidum Andromachi.



Heminā fuisse  
æqualem nouē  
vnciis libræ  
Romanæ.

Candidū aliud  
Andromachi.

Cādidū Hera-

Morsui rabidi  
canis auxiliari  
medicamē ex  
canceris confe-  
ctum.

Minam Atticam. j. ceræ partem quartam. resinæ terebinthinæ tantundem. olei heminas. iij. aquæ heminas duas. conficito. Nonnulli porrò vncias. xx. minam cōtinere tradunt. Nonnulli sedecim. Atqui miret quispiam quomodo Romæ degens, pro libris nominarie heminas. Cui urbi sunt familiaria uocabula libra, sextarius, & vncia. Ex multis autem medicamentis iā pridem conscriptis, prius q̄ potentia Romanorum usq̄ adeò creuisset, sum coniectura assequutus, quam illi uocarent heminam, fuisse æqualem nouē vnciis vnius libræ Romanæ. Aliud album Andromachi.

Argenti spumæ drach. clx. cerussæ drach. cc. ceræ, drach. 50. terebinthinæ, drach. xxiiij. olei hem. S. aquæ cyathos. vj. conficito.

Aliud candidum ab Hera descriptum. Ceræ albæ pont. lib. ij. lithargyri chrysidis, lib. j. cerussæ tantū dē. myrrhæ, medullæ ceruinæ, sing. vnc. ij. thuris insecti, vnc. j. olei ueteris, sextarium unum. Lithargyrus oleo incoquitur: ubi uerò sordium crassitudinem acquisierit, cera, mox cerussa, aspergitur, moueturq̄. Vbi unita fuerint, nec iam polluāt, ab igne extractis medulla iniicitur. Postq̄ refrixerit medicamentū, myrrha & thus alijs miscentur. Dein emollitū, subactumq̄; manibus, ad usum seruatur. Etenim rabidorū morsibus auxiliatur, tum uulneri impositum, tum mole auellanæ nucis, catapotij instar exhibitū, quadraginta diebus. Ad hæc abrasa suggillata, & ulcera quæ difficulter admittunt cicatricem, psanat; ad aliaq̄; pleraq̄ est utile. Ego tamen propinare pharmacum hoc contra canis rabidi morsus, nuncq̄ fui ausus: quum haberem aliud, nempe ex canceris confectum, medicamentum, ad sanandos illos maximè efficax. Ijs enim remedijs ipse uti semper conatus sum, quæ licet nonnuncq̄ præsidij quod allatura essent, dubiā spem promitterent, neutiq̄ tamen obesse possent. Porrò Heras cum heminā scribit, sextarij



Romani dimidium indicare uidetur, continentis vncias uiginti, quas cornibus maiori ex parte metiuntur, incilis extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus.

In uniuersum autē, nisi metallica medicamenta plenus coquantur, emplastrum ex eis cōstans adeo friabile edetur, ut adhærere cuti absq; deligatura nō possit. At coquuntur largius, dum maiorem liquidorū mēsuram in mistura cōtinent. Quod uerò ad adipis differentias pertinet, in omni animantium genere iuuenilia perfectis humidiorē, minusq; calidū adipem possidēt.

Album quod ad Mnasæum refertur, ad diuturna et difficilia conferens. Lichargyri, Cerussę, singulorum drach. c. cere, drach. 50. terebinthing, thuris, sing. drac. xxv. aluminis fissilis, drach. xij. olei heminas. ij. Nec uerò differre putetis si drachmas. c. alicubi scriptas loci unius librę inueniatis. Libra siquidem drachmas sex habet ad nonaginta. Selibra, octo & quadraginta. Sic & huius rursus dimidium, uiginti quatuor.

Porrò quę ulcera ex humorum confluxu, uel multorum, uel acrium oriuntur, ita tamē ut locus affectus huiuscemodi in se dispositionē non habeat, qua influentem humorem, quāuis bonum, corrumpat: ea dysepulotica, hoc est, ægrē peruenientia ad cicatricem appellō. At quę dictā dispositionē sortiunt, singulari uocabulo cacoethe, hoc est malignātis nature, uocant. Quibus sanē omnibus illa medicamentā conueniunt, quę absq; rosione & morsu desiccant: quęq; præter q̄ q̄ non erodant, aut manifestò astringāt, detergere etiam possint. Siquidem plurima eius generis ulcera, ceu ab exesione malignorum humorum sūt caua reddita, impleri postulant. Atqui omnia quę carnem gignunt medicamenta, detergendi facultatem sortiuntur. Multa etiam alia siccā possidēt uim, ulceribus id genus curandis commodam. Eorum tamen meminisse impręsentiarum oportet, \* quę aut tueri confecti emplastri

Sextarium Romanū cōtinere vncias. xx.

Metallica plenus coquenda esse ut adhæreant.

Candidum Mnasæi.

Librā cōstare drachmis. 96.

Dysepulotica ulcera quę dicantur. Cacoethe ulcera quę.

Viceribus dysepulotitis atq; malignis, quę medicamentā conueniant.



Cera Tynhe-  
nica.

Metallica ab-  
luendi medi di-  
uerſi.

Vnciâ cōſtare  
oſto drachmis

candorem poſſint: aut non uſq; adeò uitiare. Talia au-  
tem ſunt, cadmia, pompholyx, calx, oſtea combuſta,  
purpura, buccina, & ſæpiæ pars oſſea. Parum officiet  
colori, & æris ſquama: & ex uſta chalcitide id quod ci-  
nerum eſt, aut ſubalbidum. At uerò diſtorū quodq;  
ſi lauetur, totam roſionem amitteret: quemadmodum tū  
cera, quæ medicamini conſciendo admiscebitur: tum  
reſina. Cæterū ut cera Tyrrhenica, uel pōtica eſt ad  
candidi emplaſtri præparationem præſtantior: ſic re-  
ſina, tum quæ larix, tum quæ terebinthina appellatur,  
ad ulcera malignātia magis conducunt. Sed thuris ali-  
qua portio etiam indenda eſt, ut ulcerum malignorū  
ipſa diſpoſitio coquatur, & ad ſuppurationem perue-  
niat. Iam uerò ad prætumida ulcera ex aceto & mari-  
na curioſè liguari debent metallica. In quibus autem  
acre & mordax eſt quod in ulcera fert, ex aqua potius  
maceranda ſingula ſunt: quemadmodum magis ex ui-  
no, ubi copioſus humor ulceribus influens apparet.  
Vbi igitur lithargyri ceruſſæq; utriuſq; libram unam  
cum tribus olei, & ſelibra aquæ ſimul & accuratè co-  
xeris, reſinæ terebinthinæ, aut eius quæ larix dicitur,  
ternas uncias inſcito: ceræ autem duplum ſufficit: nā  
thuris ſat erit ſi unciam & ſemiſſem poſt ceram & re-  
ſinam indideris. Deinde metallicorum tres vncias ad-  
des, quas drachmæ quatuor & uiginti conſtituunt. Im-  
pones autem duorum, trium, plurium, atq; oium que  
numeraui: ita ut ſi omnia habeas, æquam ſingulorum  
portionem inſcias: cadmię nempe, pompholygis, buc-  
cinorum cineris, uel oſtreorum, & æris ſquamę, ſingu-  
lorum denarios ſep̄. qui tres vncias abſolunt. Quòd  
ſi calcem lotam immiſceas, ſingulorū drachmæ quin-  
ponentur. Si uſtam chalcitidem, ſingulorum drachmę  
quaternæ: ſic ut ex omnibus in unum coeuntibus, tres  
tantū vnciæ conſentur.

Candidum emplaſtrum Damocratis, ad abraſa,



ambusta, & ulcera summa in cute suborta.

Cerussę lib. j. lithargyri, trypherg, sing. vnc. xvj. ceræ ponticę, vnc. v. terebinthinę purissimę, vnc. j. thuris mannę, uel thuris vnc. v. olei candidi, lib. j. aquę sextarius. Conficiatur ut decet. Porro in ijs qui molli sunt carne, in senibusq; aut ijs qui malo sunt præditi corporis habitu, aluminis licebit etiam quatuor uncias miscere.


Cadidum Da  
mocratis.

## GALENI PERGA

### MENI DE COMPOSITIONE

#### MEDICAMENTORVM SECVN

dum genera. Liber secundus.



**V**T IGITVR si quando perdiderimus librum, cui inscriptę insint medicaminum cōsuetorum compositiones, similia reficere amissis ualeamus necessarium in primis est, nos uniuer-salem quandam uię formulam didicisse, qua propositum inueniamus: dein però secundū hanc in multis particularibus exerceri: scientes absq; tali exercitio nullum posse rectę opus absolui. Proponatur itaq; nobis cauum ulcus curandum. Etenim docti ab ipsa ratione, cauorum ulcerum curationem subministrari succrescente alia carne loco deperditę, ex ea uidelicet quę subiecta est: cogitamus fieri hoc non posse, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas subsit. Verū sordes medicamina detergentia auferunt: humorem, exiccantiā discutiunt. Quocirca necessum est huiusmodi pharmacorum materias cognoscere, idq; non simpliciter secundum genus eorum facultates cōsiderantes, sed inuenientes etiam quo ordine, quo uegradu, aut excessu, singula suas uires sortiantur. Finga-

Cauī ulceris  
generalis cura  
tio.



Cerā p se non  
congruere vl-  
ceribus sordi-  
dis.

Ærugo per se  
adhibita, rosio-  
nem & phleg-  
monē excitat.

Corpora vali-  
da validiora  
medicamenta  
pferre posse.

Medicamenta  
omnia ei esse  
optima, qui af-  
fectus quibus  
exhibetur, co-  
gnorit.

Viride medica-  
men Galli.

Terebinthinæ  
progiua.

mus ergo nobis ad manum tantū adesse ceram, ærugi-  
nemq; quibus cauum ulcus repleamus. Quum enim  
compertum habeamus, ceram quidem solam, ulceris  
sordes minimè prohibeturam esse, ut quæ nec deterge-  
re, nec exiccare possit: æruginem autem per se adhibi-  
tam, excitaturam tum rosionem, tum phlegmonē: utiq;  
horum utrunq; uitabimus: medium autē ex ambobus  
constituemus, ut imbecilius ærugine, sic cera ualētius.  
Quia uerò paulo hæc interuallo relinquitur, ab eo qd  
cōmodè administrari possit: ærugo autem magno id ip-  
sum excedit: ob id sanè multæ ceræ modicam æruginē  
admiscebimus. At quantam quantē miscere oporteat,  
certè ante experientiam exactè quidem nemo inueni-  
re poterit: conijcere autem poterit, iudicareq; & ita cō-  
ficere pharmacū, ut primò nullum infelicē successum  
sit habiturum: quemadmodum aliquando ego in quo-  
dam uico confeci, cū ceræ fusæ ex oleo rhodino, libra  
unica, unciam unam æruginis temperans. Cæterū  
ualida corpora ualidiora medicamenta sustinent: quæ  
uerò imbecilliora existunt, hoc est humido & molli ha-  
bitu prædita, haud item talia perferunt. Dura itaq; cor-  
pora ex copiosiori ærugine cerato admista, recipiunt  
carnem: mollia ex pauciori. Quare ipsa experientia do-  
cebit, quatenus uel augere, uel remittere, uel tueri phar-  
maci facultatem expediat. Sunt nanq; omnia medi-  
camenta ei optima, qui affectus quibus singula offe-  
runtur, cognoscit.

Viride medicamen Galli, ad glutināda maiora uul-  
nera potentissimum, ab Andromacho scriptum.

Resinæ strobilinæ drach. ccc. ceræ drach. c. æruginis  
rase, drach. so. thuris, drach. xxv. Aceti quod sit satis.  
Hæc Andromachus. Cæterū quum strobilina resi-  
na aliarum omnium longè calidissima sit: ambabus au-  
tem qualitatibus moderatissima, quæ terebinthina uo-  
catur: certè multò satius uidet hanc oibus medicamen-



tis, quæ rectè curabunt ulcera, permiscere: quâdoquidè primus, præcipuusq; in eis scopus est, ut id quod offer-  
tur, non mordicet. Cômendanda est autem ipsius thu-  
ris cômistio, q̃ emplastri consistentiam adiuuet, dolo-  
rem simul leniens & concoquens. Quare si in ea com-  
positione æqua ipsius portio coniuncta ærugini esset,  
renacius & mitius ipsum redderetur medicamentum:  
æruginis tamen exiccantem facultatem exolueret, quæ  
ulceribus ægrè admittentibus curationem desyderat.  
Meminisse autem oportet, fortium medicamentorum  
ex aceto diebus pluribus contritorum, morsum & acri-  
moniam obtundi: vires augeri. Eadem ratio est in me-  
tallcis medicamentis combustis. Hæc tamen ex ignis  
cômercio nonnihil mordax, siue erodens perseruant:  
quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur.

Proposito itaq; emplastro, si ex rosaceo liquefacto  
utaris, pderit fordidis, humidisq; ulceribus. Pura ue-  
rò erodit: ac proinde miscendum ei est ceratum liqui-  
dum ex cera & resina confectum: uel ex rosaceo, uel  
oleo liquatum. Est autem oleinomen unum: quali-  
tas & facultas diuersa. Quippè omphacinum frigi-  
dus est: ex maturis oleis pressum, calidius. Temporis  
autem progressu, calfaciendi uim auget. Sic etiã quod  
saleem habet, quantum ex illo sumpserit, tanto calidius  
est: magisq; siccatur, q̃ quod ipsius est expers. Iam, quod  
furculos oleæ continet, ualētius astringit. Indicabit au-  
tem quod utilius est, & ulceris forma, & corporis egri-  
natura. Vlcus siquidem, cōtrarijs remedijs curabitur:  
corpus ulceratum, similibus. Rosaceum uerò prestan-  
tissimum esse nosti, quod solis rosis pluribus oleo citra-  
saleem præparato plenius maceratis confectū est. Quæ  
omnia si quis memoriter teneat, nec oblitus sit uirium  
medicamentorum simplicium, is, & uaria emplastra ui-  
ridia componet, & compositorum singulis q̃ rectissi-  
mè utetur. Porro durioribus corporum, magis exiccā-

Thuris facul-  
tas.

Fortium medi-  
camentorū ex  
aceto tritorū,  
morsum quidē  
obtundi, vires  
autem augeri.  
Elota acrimo-  
niā amittere.

Olei differētiæ

Vlcus esse cu-  
randū contra-  
rijs, vlceratum  
corpus simili-  
bus.  
Rosacei opti-  
mi pparatio.



Exiccātiū uim  
intendi p mel-  
lis miscellā, re-  
mitti aut elec-  
tū cerato.

Viridis medi-  
caminis opti-  
ma tēperatura

Viride hecatō  
drachmon di-  
ctum.

Viride Epigo-  
ni.

Viride Passio-  
nis.

Viride Lite di-  
ctum.

tia medicamenta exhibēda sunt: minus autem, mollioribus. Ad hæc intēdemus exiccantis medicamētū uim, ubi opus esse uideatur, admisto melle: remitemus autem & mitigabimus, ex oleo, & cerato, uel oleoso quopiam. Igitur cauū ulcus in sano corpore, uiridi emplastro, quod ex erugine, cera, & resina conficitur, liquato ex rosaceo curabitur. In cuius medicamenti compositione, equidē ceræ & resinæ soleo portiones pares miscere; eruginis autem duodecimā uel decimā, uel octauam; nimirum pro ulcerum corporumq; diuersitate. Atq; erit sanē duodecima, si ceræ pondo, & resinæ tantūdem, æruginis vncias duas temperemus: decimaq; & octaua ad portionem.

Viride Hecatondrachmon dictum, quod centum drachmas medicamentorum recipiat, ad magna uulnera glutinanda, & purganda sordida, maximè utile.

Ammoniacy drach. viij. squamæ, drach. xij. manne, drach. viij. resinæ siccæ, drach. xij. eruginis drach. viij. seui uitulini, drach. xiiij. resinæ terebinthinæ drach. viij. ceræ drach. xxx. olei quartam cyathi partem, aceti, quātum satis esse uideatur. Conficito.

Viride Epigoni, ad carnem gignendam efficax.

Æris squamæ, æruginis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, thuris, sing. vnc. j. Aloes, myrrhæ, chalbani, sing. vnc. s. Aluminis rotūdi, drach. vj. resinæ colophonice, drach. cc. ceræ drach. c. olei hemine dimidiū. Misceto.

Viride Passionis ad extrahendū & digerendū, utile.

Resinæ colophonice, drach. ccc. ceræ, drach. cl. æruginis, drach. viij. aluminis rot. tantūdem, squamæ eris, drach. xij. thuris, drach. xvj. æris combusti, drach. viij. Salis Ammoniacy tantūdem. Olei dimidiū cyathi. aceti quod satis esse uideatur. Conficito.

Viride Lite appellatum.

Resinæ lib. xij. ceræ lib. viij. æruginis rasæ, \* Lib. ij. seui uitulini, lib. ij. aceti lib. so. Ego autem māne librā inijcio.



Inñcio. Liqueat igitur acetum cum duabus æruginis libris, & una ipsius mannæ, læuigandum esse: ac dein liquida ipsis miscenda. Hoc medicamentum emollit, cōcoquitq; adipis atq; manne ratione.

Porro ad efficienda uiridia medicamēta, gruginem non modicam immittere oportet, ut cetera in suum colorem permutet. Quare que pertinaciter proprium colorem tuentur, ea simplicia ab hac miscella abigenda sunt. Sed neq; inter coquendum est inñcienda ipsa grugo: uerū ubi in mortario unitas facta est, tūc miscēda.

Consilia igitur curandorum ulcerum sunt, sordidis adhibere abstergētia medicamenta; pfluentibus exiccantia; atq; id quod in fluxu est, repellētia. At si copiosum & contumax sit quod fluit, fluoris causa prius est amputanda. Constat autem, inflammatorum ulcerum prius esse sanandam phlegmonem; carnem intemperatam, reducēdam esse ad temperiem; cui sanē quatuor modis simplicibus, totidemq; compositis, per contrarias qualitates succurritur.

Porro ubi sinum implere proponimus, medicamētum Isis uocatum, aut Machæronis emplastrū liquidum ex copiosiori oleo, per foratum cornu infundendū est: ad quod etiam pyulcis utimur. Est autem ipso medicamento tunc meraciori utendum, quā sinus oppletus est sordibus; ut soluto ex oleo largiori, dum magis purus existit. Cæterū si parū adhuc phlegmones sinum infestantis suspicio adsit, medicamētum ex rosaceo liquabitur. Pari modo & medicamentum siccum, quod ex charta combusta constat, rosaceo copiosiori diluentes, ipsi sinui infundimus. Quemadmodum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent; ita quæ superficie corporis caua ulcera infestant, crassius medicamentum postulant. Meritō igitur in id genus uitij, ceratum ualidē abstergētibus admiscemus; in sinibus oleum, uel rosacei plurimum. At uerò medicamē-

Viridia conficiendi ratio.

Ulcera curandorum uniuersalia consilia.

Ulcera inflammata curatio.

Sinus implendi ratio.

Sinus liquidiora pharmaca postulant.



**Salis facultas.**

ta quæ ex salibus constant, ubi animus est carnem gignere, offerenda non sunt. Sal quippè magis astringit quàm purget: siccat uerò nihilo minus quàm nitrum. ac aphronitrum. Melina emplastra.

**Melinorū atq;  
uiridiū discer-  
piti.**

Quemadmodū uiridium emplastrorum plurima, propter æruginem præpollentem talia fiunt, ita quoq; melinorum nonnulla. Sed uiridia æruginem incoctam, habent: melina uerò coctam, sed mediocriter. Andromachus igitur complura melina scripsit, ad glutinanda ulcera, carnem gignendam, inducendamq; cicatricem idonea: quale est quod subdam.

**Melinum An-  
dromachi.**

Lithargyri drach. C. iij. olei, hemina quidem, æstate: hyeme autem tres cyathos. cera, drach. xlviij. colophonia, tantundem. ammoniaci thymiamatis, drach. xxiiij. æruginis rasæ, chalbani, myrrhæ, sing. drach. viij. conficito. Aliud simplex. Lithargyri drach. C. axungie, drach. lxxv. olei ueteris tantundem. misce. Conuenit enim carne molli præditis: digeritq;.

**Melinum He-  
raclidis.**

Aliud Heraclidis, interiores abscessus sine dolore discutiens. Lithargyri, cerussæ, sing. drach. c. cere drach. lxxx. resina aridæ, drach. lx. ammoniaci thymiamatis, drach. so. chalbani, drach. xvj. olei ueteris, heminas. ij.

Melinum Menæti.

**Melinum Me-  
næti.**

Lithargyri, lib. iij. olei lib. iij. tereb. lib. ij. cere, lib. j. æruginis, thuris, chalbani, sing. vnc. iij. ammoniaci thymiamatis, vnc. vj. conficito.

**Melinum Se-  
rapionis.**

Melinum Serapionis, ad uulnera, & ad resoluendū. Lithargyri drach. c. ammoniaci thymiamatis, drach. xxviij. cere, drach. lvj. æruginis Cypriæ, drach. ix. myrrhæ, drach. j. colophonia, drach. lvj. chalbani drach. viij. olei, heminam. S. Quod si æstas sit, quartam par-

**Coctionē non  
sustinet myr-  
rha, nec thus,  
nec aloë.**

tem heming. Aduerte autem myrrham non sustinere coctionem: quam nec thus, nec aloë ferunt.

Hygieni emplastrum ad multa: quo ad ulcera uix cicatricem ducentia nullum melius extat.



Lithargyri chrysididis, minam; cere tantūdem: chamæleontis nigri, radicis, drach. xxxvj. æruginis rasæ, drach. xvij. chrysocolle. drach. xl. olei ueteris heminas iij. Conficito. Preparatur optimè argenti spuma, si in trita uino Phalerno sub gestu caniculæ, dein afficitur.

Emplastrum ex chamæleonte, quod cicatricem ulceribus difficillimis, callosis, & inueteratis inducit. Lithargyri Minam. j. ceræ, minas. vj. æruginis minas iij. chamæleontis minas. viij. olei minam unam. Conficito ut decet.

#### De ruffis emplastris.

Quemadmodum propter crudam quidem æruginē sunt uiridia emplastra: propter mediocriter autem coctam, melina: sic ruffa euadunt, ubi liberalius ea coquitur. Manifestum igitur est, melina, ruffa q; oleum copiosius, q̃ uiridia, recipere. Ruffum porrò, quo semper mea industria parato utor, in hunc modum coquit. Argenti spumę cum oleo prius coctę, metallica ex aceto læuigata immitto, & sic coquo, donec amplius manus non polluat. Impono itaq; olei uetustioris libras quatuor: argentę spumę lib. iij. aceti q̃ acerrimi, lib. ij. Horum trium metallicorum, squamę gris nigri, æruginis, chalcitidis, sing. vnc. ij. Ceterū hyeme plus olei q̃ per estatē miscendum est. Ac sanè hoc medicamen cruēta uulnera glutinat, magis q; in duris corporibus. curatuq; difficillima ulcera p̃coquit. In sūma uerò, solū hoc sinus glutinat, astringit fistulas, exiccat, et p̃sus claudit. Ipsum tñ iuuat spongia recens ueteri uino respersa. Deligatura in sinibus ab imo fiat, uersus ulceris osculum.

#### De ijs quæ cicatricem obducunt.

Quanto autem glutinantia sarcoticis magis dicuntur siccare, tanto glutinantibus epulotica, siue cicatricem facientia. Ea tamen ex aliquo astringenti oleo (cuiusmodi rosaceum, aut myrteum est) solent administra

Hygiēi emplastrū multi vsus

Lithargyri p̃parandi ratio. Emplastrū ex chamæleonte.

Ruffa emplastrum fieri per longam coctionē æruginis.

Ruffum emplastrum Galeni

Deligatura q̃lis adhibenda sit sinibus.

Cicatricem obducuntia.

R r r r ij



ri. Porro inter ea quæ apud omneis magnificè cōmendantur, inducendę cicatrici præstantissimum est quod ex cadmia, quodq; ex ladano constat.

Emplastrum ex cadmia,

Epuloticū ex  
cadmia.

Cadmia ustæ, & ex uino præparatę, chalcitidis tostę, sing. drach. lxxx. picis colophoniaceę, vnc. viij. uini Phalerni, quod satis est. Conficito ut decet.

Aliud etiam ex cadmia,

Cadmia tostæ, chalcitidis tostæ, diphrygis, sing. drach. xvj. cereę, resinę frictæ, olei myrti, sing. selibrā uini Italici, quod sit satis.

Aliud ex cadmia.

Argenti spumę, cerussę, cadmię, diphrygis, resinę, sing. drach. viij. chalcitidis, drach. ij. cereę, drach. viij. myrtei olei, & uini amingi, quod satis esse uideatur.

Emplastrum ex ladano.

Emplastrū ex  
Ladano.

Chalcitidis, argenti spumę, ladani, singulorū drach. xxiiij. bituminis drach. viij. cereę, vnc. ix. myrti heminam. uini tantūdem.

Emplastrum Pyricauton dictum.

Emplastrū py  
ricauton.

Olei heminam, aluminis fissi, manne, thuris, argenti spumę, chalbanī, singulorum drach. 50. cereę, drach. xxiiij. anchusę, drach. viij. medullę ceruicę, adipis suis lę, æruginis, cerussę, sing. drach. ij. ouorum trium lutea. Conficiatur ut decet.

Medicamē ma  
gne dictum.

Medicamen Magne dictum, ac uerè magnum contra ulcera quæ difficulter cicatricem admittunt: quod ex rosaceo dilutum, etiam sedis affectus sanat.

Argenti spumę, drach. c. cereę, drach. 50. Cerussę drach. c. terebinthing, drach. xxv. thuris tantūdem. aluminis fissi, drach. xij. olei heminas duas. Conficito.

Emplastrum  
Thelamonis.

Aliud Thelamonis accommodatum carbunculis, sinusq; exiccans. Pityinę, cereę, calcis uiuę, lithargyri, sing. drach. 50. cerussę, drach. xxv. olei tris cyathos.

Aliud Moschionis unicè conferens ad amouēdum



MED. SEC. GEN. LIB. II. 261

ulceris callum, sanandosq; sedis affectus. Argenti spumę, cerussę, calcis uiuę, sing. drach. viij. medullę ceruę, cerę, utriusq; drach. xvj. olei myrtei quātū sit satis.

Emplastrum  
Moschionis.

Epuloticum medicamen Andromachi.

Cadmię, lib. j. chalcitidis usteę, cerę, sing. tantūdem. resinę aridę, lib. iij. Myrtei tantundem. Vinum sic-  
cis immiscetur.

Emplastrum  
Andromachi.

Aliud eiusdem candidum epuloticum.

Argenti spumę, minam. j. cerussę tantūdem. cerę, re-  
sinę, sing. minas. iij. olei heminas. iij. aque heminam.

Candidum Thelephanis.

Argenti spumę, drach. lxxx. cerussę, drach. cxx. myr-  
rhę, drach. iij. obo. ij. Sagapeni, drach. v. thuris. drach.  
vj. obo. iij. olei heminas. ij. S. Omnia simul coquito.

Candidū The-  
lephanis.

Aliud ad herpetas, carbunculos, condylomata, &  
rhagadas maximē ualēs: quod etiā phlegmonas arcet.  
Adipis suilli, drach. lxxxviij. cerę cādideę, drach. xlviij.  
cerussę, drach. xij. argenti spumę, tantūdem. conficito.

At uerō nōnulla emplastra cephalica, & catagma-  
tica nominant, potissimū à caluarię fracturis, quibus  
solent opitulari. Sunt autem talia, abstergerendi, digerē-  
di, & siccandi potestate prædita. Pleriq; tamen paulu-  
lum ex astringentibus pharmacis eis admiscent: ut id  
quod affectis partibus influit, repellatur: & abster-  
gentium facultas in altum usq; descendat. Cæterū  
nisi astringentia conterantur in tenuissimum pol-  
linem, magis obsunt, q̃ profint, ijs quę trahendi uim  
obtinēt.

Cephalica  
pharmaca vñ  
de dicta, et quę  
facultate præ-  
dita.

Catagmaticum optimum ab Asclepiade traditū,  
ad confirmanda fracta ossa Argenti spumę, bituminis  
sing. drach. cc. picis aridę, cerę, sing. drach. c. terebin-  
thing, drach. 50. aluminis fissilis, propoleos, singu. dra-  
ch. xxx. ammoniaci thymimatis, drach. xxiiij. ærugi-  
nis, drach. x. olei sextarios quatuor.

Catagmaticū  
Asclepiadis.

Moschionis catagmaticum ad fracturas, contu-

Rrr r ij



Catagmaticū  
Moschionis.

siones, atq; recentia uulnera, aliosq; affectus complures celebre.

Argenti spumę, minam. j.

pice, tantundem. seui uitulini, tantundem. Terebinthina, drach. octoginta. manne thuris, tantundem. cere, drach. xl. pruginis, opopanacis, chalbani, sing. drach. viij. olei cicini, aceti, liquoris sycamini, sing. heminam. pice liquidę heme dimidium. Conficiatur ut decet.

Mina cōtinet  
vncias. xx.

Vncia constat  
viii. denariis.

Cephalicis ad  
quę Medici  
tantur.

Pro mina in presentiarū intelligo vncias uiginti: quarum singulę pendent octo denarios. Sic itaq; continebit mina centum sexaginta denarios.

Proprie autem dicuntur emplastra cephalica, ea quibus Medici in ijs capitis fracturis, quę ad diploen penetrarunt, utuntur, ad extrahenda ex alto, superficiem uersus, non ossa modo, sed his multo magis humores crassos & uiscidos, intus delitescentes. Quare acrimoniam quandā fortiantur oportet. Itaq; catagmaticis cephalica generosiora existunt: quę quidem mista cera, to, carnem possunt producere. Quocirca, sarcoticis quodammodo sunt similia.

Cephalicum  
Hera.

Cephalicum optimum ad capitis fracturas ab Hera descriptum.

Squamę aris, drach. xxv. aluminis, aristolochię longę, sing. drach. xx. ammoniaci thymiamatis, thuris, singu. drach. xxv. myrrhę, drach. xij. seui taurini, terebinthine, pitying, singu. lib. iij. olei heminam. aceti quantum sit satis. Conficito.

Aliud eiusdem, arcens phlegmonē, maximeq; ad fracturas, & puncturas neruorum conducens.

Argenti spumę, drach. xxv. bituminis aridi, drach. c. pice aride, drach. 50. cere drach. 50. resine pitying, drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, æruginis, aluminis fissi, propoleos, sing. drach. xv. olei ueteris, lib. iij. conficito.

Andromachi catagmaticum.

Catagmaticū  
Andromachi.

Argenti spumę, pice, cerę, seui taurini, thuris, sing. minam. pice liquidę, hemina dimidiū. liquoris sycamini.



mini, heminā, terebinthinā, minā, opopanacis, chalbanī, æruginis, sing. drach. viij. ricini heminā. Ammoniaci thymiamatis, drach. xxv. Ex uino austero diluitur.

De emplastris glutinantibus.

Quidam hæc ἐναιμα & τραυματικά nominant: estq; opus eorum coniungere, & diuisas partes conglutinare, reducereq; ad pristinam integritatem. Sunt autem sarcoticis ipsa glutinatoria sicciora. Ad hæc, sarcotica quidem, detergendi uim, sed absq; rosione possident. Glutinantia autem, tantū desiccantia esse debent. Cæterū cicatricem inducentia medicamenta, præter q̃ q̃ astringunt, sicciora etiam sunt glutinātibus. Etenim glutinantium est finis, nullā inter coitura subnasci humiditatem permittere: cicatricem uerò inducentium, non modò hanc prohibere, sed consistentem etiam in ijs, quæ cicatricem sunt receptura, cōsumere: præterea callo obducere, & astringendo obdurare. At sarcotica sanguinem ad refectionem idoneum tam quantitate, q̃ qualitate tuentur. Iam quod nullius sit mordicationis particeps medicamen, purū ulcus cōseruat, si quidem tale illud acceperit. Porro molliora humidioraq; corpora, imbecilioribus medicamentis indigent: ut uehementioribus, quæ prorsus contraria existunt.

Glutinatorium ab Andromacho scriptum, nomine Barbarum.

Picis, resinæ, bituminis, sing. drach. cc. thuris, drach. xxiiij. olei heminam. Conficito.

Aliud eiusdem.

Picis lib. ij. bituminis, ceræ, sing. lib. j. Ammoniaci thymiamatis, mānæ, sing. vnc. vj. cerussæ vnc. iij. olei heminæ dimidium, aceti heminas. iij.

Aliud enæmon Iuliani.

Argenti spumæ, bituminis, cere, picis, brutiæ, sing. drach. so. resinæ frictæ, drach. xv. æris squamæ, drach. xij. thuris, drach. xiiij. chalbani drach. viij. chalcitidis

Rrrr iij

Glutinantium medicaminum usus. Sarcoticorum facultas.

Epuloticorum opus.

Molliora corpora imbecilioribus medicamentis indigent.

Glutinatorium Andromachi, Barbarum nomine.

Enæmon Iuliani



drach. iij. aloes drach. vj. gallæ, drach. iij. myrrhæ tā-  
tūdem. aristolochiæ longæ, drach. vj. aristolochiæ ro.  
drach. iij. olei ueteris, heminas. iij.


Enæmō nigrū  
ab Hera.

Nigrum Enæmon ab Hera conscriptum.

Cere, picis, bituminis, ptyinæ, singu. lib. j. mannæ  
vnc. vj. cerussæ vnc. iij. chalcanti tan tūdem, opopa-  
naxis, vnc. ij. olei semiminam. aceti heminas duas. Cō-  
ficio ut decet. Valet ad diuisiones notatu dignas, ma-  
ximè capitis: ad fistulas, sinus, fracturas q̄s. Cohibet mi-  
rifice sanguinē erumpētē. Canum hominum q̄s mor-  
sibus auxiliatur: ac prorsus phlegmonem arcet.

## G A L E N I P E R G A M E N I D E C O M P O S I T I O N E M E D I C A M E N T O R V M S E C V N- dum genera. Liber tertius.

Putrescentium  
curatio p̄ quæ  
fieri debeat  
medicamentā.



VANDOQVIDEM quæ pu-  
trescunt omnia, ex humiditate & calo-  
re id patiūtur, certè in uulneribus ob-  
noxijis putredini, curationem per sic-  
cantia & refrigerantia moliendā esse,  
semper mecum existimaui. Rursum

apud me contemplatus, frigidum neruis ab Hippocra-  
te inimicum dici, optimum fore medicamen neruorū  
uulneribus intellexi, quod & siccaret, & medium esset  
inter ea quæ calfaciunt, & refrigerāt: uel quod parum  
ad calfacientium latus ab ipso medio recederet. Posse  
etiā calidum abundè esse pharmacū, modo siccandi  
facultate polleret. Quippè calor citra humiditatem hu-  
meātare non potest. Cæterū ubi nudatis neruis me-  
demur, tunc prædictam auxiliorum integram indica-  
tionem assumi ratio est. Vbi uerò pūctis, ita ut partes  
interiacentes sint sang. tenuius pharmacum inuenien-  
dum est, cuius uirtus interiacentes particulas p̄mean-

Nudatū nerui  
quā medēdi ra-  
tionē postulēt.  
Pūcti nerui q̄-  
lia medicamē-  
ta postulent.



do non dissoluatur, sed in altum penetret. Hoc autem facere poterit pharmacū uehementer exiccans. Quod quidem, etiam si non sit in calore & frigore symmetrū, offendere neruum læsum non poterit; quā facultas calfaciendi aut refrigerandi (quæ illi inest) admodum imbecillior reddat, dum particulas neruoso corpori prepositas permeat. Porro inter omnia quæ refrigerandi uim habent, tenuiorum partiū acerrimum est quæ acerrimum: quod etiam caloris modici est particeps. Inter calfacientes autē liquores, qui partiū tenuitate sint præditi, primæ tribuuntur partes Cyrenæo succo. Cæterum si eius facultas non detur, utemur Medico, uel sagapeno uocato, uel euphorbio. Panacis etiam, & tithymallorum liquores, & opobalsamum tenuandi facultatem sortiuntur. Ex terrestribus etiam nitri spuma, aphronitron, beroniceum nitrum, petra asia, eiusque flos, partium tenuitate insigniuntur. Ex metallicis auripigmentum, & sulfur, tum subtilia, tum calida sunt. Quibus succedit misty, æris squama, & chalcitis, parum simul astringentia. Citra calorem uerò manifestum tenuis essentia metallica sunt, spodiū, pompholyx, & psoricū. Subtilis abūde est, & chrysocola. Ex succis, laurinus ualenter calfacit, ac præterea tenuandi uim possidet. Nihil autem minus eo cedrinus calfacit: calore tamen qui sensibus subiicitur, propter substantiæ tenuitatē, illi cedit. Eiusdem generis cum cedrino est lixiuia, quam statim uocant. \* Quæ quidem si ex tenuiorum patium materia uita fiat, cedrinum oleū uirtute superat. Iam ex cerealibus, subtilissimus est eruius, sine insigni calfaciendi uis: lolium uerò, cum insigni. Hordeum nequaquam calfacit. Mediam inter ea materiā obtinent, qualitatibus amara: ut quæ multū tenuibus substantia cedant, & crassi nihil possideant. Igitur medicamentorum materię non semel aut bis, sed frequenter sunt explorandę: quando quidem sensibilibus rerū cognitio, inspectione sedula

Aceti facultas.

Succorum calfacientium differentia.

Terrestria, partium tenuitate prædita.



Sensibilium rerum  
cognitio, in spe-  
culatione sedula  
confirmatur.

Medicamenta  
reperiendi 16.  
Galenus ex omni  
regione cura-  
bit sibi ad fer-  
ti et virgine  
medicamenta.

Nervosarum par-  
tium doloribus  
quid medeat.

Putrescentium  
circa articulos  
partium curatio.

Nervi vulnera  
et curatio.

confirmatur. Cuius rei indicium evidentissimum est, quod gemelli per omnia similes esse nobis visi, differētes appareant istis, qui non per transennam, atque obiter, sed accuratè inspicere eos consueverunt. Itaque herbarum, fruticum, arborumque materiam, prius quam è terra eximatur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uide licet futuri sunt, dum eduntur, dum augescunt, dum uigent. Ex hac namque speculatione assequeris, quando exercependi sint, in siccisque domunculis reponendi. Etenim commodè reponuntur in locis nec subterraneis, nec sub tegulis, constitutis: sed medijs, atque ostia ad meridiem conuersa habentibus: propè quæ tamen reponi medicamenta non debent. Amicos autem omneis adhortor, si artis opera pulchrè obire uoluerint, ut me imitentur, qui ex omni natione quotannis præstantissima medicamenta ut mihi adferantur curo, eo quod perditum illi omnigenarum rerum coemptores, illa indies adulterio contaminant. Conuenit præterea medicum, non modò affectionis, quam singula medicamenta inducunt, qualitatem, sed etiam ipsius (ut ita dixerim) quantitatem coniecturare. Quippè quod humore copioso est auctum, non simpliciter humectari postulat, sed opus est, ut sic citatis quantitas, copie humiditatis respondeat. Porro nervosarum partium doloribus à frigore obortis, unice opitulatur emplastrum ex euphorbio, oleo, & liquata cera, confectum: ad computrescentes autem circa articulos partes, confert cataplasma ex hordei farina & stillatio lixiui paratum. Perfundendæ autem liberaliter partes circumiacentes sunt oleo calente: postea uero, ubi lana sicca, totus mador fuerit exhaustus, humido cerato, & cui euphorbium admixtum sit, illinendæ. Porro secunda die, pro hordeacea farina, miscere eruina consueui: atque ubi iam totum quod computruit exemptum sit, paulatim primò quidem ad carnem gignentia: dein ad obducentia cicatrice, transire. Quando autem mihi



neruus aliquis uulneratus occurrit, interim per liquida pharmaca curationem molior; interim per emplastrum: lanam extrinsecus quæ mollissimam, imbutamque oleo calente, applicans. Quod si medicamentum ex aceto usurpem, aceti modicum oleo admiscens, bis ter uel quotidie soluo, & oleo calente foueo. Si noctes longæ fuerint, etiam in his soluere consueui, idque magis, dum ulcus à medicamentis eroditur. Oleum autem quo fouebimus, satis calens esto: uerum ita, ne uulneratam partem offendat. Nam ut frigidum huiusmodi affectibus aduersissimum est, sic tepens non omnino utile. Nam quemadmodum aqua ipsa, quatenus calet, aut friget, maxime contraria facere nata est, ita quoque oleum. Frigidum si quidem, corpori admotum, perspiratum ipsius obstruit, & prohibet: calidum uero, digerit, extenuatque. Porro ab aquæ usu in tota curatione ita tempero, ut ne attingat quidem ulcus. Proinde, quum sanguis initio statim à uulnerata parte abstergendus est, ex oleo id facere expedit. Iam uero acetum, si quando ipso ad affectos neruos utamur, in se nihil uinosum contineat. Oleum autem omni astrictione uacet, sitque omni ex parte tenuissimum: quale Sabinum existit. Memini autem me, quum alia remedia deessent, neruorum uulnera propoli recenti curasse: interdum etiam antiquiori fermento. Quæ ambo aliquando commiscui.

Vetus etiam euphorbium oleo læuigans, instarque cataplasmatum adhibens, alias tendinem punctum sanauit: id quod, euphorbio recenti adhibito, ne utique successisset: quum calorem magnum, mordicationemque, atque dolorem excitet. Eorum tamen euphorbium est, quæ calorem caducum, atque statim euanescentem sortiuntur. \* Cæterum alijs multis pharmacis accidit, ut pauculis annis eorum uis resoluatur: id quod, post thapsiam, nullo minus euphorbio contingit. Quippe thapsia bimula, expirat penitus: quum euphorbii uires, ad sextum

Tepidum oleum  
cælis neruis non  
congruit.

Aque usum uulneratis esse neruis inimicissimum.

Euphorbium ad  
punctos tendi-  
nes facere.

Euphorbii uis  
cito euanesceat

Thapsia bimula  
expirare  
propterea.



Resinarū diffe-  
rentiæ.

Propolis vires.

Fermenti facul-  
tas.

usq; annum seruari possint. Porro ubi pharmacū cō-  
sistentia simile acopis dictis unctionibus habere vo-  
lueris, oleum sit quadruplū ceræ. Vbi uerò emplastrū  
speciem referet, parem ceræ portionem oleo expedit  
temperare: maximè si sicca & uetusta fuerit: ac tum sa-  
nè ipsi ceræ sic temperatę, poteris sextam partem eu-  
phorbij recentis adijcere: ita ut illius sex drachmæ: ce-  
ræ sex: atq; item olei sex misceantur. Licebit etiam re-  
sing, aut picis, aliquid emplastro ipsi adijcere, ut gluti-  
nosius euadat: tunc tamen minus infundendū est olei.  
Ac resinarum quidem omnium siccissima est, quā aliq;  
phryctem, aliq; colophoniam appellant. Huic succedit  
quæ ex figulinis impura sumit: quā si purges, in phry-  
ctem mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur  
pitynon physema. Ego tamen ad rem propositā phry-  
cte utor, & liquidis. Harum rursus nōnullæ diutius li-  
quidæ permanent, quemadmodum terebinthina: aliæ  
cito inarescunt, ut strobilina: media utriusq; est abieti-  
na. Quin etiā facultate calidior est quidem strobilina:  
mox uerò abietina: deinde terebinthina. Poteris autē  
medicamen quod euphorbium receperit, experiri in  
tuo crure, uel brachio: atq; ita ex affectu quem inferet  
aut remittere ipsum, aut eius uireis intendere: remitte-  
re quidem, mistura cerati: intendere uerò, appposito eu-  
phorbio. Quod si propolim pinguem habueris, eam om-  
nibus resinis aptiorem fore tibi intelligito: ut quæ ua-  
porosam spiritus crassitiem, humoresq; superfluos eli-  
ciendi, atq; ex alto foras extrahendi, à natura uim ha-  
beat: quę facultas ueteri etiam fermēto inest. Iam uerò  
ad uulneratos nervos nōnunq; sum usus sulfure uiuo,  
sicuti & arsenico, & sandaracha, & calce tū uiua, tum  
extincta, lotaq; & illota: singulis nimirum horum per  
se cum tetrapharmaco temperatis. Porro Empirici ex  
casu unum aliquod simplex medicamentum utile ad  
proposita inueniunt. At rationalis methodus, plurima



simul inuenit, & uarias ipsorum cōpositiones. Etenim quæ ex alto humores educere, digerereq; possunt, neruorum uulneribus sunt ex usu. Quandoquidem uerò nonnulla horum qualitates habent immoderatas, alia eis immiscenda sunt, quæ ipsorum excessus, illæsa facultate, retūdant. At rectè hoc fieri nequit, nisi cuiusq; medicamenti, nō modò qualitatis genus, sed ipsius etiā qualitatis gradum, quantitatem uē cognoscas. Quocirca Empirici, quod ignorent naturam simplicium, homogenia tantūm, atq; similia cōmiserunt; quemadmodum alij pleriq; q̄ excessus quantitatem non assequantur. In uniuersum autem, pharmaca liquidiora, minus molesta sunt, quum alijs, tum uel maximè neruorū uulneribus. Cauendum tamē perpetuū est, ne aquis læsa particula respergatur. Verūm qui pulchrè neruorum uulneribus prospecturus est, etiam particularum naturæ sit peritus oportet. Est autem curatio cōmunis, sicuti & periculum par, tum in contussis ac uulneratis neruis; tum in sic affectis tendonibus. Porro in uulneribus iuxta femoris longitudinē factis, deligatura uulnerati musculi partibus inuicem contrahēdis sufficit. Per transuersum uulneri accepto, nihil deligatura contulerit; sed sola sutura totum opus absoluitur. Has igit̄ nisi quis altas faciat, musculi partes permanebunt in-glutinatę. Consuēdg etiam sunt membranæ ipsæ cum musculis quibus cohærent. At tendines, membranarū instar extensos, & dilatatos, non mediocri cum periculo consues. Ligamenta autem, quomodocunq; afficiantur, ab omni sunt remota periculo: utpote īsensilia existētia, & ex ossibus, non ex musculis, ut tendines, orta; neq; ex cerebro aut spīnali medulla, ut nerui. Igitur medicinæ partes, mutuam opem requirunt; tum quæ manu, tum quæ medicamentis, tum quæ uictu medetur; maximeq; illa quæ manu curat, reliqs duabus indiget. Porro pūctiones neruorum angustā cutis diui-

Neruis vulne-  
ratis conferre,  
quæ humores  
ex alto educe-  
re, ac digerere  
possunt.

Empirici cur si-  
milia tñ me-  
dicamenta cō-  
miserunt.

Aquam neruis  
lēsis esse inimi-  
cam.

Tēdinum atq;  
neruorum ante  
ctus æque veri-  
culosos esse, eā-  
dem p̄ medēdi  
rationē desyde-  
rare.

Femoris vulne-  
ra glutinandi  
ratio.

Tendines non  
absq; periculo  
consui.

Ligamentorū  
affectus cur pe-  
riculo vacent.  
Medicinæ par-  
tes mutuā opē  
desyderant.



punctiones ner-  
uorum angustæ  
nō iisdem me-  
dicamentis cu-  
ratur, quibus ner-  
ui nudari.

Punctionū an-  
gustæ oris quo  
mō dilatandæ.

Neruis vulne-  
ra is quæ me-  
dicamenta cō-  
gruant.

Medicamenta  
duo, eiusdē qui  
dē generis, sed  
facultatib⁹ dif-  
ferentia, ad vul-

tionem habentes, non eodem curantur medicamento, quod nudato nervo auxiliatur: sicuti neq; id quod puncturis medetur, nervo nudo est ex usu. Quippe multo calidius est, magisq; mordet, q̃ ut nudus nervus ipm perferre possit. Præcipuè autē danda opera est, ut oræ angustiorum punctuum apertæ sint, quo calidum medicamē admodum extrinsecus, per eas vapores eliciat: attrahēs humiditatem circa affectum locum intus delitescentem. Quamobrem orificium duabus in cute sectionibus ad rectos angulos diuidere oportet.

Cōfectiones medicamētōrū ad nervorū vulnera.

Ex metallicis astringentia vitanda sunt, præsertim ubi nervi sunt puncti. Detergentia autem conferunt: quæ tamen sub æstiuo sole, ex acerrimo, vetustissimo, substantiaq; tenuissimo aceto leuigare oportet, quo le- licius crassitudo partium, qua omnia metallica prædita sunt, auferatur. Quanto autem longiori tempore attrita fuerint, hoc tenuiorem consequentur substantiam: eruntq; aptiora angustis vulneribus: quemadmodum in nervis carne nudatis, admodum tenuia, exedētiaq; cauenda sunt: quibus sanè pastilli Andronis, Polyidæ, & Pasionis congruunt, ex sapa, quam Sargon uocant, appliciti. Ad punctos autem nervos, equidem compositis medicamentis omnibus, illud præstantius semper esse usu ipso cōperi, cui copiosa grisei squama iesset: de- in chalcitis combusta: postea misy. Porrò ubi nervus qui nudus erat, ab imposito medicamento iam tectus fuerit, linamētis extrinsecus, unum aliquod ex his, quæ ad angusta conueniunt vulnera, superponendum est: aliudq; eiusdem materiæ toti affecti partiæ circumdandum, ita ut sanas quoq; partes, præsertim superpo- sitas, plurimum comprehendat. Quum autem perma- gna differentia humanorum corporum sit, ob idq; uni- cum medicamentum omnibus conuenire non possit, duo semper in promptu habeto, alterum nempe ua-



lentius, sed ex similibus genere confectum; alterum mi-  
tius & blandius: quæ inuicem temperans, dum postu-  
labit usus, pro uarietate misturæ, permulta alia media  
inter ipsa constitues. Esto igitur ualentissimum metal-  
licū tale. Chalcitidis crudæ, partē. j. misyos crudi, par-  
tes. ij. gris squamæ, partes tres. Mitissimū hæc recipiat,  
misyos, chalcitidos, utriusq; combusti, partem. j. squa-  
mæ, partes quatuor. Medium sit tale. Misyos, chalciti-  
dos, æruginis, cuiusq; usti, partem unam. æris squamæ  
partes tres. Præterea ceræ in ualentissimo duplum; \*  
in mitissimo duplum, atq; ipsius dupli dimidium mi-  
scetur: at in medio, duplum, ac ipsius dupli quartā par-  
tem miscere oportet. Quum igit ualidissimum ex sex  
partibus constet, duodecim illi ceræ partes miscebis.  
Imbecillimum autem, quandoquidem ex senis etiam  
cōstabat, octodecim (quod duplum, ac dupli dimidiū  
est) recipiet. Mediocri uerò dimidium harum partium  
omnium inde. Atqui octodecim & duodecim trigin-  
ta partes constituūt, cuius numeri dimidium continet  
quindecim partes. Tot igitur mediocri medicamento  
adijcientur ceræ portiones (id quod erat duplū, & du-  
pli pars quarta) siue ex drachmæ sint, siue uncia, siue  
etiam libræ. Porro mensura qua Romani metiuntur  
oleum, est cornea, discretaq; circularibus lineis, totam  
ipsam diuidentibus in duodecim partes. Atq; integra  
quidem mensura ab eis appellatur libra; ut eius duode-  
cima portio, uncia. Iam uerò prædictis pharmacis om-  
nibus, iuxta ceræ portionem, addatur oleū essentiæ te-  
nuioris, minimeq; alstringens: quod quidem ceram ip-  
saz dimidio superet: ita ut octo illius uncijs, duodecim  
olei misceantur. Quin etiā ubi metallica pluribus die-  
bus in mortario trita ex aceto fuerint, cōmodè illis thus  
candidissimum atq; pingue miscetur. Cuius quantitas  
medicæ omnium portioni sit par: quam licebit tibi au-  
gere aut minuere, pro ut uolueris efficere medicamē-

neratos neru-  
cur in .pruptu  
habere sempe  
oporteat.

Mensura olei  
erat olim apud  
Romanos cor-  
nea.



Resinarū differe-  
rentiæ.

Emollientibus  
omnibus inef-  
se putrificum  
quid.

Chalbanū pun-  
ctis nervis con-  
ducit.

Metallica om-  
nia dolorem  
excitant.

Adeps tenuiū  
partium, lenit  
dolorem.

Euphorbiū ve-  
tus recentiori  
esse inferius.

Medicamē ex  
euphorbio ad  
neruorum pun-  
ctiōnes cōmo-  
dum.

tum mitius, aut acrius. Cerae etiam oleo liquatae, pote-  
ris aliquam resinam ex predictis injicere; sciens acrius  
futurum pharmacū, strobilina injecta; mitius, terebin-  
thina: mediū utriusq; abietina. Ex harū genere quoq;  
est larix, ceterū predictis humidior: liquidæ piceæ  
substantia similis. Miscebis igitur cere, sextā unius di-  
ctarum resinarum partem, si vis ut medicamentum em-  
plastri formam retineat. Chalbani uerò æquale thuri  
pōdus indes, ubi mitissimum reddere statuis: dum ua-  
lentius, dimidium: quando ipsorum medium, id quod  
inter æquale & dimidium est. Inest porrò chalbano, ut  
emollientibus omnibus, etiam putrificum quid: quare  
nudatis nervis non usq; adeò cōuenit. At si nudus ner-  
uus non sit, haud mediocriter permistio ipsius ad dolo-  
rem leniendum confert. Omnia quippe metallica exas-  
perant, doloremq; excitant: ut ex humidis etiam, ace-  
rum. Quare dolori ab his excitato, plurimum auxiliae  
fotus ex oleo & chalbano mistis, administratus. Nihil  
autem minus chalbano dolorem lenit adeps tenuitate  
substantiæ p̄ditus: qualis à feris, et agrestibus anima-  
libus sumitur. Nam animalium quæ conclusa in urbi-  
bus degunt, adeps est & humidior, & crassior. Ex his  
igitur quæ leniant dolorem, habere aliquod medica-  
men expedit, quod ex metallicis composito possis in-  
terdum miscere.

De medicamentis ex euphorbio confectis.

Vetus euphorbium recentiori longè est inferius. Si  
igitur anniculum sit, etiam Cyrenæo succo, quē nunc  
habemus, & cuius irrigatione stirpes augēt, & succu-  
lentas reddūt, magis excalfacit. Porrò colore quidem  
vetus recenti flavidius pallidiusq; apparet; substantia  
durius, & siccus. Conficitur autem ex recenti euphor-  
bio calfaciens medicamentum in hunc modum. Eu-  
phorbi, vnc. j, cere, vncias. iij. olei, vnc. xij. quo smeg-  
mate intrepidè uti ad puncturas poteris, dum uereris  
ne oscula



ne oscula ipsa \* cōnieant. Quòd si imbecillius fuerit euphorbium ipsum augenda eius mensura est, pro imbecillitatis ratione. Cæterùm confectura cerā euphorbij triplicatam continens, aliarum est ualētissima, quū illud recens miscetur: quincuplam autem recipiēs, in ualidisima. At quadruplā capiēs, medio inter utraq; gradu consistit. Quòd si unguenta proponas facere, qualia ἀκοπῶ nuncupantur, oleū ceræ quadruplum imiscebis: si uerò, ut in fracturis, liquidum ceratum parare, duplum. At emplastron medicamen cupiens conficere, oleum pari mensura ceræ immisceatur, si quidē ambiens fuerit calore temperatus. Si naudem ille frigidus sit, cera autē uetus & arida, paulo ampliori misceri debet. Ut autem tenacius hæreat, terebinthinam, aut colophoniam, soleo emplastro adijcere. Pix etiam, cerati consistentiam tuetur. Multò autem præstiterit medicamentum, si resinæ, picisq; loco, propolim ceræ parem adiunxeris. Quæ si pinguitudine careat, cupimusq; ut adhæreat pharmacū, terebinthinam, uel laticem, uel syncomistēm pineam, uel resinas sua sponte fluentes, miscebimus.

Medicamen confectum ex liquabilibus.

Ex aceto citra ignē liquefcit ammoniacum thymia-  
ma, sagapenum, et opopanax. Igni uerò soluuntur pro-  
polis, cera, resina, & consimilia: quæ in duplici uase li-  
quare est melius; nempe quum in cacabo aquam cali-  
dam continente, incumbenteq; prunis, alterū uas con-  
sistit, præter liquabilia etiam chalbanum continens. Valentissimum igitur ad uulneratos neruos medica-  
mentum sit huiusmodi. Opopanaxem ex aceto dissolu-  
tum diutius conterito. Postea liquefacta illi super igne  
propolim, chalbanum, & resinam terebinthinam mi-  
sceto. Singulorum itaq; aliorum pars una esto. Propo-  
leos recētis, pinguisq; sex. Qua si careas, eius loco pi-  
cem pinguem indes: qualis est brutia. Quòd si hæc nō

Medicaminū  
varias consistē-  
tias parandi  
ratio.

Liquādi medi-  
camenta in du-  
plici uase, rō.



**Medicamē ex  
pice, vtile ad  
canis rabidi  
morsus.**

ad sit, uteris terebinthina. Ego nonnunquā uel solum medicamentum ex pingui pice confectum imposui, quo etiam ad canum morsus utimur. Id autem recipit, picis, lib. j. opopanacis, vnc. iij. aceti, in quo illa coquuntur, sextarium Romanum. Etenim puncturæ oras cōniungere nō sinit. Sic tñ cōposito, in duris tantū utemur corporibus. Nā in mollioribus, ex aliquo molliori, sed digerente, unguēto, uel oleo, liquādum est. Quōd si loco opopanacis, sagapeno prius in pila trito ex aceto, liquefactā resinam, propolim, & adipem quandā acriorem adijcias, eiusdē generis medicamē habebis. Mollius tamē est, quod ex resinis, propoli, seu is, ac cera colliquatis, absq; aceto, conficitur. Cæterū quod indec seuū, sit acre: quale est quod ab agrestibus animalibus sumitur, quodq; uetustum existit. Porro ex medullis, ceruina, uirulinaq; antecellunt.

**Medicamē ex  
colūbino ster-  
core.**

De pharmaco ex columbarum stercore cōfecto: Columbarum turricularum sterminus acris est: quo interim ruri sum usus in adoloscēte, nerui uulnere affecto. Cuius sanē tum cōpositio, tū usus, idē est, qui medicamini ex euphorbio inest: alijs quidem eodem modo se habentibus: sed euphorbi loco, stercore indito.

De medicamento ex herbis confecto.

**Medicamē ex  
herbis confec-  
tum.**

Ex herbis etiam tenuium partium, amaritudinem absq; astrictione, aut acorem modicum, referētibus gustu, haud inidoneum ad uulneratos neruos confici medicamen potest. Tales enim sunt dictamnium, amaracum, aristolochia, polium, argemone, chamæpitys, centaureum, atq; id genus alix: quemadmodum etiam radices omnium aristolochiarum, dracunculi, cucumeris agrestis, bryoniae, altheæ, iridis, acori, mei, asari, phugentianæ, & panacis: quæ omnes, perinde ut collyria arida læuigari in tenuissimum pollinem debent. Nam quod crassa est substantia, neruis uulneratis conducit nihil. Læuigatum autem medicamen, alio quod cerati



modum habeat, est excipiendum, idq; ea temperatura, quæ in euphorbio prius indicata est.

De sumptuosis pharmacorum cōpositionibus, uulneratis neruis congruentibus.

Ijs autem qui odoratis & pretiosis oblectantur medicamentis, in hunc modum illa soleo conficere. Cinnamonomi, dictamni, mari, singulorum drach. xl. amara-  
ci pauxillum. Hæc redacta in tenuissimum pollinem, cum cerato ex opobalsamo optimo, & cera Tyrrhenica facto confundo. Debent autem ceræ partes octo: opobalsami decem, in id ceratum coire. Adijcio etiam partem unā terebinthinæ odoratæ, ut medicamen non sit friabile, sed sibi mutuo cohæreat. Sed ex eodem cerato, & liquore cyrenaico similiter aliud medicamen compono: mistura pro portione euphorbio facta: tertiumq; aliud ex utrisq; temperatis cōflatum: quartum deinde, quod in se myrrhā stactem recipit. In quibus autem neruus est nudus, ibi ceratum ex cera quæ uocatur myreplice, & unguentis apud Romanos foliatis, & spicatis dictis, cōpono, duodeciamā partem pōpholygis ei admiscens. Licet autem ex Tyrrhenica cera id conficere; quam solā nihil etiam prohibet ex nardo optima liquefacere, idq; in duplici uase, quod in omnibus unguentis sit cōmune præceptum. At raso cerato, spicæ nardi, amomi, folij malabathri, & elotæ pompholygis, pares singulorū portiones miscebis. Etenim in pūcturis, acriora pharmaca ex usu sunt, quæ uulnus apertum conseruent. Denudatis autem, mediocri astrictione, cū digerendi uirtute, absq; morfu, p̄dita offerre cōuenit. At amomū, astrictione cuiusdā est particeps. Magis autem ipso nardi spica, & malabathri folium.

Quæ alij scripserint ad sananda neruorū uulnera.

Quidam nostræ ætatis Medicus utebatur medicamento, similiter meis confecto ex metallicis. Recipiebat enim ceræ, vnc. vj. olei, vnc. ix. misyos, drach. vj.

S s s ij

Medicamina  
sumptuosa vul-  
neratis neruis  
congruentia.

Unguenta om-  
nia liquāda es-  
se in duplici  
vase.  
Puncti nerui, q̄  
nudi, acriora  
pharmaca po-  
stulant.



Digerentia q.  
Mitigatoria q.

chalcitidis, drach. j. squame æris, vnc. ij. S. thuris, vnc. j. S. chalbanī vnc. j. cera & chalbanum liquata, metallicis aceto intritis superfunduntur. Porro si neruorum uulnera non comitetur phlegmone, molliora humidioraq; statim a principio sunt potiora medicamentis durioribus, ac siccioribus: præstatq; liquata ipsa in digerente quopiā, uel mitigatorio medicamine administrare. Voco digerētia quidem uetus oleum, & ricinum, & sycionium: mitigatoria autem, rosaceum, chamæmelinum, & quod ex althea conficitur. His fortiora, eoq; durioribus corporibus magis idonea sunt, quod ex cucumeris agrestis radice oleo decocta exprimit; & quod ex iride, bryonia, & aro paratur. His ualentius est, ex dracūculo, aristolochia, et panace factū. Nos frequēter uſi oleo sumus ex abietis semine, populiq; flore pfecto.

Claudij Philoxeni Ægyptia, neruorum uitijis,  
alijsq; congruens affectibus,

Ægyptia Cla  
udij Philoxeni

Argenti spumę, cerę, sing drach. lx. ammoniaci thymiamatis drach. lxxx. propoleos. drach. xl. resine sicce, terebinthinę, squamę æris, thuris, sing. drach. xvij. lanę succidę exustę, squamę stomomatis, sing. drach. viij. opopanax, drach. iij. ricini heminas tres. Conficito artificioſe.

Fuscum Andromachi, contra puncturas.

Ammoniaci, cerę, terebinthinę, æris cōbusti, sing. drach. viij. picis aridę, drach. xl. lithargyri drach. iij. aloes indicę, aristolochię, chalbanī, sing. drach. ij. gruginis drach. j. thuris, drach. ij. olei hyeme quartam heminę partem: æstate octauam: aceti tres cyathos, quibus ammoniacū dissoluatur. Conficito.



**G A L E N I P E R G A**  
**M E N I D E C O M P O S I T I O N E**  
**M E D I C A M E N T O R V M S E C V N**  
 dum genera, Liber Quartus.



**Q**UANDOQVIDEM ex dysepuloticis quædam, sanici humorumq; ulceratis partibus influentium uitio, ægrè cicatricem admittunt: quædam ipsa affecta sede influentem succum quamlibet probum corrumpente: secunda ratione ulcera dysepulotica & cacoethe propriè nominant: in quibus interim totam partem affectam excindere, uel adurere nonnulli coguntur, aut medicamentis crustam inducētibus, aut igne utentes. Quum autem ampla utrinq; latitudo sit, in eo q; alterum altero magis dysepuloticum malignumq; est, tot sanè dyderantur auxiliãtia pharmaca, quot fuerint ipsorum ulcerum differentia. Quare duo, ut minimum, quæ idè polliceantur, eandemq; facultatem ostendant, differant tamē maximi minimiq; ratione, in promptu adesse illi cōuenit, q; oia id genus ulcera cōstituerit curare. Cæterū ubi nullus uitiosus succus ulceratas ptes infestat, tale requiritur pharmacum, quod influentem quidē humorem, repellat: infixum autem parti, discutiat. Atq; hæc sanè uires contrariæ præstant. Siquidem influxū reprimunt astringentia: impacta digerunt, quæ trahendi potestate sunt prædita. Porro quæ astringunt, maior ex parte exasperat, atq; hac occasione molesta sunt. Trahentia uerò ac digerentia ex alto humores, non citra acrimoniam id faciunt. Ac acrimoniam dolor aliquis necessariò sequitur, mordens ulceratam particulam: unde influentes humores irritari contingit, ac p̄inde in ulcere phlegmonem excitari. Ex quibus liquet medicamenta dysepuloticis, malignisq; ulceribus cō-

Dysepuloticorum differentia.

Vicribus tot dyderari pharmaca, quot ipsorum sunt differentia.

Viceratarum partium, quas non infestat uitiosus succus, curatio.

S M iij



Dyspepiloticis  
congruentia me-  
dicamenta, cur  
sint difficillima  
inuentu.

grua, esse q̄ difficillima inuentu. Inuenienda tamen ali-  
qua eorum materia est, qua ulcus citra dolorem sicce-  
scat: q̄d accuratè fieri nulla ratione licet, ignorante me-  
dico, quem effectū ad motū medicamen ostenderit.

Quippe ex erodente simul & astringente, ualidum  
conficitur pharmacū. Cæterū sordes humorq; ulce-  
ri incumbēs, pharmaci rosionem exoluunt. Itaq; per-  
pendendum est, quantum primus usus humiditatis ac  
sordium in ulcere desiccauerit: atq; ita secundum, ter-  
tiumq; uti illo debemus, donec siccum & purum ulcus  
ipsum appareat. Vbi uerò id tale conspexeris, ad aliud  
medicamentum te conferes, eiusdem quidem speciei,  
sed priore imbecillius. Scire autem oportet, medicame-  
ta ipsa non alia ratione mederi ulceribus, q̄ q̄ in exul-  
cerata particula eam siccitatem inducant, quam for-  
tiebatur, quum se haberet secundum naturam: id quod  
factum itelligimus, ubi neq; tenuis amplius sanies in-  
fluit, nec pus producitur. Reuocanda igitur ad memo-  
riam sunt ea que citra morsum exiccant: cuiusmodi cō-  
plura metallica existunt. Meminisse etiam oportet, cō-  
busta, & lota, acrimoniam, quam prius habebāt, amit-  
tere: ac proinde ipsis utendum esse, in ijs qui molli car-  
ne sunt præditi, admodumq; ad sentiendum prompti,  
necnon caco-chymi. Nam in alijs corporibus illita etiā  
usurpare licebit. Siccant igitur modicè, Lemnia sphra-  
gis, cadmiaq; præsertim que spōte nascitur: quam sub  
gestiuo sole pluribus diebus ex aceto, aut uino giluo pel-  
lucidoq; interens, exiccātiorem reddo. Chalcitis com-  
busta, q̄ cadmia, ualentius siccatur. Per se autem nec cō-  
busta, si administret, crustas excitat. Lotam igitur ip-  
sam, deinde siccatum habere est satius. Minus, enim lo-  
ta q̄ combusta desiccatur, tum longè mitior est, minusq;  
mordax. Per simile huic medicamentum est etiam gru-  
go combusta. Nam quæ ignem non est experta, fortis-  
simum medicamentum est, sicut chalcitis. Verū hec

Ulcibus qua  
rōne medica-  
menta medeant

Vita & lota,  
medicamenta,  
acrimoniā, quā  
prius habebāt  
amittere, ob id  
q̄ ipsis utendū  
esse in mollior-  
ibus & caco-  
chymis corpo-  
ribus.

Chalcitis cru-  
stas excitat.



nonnihil etiam astringit, et ea multo magis chalcathū, quod inter metallica maximè siccatur. Misy autē & fori, chalcitidi sunt cognata: tenuius tamē misy apparet, minusq; mordax & urens: crassius fori: & utrisq; siccatur imbecillius: quemadmodum & stimmi maiore astringendi, siccandiq; uim, ac fori, possidet. Porro diphryges ulceribus ægrè humoris uitio ad cicatricem uenientibus, aptissimum medicamē existit: ualidè nāq; siccatur, & si sit mordax modicè. Ad hæc præter acrum qualitatem, tum potētiā, uim astringentiam possidet. Iam omnes differentiæ aluminis, ulcera satis exsiccant, generosè astringentes: quare nemo solis ijs ad ulcera utatur. Igitur quæ plethora, uitiosoq; succo laborant corpora, quæq; tenera carne prædita, & ad sentiendum maximè prompta sunt, faciliè ex morfu, rosioneq; phlegmonē contrahunt: quare mitiora medicamenta desyderant. Cuiusmodi sunt sarcocolla, ichthyocolla, chrysocolla, plumbum ustum, fori, stimmiq; similiter etiam cōbusta. Insuper plūbi scoria, probè siccatur: quemadmodū ferri squama: quæ etiam abstergit, purgatq; unde pura ulcera reddit: quod reliquæ squamæ nō possunt. Quare si hæc omnia medicamēta arida ulceribus malignis, contumacibusq; insperferis, mirificè uidebis citra rosionem ea desiccari: sicuti ubi buccinorum testas concrematas, purpurarum, ostreorū, aliorumq; id genus similiter adhibueris. Lapis etiam diaphanes, siue specularius dictus, leniter ac sine morfu exsiccat. Eiusdem facultatis est uicrum ustum. Quinetiam Ægyptiæ spinæ fructus, galla immatura, rhœon, malicorium, siccādi & astringendi facultatem sortiuntur. Aristolochia etiam, iris, acorum, artemisia, panacis radix, argemone, chamæleontis nigri radix, cyperus, dracunculus, & gladiolus, affatim siccant. His euidentius adhuc centaurium & polium: quibus paulo imbecillior est terra cretrias dicta: uti ualētior, uocata ampelitis. Porro gru-

Chalcathū

Diphryges

Alumine sole  
cur non sit ad  
ulcera utendū

Siccantia citra  
rosionem quæ  
sint.

Siccantia simul  
& astringentia.

Scilicet iiij



Viceribus con-  
tumacibus ad-  
uersari tū oleo-  
sa, tum acria.

Vicera quomō  
sint tractanda.

Deligatura vi-  
ceribus qualis  
sit adhibenda,  
& quando sol-  
uenda.

Repellentia eē  
applicanda re-  
gioni suprapo-  
sitæ viceri.  
Varices quan-  
do excidendæ  
sint.

go ignē non experta, calx uiua & illota, & molle aphro-  
nitrum (quod reuera aphronitrum est) sola per se non  
admovent ulceribus. Nihil autem nobis in prædictis  
ulceribus tam euitandum est, q̃ tum oleosa & mollia  
medicamenta, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ  
scirrhos emolliunt: tum acria, ut piper, zingiber, sina-  
pi, & alia id genus.

Medicamentis prædictis quomodo sit utendum.

Vbi igitur ficcum aliquod pharmacū ulceri impo-  
nere est animus, sordes prius sunt exprimendę, molli,  
puro, atq; sicco linteolo. Medicamento iam indito, pla-  
tysma ex emplastro labris attenuādis cōmodo, extrin-  
secus superdandum est. Huic rursus linamentum un-  
diq; æquale foris iniiciendum: cui spongiā ex aqua aut  
uino tinctā applicabimus: quæ ut frigida maneat per-  
petuū, per assiduum frigidæ fortis curabimus. Porro  
deligatura ipsa in ulcere inchoanda est, atq; illinc du-  
cenda uersus partes supernas: quam tertio quoq; die,  
non singulis, soluere expedit. Tunc autem si ambiētes  
uulcus partes aliquid phlegmones referāt, meo Phœ-  
nicino emplastro liquato ex oleo, cui plurimum uini  
astringētis permistum sit, externas platysmatis partes  
q̃ latē imbuere expedit. \* Verū non ex obuio quouis  
oleo phœnicinum liquare oportet. Sed si rubor quidē,  
atq; omnino caliditas dominetur in adiacentibus ul-  
ceri partibus, ex aliquo astringentium atq; refrigeran-  
tium id solues: cuiusmodi sunt myrteum, melinum, &  
omphacinum. Sin durities aliqua conspiciatur, oleo ue-  
teri, uel ricinino liquandū est, Tutius autem fuerit, uel  
si nihil in ambiente uulcus loco uitiosi appareat, super-  
positæ regioni ipsum medicamē apponere, ut repellat  
si quid prius uel prauū, uel plus q̃ par est, influat: ma-  
ximè quum in crure uulcus obortum, superpositam ha-  
bet uaricem. Quæ dum sanguine melancholico turget,  
excidenda uenit: quāuis iuxta excisionem ipsius, uulcus



malignum & contumax interdum oriri solet. Igitur in id genus uitij præstat, uiribus egri consultis, à sectione uenæ auspicari: dein pharmaco purgare melancholicum succum, simulq; etiam pituitosum uacuare: quoniam is quoq; interdum unà cum melancholico influit, dum uarices gignuntur. Postea uenam ulceri suprapositam in longum scarificare cōmodum est. Vbi abunde uacuaris, ei ipsi uenæ sectæ, prius medendū. Postq; exactè iam cicatricem uidetur recipere, tunc aggredere maligni ulceris curationem. Iam uerò lien nonnūq; malè affectus, uitiosi talis humoris est author: sicuti & iecur: quibus ubi in primis consultum fuerit, sic tandē accedere ad curandū ulcus, oportet. Pari modo si uersum corpus plethoricum, cacochymum ue existat, id prius uacuare, expurgareq; expedit, q̃ ulceri medicamentum admoueas. Cui quidem dum mederis, à ualētioribus absterforijs pharmacis ad mitiora, lenioraq; digredere, si ulcus adamussim esse purū uideatur: quē admodum in sordidis ad magis abstergentia transire conuenit, nisi ex rosione medicamenti sint facta sordida. Sæpe siquidem ab acrimia medicamēto colliquata & soluta caro, in uitiosam saniem degenerat. Cæterū cautitas ulceris maior, oraq; rubentiores, & calidiores effectæ cernuntur, quum ob medicamenti acrimoniā ipsæ sordes acrescunt.

#### Compositio emplastrorum.

Quandoquidem malignorum & difficulter admittentium curationem, ulcerum, summus scopus est, ut medicamentum citra morsum exiccet, aqua uerò & oleum maximè omnium humectant, ab eis abstinere oportet. At cera deligenda est recens & pinguis: qua in sole emollita, aut apud ignem subacta, et in calidam aquam immersa, arida medicamenta prædicta excipimus. Mediocre autem medicamentum fiet, si quarta pars metallicorum ipsi ceræ adijciatur: ualētius autem

Ulceris cui uari-  
rix incumbit,  
curatio.

Sordes ab acrimia  
medicamento  
excitatae, quo-  
modo discernē-  
dæ ab iis quas  
ulcus, propria ra-  
tione, produxit.  
Ulceribus con-  
tumacibus, cur-  
oleum & aqua  
aduersentur.



Vlcenibus con-  
tumacib<sup>9</sup> phar-  
macum tempe-  
ratū describit<sup>r</sup>.

si tertia. Etenim quum haud exiguo discrimine inuicē corpora differat, unum omnibus medicamentum rectē pręparari non potest. Erit ergo temperati phar-  
maci compositio huiusmodi. Vtriusq; æruginis, æris  
pūsti, sing. drach. j. aluminis scissi, drach. s. cere, dra-  
ch. x. conficito. Minus autem mordebit si loco alumi-  
nis, integrā diphrygis drachmā adicias. Quodd si expur-  
gare sordes consilium sit, sic conficiemus. Aeris, æru-  
ginis ustæ, diphrygis, sing. drach. j. æris squamæ, dra-  
ch. s. ceræ pinguis, drach. x. misceto. Cæterū si cera  
ipsa sit siccior, emollienda est aliquo astringente oleo,  
uel larice, uel terebinthina.

Ad chironia & difficilia ulcera medicamen-  
ab Asclepiade proditum.

Vlcenibus dif-  
ficilibus, phar-  
macum Ascle-  
piadis.

Æris squamæ, vnc. j. æruginis rasæ tantūdem. ce-  
ræ selibræ. resinæ laricis, vnc. s. Quæ liquari possunt,  
aridis affunduntur: quibus exceptis, ac curiosē emolli-  
tis utitor. Cæterū platysma exiguum soli affectū par-  
ti, ut ulcus tantū comprehendat, imposito. Ambien-  
tes autem particulas pharmaco quod phlegmonem au-  
ceat, circundare oportet. Inter curandum tertio quoq;  
die soluere; dein fomētis mitigare: ipsumq; emplastrū  
quod platysma uocatur à latitudine, abluendo emol-  
lire, ac rursus imponere, donec cicatricē inducere inci-  
piat. Ego certē Attico nonnunq; cæsypo ceram tempe-  
raui. Meminisse autem oportet, qualitates omnium ui-  
cinorum corporum, mutuo in se agere: etiamsi alterū  
ipsorum multo ualidius sit. Vnde processu temporis  
quodammō euadunt similes. At ubi qualitas medica-  
menti curando corpori specie similis fuerit, maior uti-  
litas sequitur. Porrò diphryges, si uel solum insperga-  
tur ulceribus quę difficulter cicatricem admittunt, p-  
bè illis medetur: item & æs combustum. Aerugo autē  
exedit atq; mordet insigniter. Indem calx ignem non  
experta, quū insigniter mordicet, exigua portione alijs

Vicinorū cor-  
porum qualita-  
tes in se agere  
muruo.

Æruginis fa-  
cultas.  
Calcis uires.



medicamentis à nonnullis miscetur. Extincta medio-  
cre est pharmacum. Elota prorsus lene & mordacita-  
tis expers.

Pharmacum ad mīiōra ulcera cicatrīce inducēda,  
ab Andromacho scriptum. Cadmīg tosta, lib. j. chal-  
cididis usta, tātūdem. ceræ lib. iij. resinæ aride, lib. iij.  
myrtei, lib. iij. Vinum miscetur aridis. Quum autem  
ad maligniora ulcera ualentioribus utēdum remedijs  
sit, ut imbecillioribus ad mediocria: aliud medicamē-  
tum subdā, quo utor ad dysepulotica. Aeruginis, &  
squame, sing. vnc. j. ceræ vnc. viij. misceantur. Si igit  
cauum sit ulcus, indito medicamento repleatur. Post  
hoc rursus aliud platisma super accōmodabitur, quod  
& labra comprehendat. Huic deinde linteus frigida  
madens tātus undiq; obijcitur, ut medicamentum oc-  
cultet. Postremo spongia mollis, fascia ex linteo exce-  
pta, uel semel, uel bis, affectā partem orbiculatim am-  
biente, tantæ magnitudinis, quo totum ulcus cum la-  
bris, ac superpositorum ipsis aliquid, subiectorumq;  
complectatur. Deligatio autem ipsa à duobus initijs  
fiat. Vocāt sic quoties tota pars media uinculi affecto  
loco incumbit: utrūq; autem crus in oppositam regio-  
nem deducitur. Vbi hæc primo die peregeris, altero  
aquam frigidam per spongiā irrigato. Si ambiens aer  
calidus & siccus fuerit, his hoc ter'ue in dies singulos  
est faciendum, ac deligatura tertio quoq; die soluen-  
da: per hyemem, quarto. Affectus autem ipse indica-  
bit, num fortius, uel mollius, uel simile sit imponendū  
pharmacum. Emolles ipsum paululo myrtini, aut ro-  
facei, aut melini, aut lētiscini, aut mastichini, aut cyprī-  
ni instillato: Validius reddes, aliquid squame, aut eru-  
ginis addens. Aliud ad obducenda dysepulo-  
tica aptissimum. Chrysocollæ, squamæ, sing. drach.  
ij. ceræ drach. vj. diphrygis, drach. ij. lithargyri, drac-  
viij. Confundito. Aduertendum autē est, mitia phar-

Vlcera mali-  
gniora, valen-  
tioribus egent  
remedijs, imbe-  
cillioribus au-  
tem, mitiora.

Deligatio ex-  
ulceratis parti-  
culis q̄lis mo-  
lienda sit.



Mitia medica  
menta q̄ sint.

maca mihi dici sarcocollam, chalcitidē uſtam, æs, grūginemq; combuſtam, atq; chalcanthon: quæ ignem nō experta, acria omnia ſunt: combuſta, moderata: lota poſt combuſtionem, lenia, roſionisq; expertia.

Aliud mitiſſimum. Eloti plumbi, drach. ij. ſpodij, cadmiæ, diphrygis, ſing. drach. iij. terebinthinæ, qua excipiūtur, drach. vj. Zeno addit chalbanī drach. ſ. Etenim ſatius eſt modica portione miſceri pharmaca id genus, quum nimirum conſeſtim ſibi ſaxeam duri- ciem contrahant. Porrò in hiſce omnibus, illa quæ li- quari poſſunt, liquefacta et refrigerata, abraſaq; ſiccis diligenter redactis in pollinem, admiceo. Nam ſi li- quida iſſis affundas, in grumos concreſcent: maximè ubi inualuerit frigus. In ſole autem ſeruenti ſi miſtu- ra fiat, licet ea ſuperfundere, mouēdo rudicula primū: dein, cochleario: præſtat tñ ad omnia hæc, ramuſculus palmæ.

Aliud ad desperata ulcera, ex collecta- neis Primionis. Soreos drach. xxiiij. aluminis cissi- lis, malicorij, calcis uiuæ, ſing. drach. xvj. thuris, drac. xxxij. gallæ omphacitidis, tantūdem. ceræ, drach. cxx. ſeui uitulini (aut eius loco, adipis porcini & uetusti) drach. lx. olei ueteris heminam. Conſcito. Porrò ſo- ri, alumen, malicorium, galla, non digerendi facultate, ſed aſtringendi eximia, ſunt p̄dita. Etenim ſubaſtringē- tium genere continētur auſtera & acerba: ſed illa qui- dem aſtringunt mediocriter: hæc autem, hoc eſt acera- ba, uehementer. Omnia igitur aſtringentia contrahūt, ac denſant meatus, uinciuntq; & continent partiū ſibi cohærentium ſubſtantiā: quo fit ut altius iſſorum uir- tus penetrare non poſſit, niſi ab alijs acribus, atq; ſub- tilium partiū ducantur: id quod iſſis calx in præſcri- pto medicamento præſtat. At uerò induratis ulcerum labris multò utiliſ medulla ceruina adhibetur: quæ ſi non adſit, uitulina. Porrò inueteratum oleum ab adipe ſuillo (quem oleo communi liquatum inſtitores pro

Aſtringēs eſſe  
genus cōmune  
auſteri & acer-  
bi.  
Aſtringētiū fa-  
cultas.



oleo uendūt) ex odore & consistētia discernes. Vtrūq;  
tamen inueteratum, rofionem quandam acquirit: quo  
nomine ad ulcera præter modū maligna conueniunt.  
Talia enim appello, in quibus aut pars affecta tam ui-  
tioso habitu est prædita, ut uel optimum sanguinē, qui  
nutritionis gratia confluit, corrumpat: aut id quod in-  
fluit, adeò puersum existit, ut etiam si pars rectē se ha-  
beat, ab ipso tamē solo erodatur. Igitur ut citra ratio-  
nalem methodum medicamenta componere, ita uim  
illorum certò & accuratē cognoscere sine experientia  
nemo potest.

Vicera mali-  
gnantis nature  
quæ sint.

Epuloticum *δραχμα δ' α' νου* à Critone conscriptum:  
quod prætumidis, durisq; & cauis ulceribus cōuenit.  
Picis aridæ, drach. C. gruginis rasæ, drach. xxiiij. æris  
combusti, drach. xv. squamæ rubræ, drach. xxiiij. lada-  
ni, vnc. ix. argenti spumæ, lib. iij. olei sextarium. j. S.  
Etenim arida pix euidenter siccat. Calfacit autem mo-  
dicè: ob idq; pus mouentibus medicamentis miscet.  
At quum aliquid calidum, frigidū, humidum, aut siccū  
dicimus, cum optimo corporis temperamento id con-  
ferimus. Igitur cauum & purum ulcus, à mediocriter  
siccantibus medicamentis curatur: sordidum uerò &  
malignum, & oris duris & prætumidis quidē, sed car-  
ne iuxta cutem fluida, ualidisimè siccantia requirit.  
Verūm quæ metallica, ut siccant sine ullo morfu, præ-  
paras, coquere diutius oportet. Sic si quidē magis sic-  
cant, ac minus erodunt. Porro ladanum ipsum solum  
ex uino tritum, ulceribus ægrè ad cicatricem uenien-  
tibus auxiliatur.

Epuloticum. 1  
Critonis ex  
Ladano. & fa-  
Picis aridæ fa-  
culcates.

Vicus caui &  
purū, a quibus  
sanetur medi-  
camentis.  
Metallica diu-  
tius cocta, ma-  
gis siccant, &  
minus rodunt.

Medicamen ex chamæleonte à Critone descriptū,  
inducens cicatricē periculosis & callosis ulceribus.  
Lithargyri drach. C. ceræ, drach. L. æruginis drach.  
xxiiij. chamæleontis, drach. xij. olei minam. conficito.  
Ego tamen huiuscemodi emplastris adijcere lentisci-  
num consueui: quod emolliat nonnihil, digerat, &

Medicamē Cri-  
tonis ex cha-  
mæleonte.

Lentiscini olei  
facultas.



astringat, quæ omnia, difficilia ulcera cum labris induratis, desyderant.

Aliud Heraclidis Tarētini aduersus ulcera uetera. Squamæ drach. j. æruginis rasæ, drach. iij. excipiantur drachmis octo myrtei cerati. Misce. Etenim metallicorum facultas à quouis cerato resoluitur.

Aliud. Squamæ tritæ acetū affundito, eamq; sub caniculæ exortu, læuigato usq; ad crassitudinem mellis: uel etiam incoquito. Postea, exiccata, redactæq; in puluerē, cerati partes octo misceto. Valet aduersus recētia uulnera, & ulcera inueterata. Licebit etiam ad ignem exiccare ipsam squamam, si alio tempore medicamen id conficiamus. Porro subtiliora sunt quæ ex aceto læuigantur: atq; ob id melius purgant, attenuant, & siccant. Verū ad cicatricem inducendam sunt ex uino trita meliora:

Subtiliora fieri quæ læuigantur aceto: quæ ex uino, magis cicatricē obducere.

Aliud Andromachi cicatricem ducens.

Ossium ustorum, drach. ij. mannæ, drach. j. cadmiæ, obolos. iij. tritis utitor. Aliud eiusdem quod malignis cicatrix inducitur. Piceæ corticis drach. vj. cornu ceruini usti drach. iij. cadmiæ drach. xviij. manng, drach. iij. æruginis rasæ drach. ij. siccis utitor.

Aliud ad excreſcentia ulcera, cicatricem absq; morſu ducens. Sandarachæ, chrysocollæ, arsenici, singulorū partibus æquis cōfufis, aridisq; utitor. Ad vlce raquibus callus obduci non potest. Ex Archigene.

Archigenis ad vlcera cōtuma cia, remedia.

Cōmuni quodam oleo expurgatis, uetustissimū cum linamentis imponitur. Ærugo rasa cerato rosaceo, qd paulū resing habeat, excepta, imponitur. Item squamæ æris rubri q̄ plurimū cerato myrteo exceptum usurpatur. Eiusdem ad putrida & nomas.

Sori crassiusculè tritum, inspersumq;, cōducit. Vel aristolochiam rotundam, & gallam, æquali pōdere ex oleo inungito. Vel cucumeris agrestis radicē cum folijs illigatam calido cinere recondito: quum autē emol-



lierit, contritam imposito.

Eiusdem ad cancroſa.

Cācri fluuiatilis uſti, & cadmię, pares portiones tri-  
tas inſpergito. Vel cinerem cancrorū cum cerato im-  
ponito.

Eiusdem ad calloſa.

Nitrum torrefactum & calcem uiuā cum lotio pue-  
ri impubis læuigata circūlinito. Conferunt etiam cau-  
ſtica medicamenta

Andree empla-  
ſtrum faciens  
ad excreſcētia  
ulcera.

Andree emplaſtrum ab Af-  
clepiade ſcriptum, oēm excreſcentiam reprimēs, atq̃  
arcens inſlāmationem. Argenti ſpumę lib. iij. ſqua-  
mę æris, chalcitidis, eruginis raſę, ſing. vnc. vj. acetū he-  
minam: olei ueteris. lib. viij. miſce.

Aſteris medi-  
camen ad idem. Lithargyri, lib. j. olei ueteris lib. ij. S.  
æruginis, chalcitidis, ſquamę rubrę, ſing. vnc. j. acetū  
heminam. Conſcito.

Aſteris medi-  
camen.

Iſis emplaſtrum ruſum.  
ad fluida, diuturna, & maligna ulcera. Argenti ſpu-  
mę drach. C. minię ſinopici drach. viij. diphrygis, ce-  
rę, chalcitidis cōbuſtę, ſing. vnc. j. chalcitidos crudę,  
drach. ij. olei heminas. ij. conſcito ut decet.

Iſis emplaſtrū.

Aliud Scribonij Lari, ad eadem accommodatum.  
Cere drach. C. lithargyri drach. L. olei myrtei hemi-  
nam. j. miſyos cōbuſti, chalcitidis uſtę, aluminis ſciſſi  
uſti, ceruſſę, reſinę terebinthing, ſing. drach. xij. ꝑſcito.

Aliud ex chamæleonte, ab Aſclepiade ſcriptum ad flu-  
entia & ægrē curabilia ulcera. Lithargyri lib. j. olei  
ueteris lib. ij. chamæleontis radicis, trientem, ariſtolo-  
chię tantundem. chalbani, vnc. ij. gallę vnc. ij. thuriſ  
tantundem. Conſcito.

Aliud ab Aſclepiade

ſcriptum ad ulcera quę uix curationem recipiunt.  
Squamę æris, æruginis raſę, ſing. vnc. j. cerę ſelibrā.  
reſinę laricis vnc. S. conſcito.

Decleonus  
cephalicū ab Aſclepiade ſcriptum, à quo educuntur  
oſſa corrupta. Æris ſquamę, mannę, thuriſ, reſinę  
ſicę, ſing. drach. C. acetū heminas. xij. Terito ſquamā  
ex aceto, & quum læuis facta fuerit, thus in pollinem

Cephalicū oſ-  
ſa corrupta  
educens.



reductū adijcito, resinamq; atq; pastillos fingito: quorum assiccatorum in umbra miscēs partem unā cum cerati ex rosaceo confecti pari portione, ipsa utitor.


Aliud Hygieni scriptum ab Hera, utile ulceribus ægrè ad cicatricem uenientibus, necnon paronychijs, Lithargyri Chrysitidis, ceræ, sing. minam. j. chamæleontis nigri radices, drach. xxv. gruginis rasæ, drach. xvij. chrysocolle, drach. xl. olei heminas. iij. conficito ut decet.

Aliud egregium. Ceræ, picis, bituminis, sing. lib. j. mannæ, gruginis, galle, spine Aegyptiæ, iridis Illyricæ, aristolochiæ rotundæ, chalcanti, singulorum. vnc. iij. aristolochiæ lōgæ, aris combusti, utriusq; vnc. ij. cōficito. Aliud, Bituminis, aluminis liquidi, sin. lib. j. picis, resinæ pityinæ, ceræ, sin. lib. ij. mali terre rotūdi, gallæ, spine Aegyptiæ, sing. vnc. viij. malicornij, aris usti, mannæ, mali terre longi, sing. vnc. iij. olei ricinini, aut ueteris, lib. ij. cōficito pro dignitate.

Aliud quo utor in molli carne peditis. Ceræ lib. j. rosacei tantūdem. cerussæ vnc. viij. salis ammoniaci, vnc. iij. squamæ Cypriæ vnc. ij. thuris, calcis uiuæ, aluminis, gruginis, malicornij, sin. vnc. j. cōficito diligēter.

## G A L E N I P E R G A M E N I D E C O M P O S I T I O N E M E D I C A M E N T O R U M S E C U N dum genera. Liber quintus.

Pharmaca ad  
multos usus u-  
tilia, ex contra-  
rijs constare.



Qualitates pri-  
mæ & secūdæ  
quæ dicātur,

**P**OLYCHRESTA medicamēta, siue ad multos usus utilia (de quibus agere in presenti cōmentario est animus) ex cōtrarijs pharmacis constāt, etiam iuxta qualitates secundas: non tātū primas. Etenim primas appello, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatē: tum ex harum coniugatione compositas: secundas autem,



tem, quæ has ipsas primas sequuntur.

Ex ijs est eniplastrum descriptum ab Hera, boni coloris, epuloticum, glutinans, implens, ualensq; ad chironia ulcera: cuius temperies est talis. Cere lib. ij. phryctæ, lib. ij. gruginis rasæ vnc. vj. mannæ, vnc. iij. olei heminas. v. aceti sextarium. conficito.

Panacia Herg.

Panacia Herg, ad omnem malignitatem ulcerum mirè cōducēs. Rumpit atq; dissoluit quicquid corruptū est: omnem sanguinis eruptionem supprimit: hæmorrhoidas ipsas consumit & tabefacit: omniq; ulceri imposita, quāuis agresti, mitius ipsum statim reddit. Chamæpityos, chamæleōtis, symphyti, marrubij, sing. drach. iij. polij. centaurij tenuis, sing. drach. vj. Helenij, aristolochiæ, sing. drach. iij. thuris, drach. xij. S. myrrhæ, drach. iij. aloes, drach. vj. chalbanī drach. vj. obolum unū. olei drach. clxxx. mellis drach. xxx. propolis drach. xij. S. aluminis scissi, terebinthinæ, chalcitidis sing. drach. vj. obo. S. bituminis, terræ ampelitidis, lithargyri, sing. drach. L. gallæ & pulueris iridis, sing. drach. iij.

Conficito diligenter. Porro marrubio uel solo uti etiā queas in ijs qui carnem abundè humidam & sordidā circa uicus habent. Helenion uerò haud item conuenit solum inspersum: sicuti nec aliud quoduis acre.

Nosti siquidem acria irritare, mordere, calfacere, & fluorem concitare ad affectas particulas: amara uerò exiccare citra morsum atq; calorem: eoq; exulceratis conducere. Iam uerò thus concoquit & pus mouet in tēperatis naturis: nam in corporibus humidioribus, carnē producit. Nullum autē eorum quæ concoquūt, ac pus mouēt, ualēter digerēs est, sicuti neq; acre. Sigdē eiusmodi mediocriter excalfaciunt: emolliuntq; magis, q̄ exiccent. Oleū lenit, ac ualida pharmaca obrundit. Terra ampelitis tum siccatur, tum digerit. Chalbanum emollit, concoquit, lenit, atq; dolorem sedat: quas uires thus, licet imbecilliores, sortitur. Terebin-

Acriū facultas  
Amara cur ex  
ulceratis con-  
ducant.  
Thuris facultas.

Pus mouentis  
facultas.  
Olei facultas.  
Chalbanī vi-  
res.  
Terebinthina.



**Bitumen.**  
**Propolis.**  
 Mel non putre-  
 scit, putrescenti-  
 busq; maxime  
 congruit.  
 Putredini quæ  
 sint aptissima.

**Isis Epigoni,**  
 ad multa vtile  
 medicamen.

**Emplastrū ex**  
**dictamno ad**  
**multa vtile.**

thina detergit, discutit, & quodammodo concoquit. Bi-  
 tumen cum calore non admodum uehementi, etiā sic-  
 cat. Propolis attrahit. Mel siccat, & d gerit, putre-  
 scentibusq; est maximè congruens, ex ijs existēs, quæ  
 minimè computrescunt; quare compolita huiusmodi  
 à putredine seruat, præter q̄ extremè ad putrescendum  
 prompta, quæ humida sunt & calida. Myrrha & aloë  
 citra rossionem siccant. Cæterum aloë astringit; myr-  
 rha tenuiorum est partium, magisq; siccat.

Isis Epigoni ab Hera traditum. Valens cōtra omnia  
 uulnera, puncturas neruorum, hominumq; atq; canū  
 morsus. Venenū à bestijs illapsum extrahit; curat fra-  
 cturas artuū cum uulnere, fistulasq; & omnes absces-  
 sus sanat; atq; omnem fluxionem sistit. Cera drach.  
 C. terebinthinæ drach. cc. squamæ rubri gris, æruginis  
 rasæ, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, gut-  
 tæ ammoniacæ, sing. drach. viij. aluminis usti, drach.  
 vj. gris usti, drach. viij. myrrhæ, drach. xij. chalbanī tā-  
 tūdem. olei ueteris heminam, aceti acris heminas. ij.  
 conficito. Etenim hoc medicamine Epigonus conclu-  
 sus in carcere, curauit quendam ex ualde potentibus,  
 unde cōfestim dimissus est. Ego uerò prædictis etiam  
 radicem dracunculi adiicio: quæ uel per se, in orbicu-  
 los secta, assiccataq; & redacta in pollinē, si insperga-  
 tur, malignis ulceribus auxiliatur.

Emplastrum ex Dictamno ad eadē faciens. Olei ue-  
 teris heminas. ij. lithargyri drach. C. æruginis rasæ dra-  
 viij. squamæ drach. vj. colophonix liquidæ drach. L.  
 mānæ drach. xij. ammoniaci thymiamatis drach. xxvj.  
 æris combusti drach. viij. diphrygis drach. vj. gentia-  
 nę tantūdem, aloes drach. viij. chalbanī drach. xij. pro-  
 polis drach. viij. cera drach. xxv. aristolochiæ drach. x.  
 dictamni Cretici tantūdem. Conficito accuratissimè.

Emplastrum ex utraq; aristolochia, cephalicū enæ-  
 mum, callosis ulceribus congruēs, atq; articulos solu-



tos confirmans. Picis, cere, bituminis, terebinthinæ, sing. lib. j. manna, æruginis rasæ, cerussæ, sing. selibrā. chalcāthi, aristolochiæ longæ, iridis Illyricæ, sing. vnc. iij. malicori, gallæ imaturæ, æris combusti, sing. vnc. ij. spinæ vnc. iij. aristolochiæ rot. drach. iij. aceti hemi nam. Ricinini, uel olei cōmunis tantundem. conficito.

Porro manna, exiguam alstringendi uim possidet. Vocant enim sic quod à thure excutitur, nonnihil etiam illius corticis obtinens.

Emplastrum Azanite, malignis ulceribus, necnon ambustis conueniens. Picis aridæ, vnciā: cere, adipis suilli, seui taurini, œsypi, sing. vnc. iij. resinæ piceæ, vnc. v. conficito.

Emplastrum Haliei ex sinopide nihil minus q̃ priora utile. Cere, lithargyri, utriusq; minam. manna, terebinthinæ, chalbanī, sinopidis, sing. drach. viij. olei ueteris heminas duas. Conficito.

Emplastrum Machæronis à Critone descriptum, phlegmonem arcens, mireq; conducens ulceribus. Aristolochiæ rot. chalbanī, opopanacis, æruginis, iridis Illiricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sing. vnc. j. terebinthinæ, vnc. vij. S. ceræ, vnc. lx. S. olei omphacini vnc. vij. S. conficito.

Emplastrum ex salicibus à Critone in multos usus descriptum. Misys, chalcitidos, æruginis, cerussæ, galleg, aluminis scissi, & rotundi, cretæ sutoricæ, sing. vnc. vj. cere, resinæ pitynæ, picis, bituminis, salicis foliorum, singu. vnc. ij. olei heminas. ij. vnc. iij. chalcāthi vnc. vj. malicori tantūdem. aceti sextarios sex. conficito.

Emplastrum uenatorum, ad quadrupedum ictus, morsusq; & ad reliqua uenenata.

Argenti spumæ, minam. olei ueteris, squamæ æris rubræ, ceræ, resinæ phrycæ, sing. lib. ammoniaci thymiamatis, trientem, chalbanī, mini, sinopici, sing. vnc. ij. conficito.

Viride Alcimionis, conueniens fistulis, educens ossa, & strumas discutiens. Chalbanī drach. xvj. æris usti, drach. viij. squamæ, drach. xxij. cere

Māna quid sit

Emplastrum  
Azanite.

Emplastrū Ma  
chæronis.

Viride Alci  
mionis.

Tttt ij



drach. L. seui caprilli, uel uitulini, drach. xxx. thuris, resinae siccae, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, nitri, aristolochiæ, sing. drach. xxv. bryonig, drach. xij. orchecos drach. xij. iridis aridæ, drach. iij. aloes Indicæ, drach. xij. scissilis, drach. viij. fellis taurini, tantūdem. aceti, olei, utriusq; heminam. conficito.

Viride ad herpetas, & ad chironia ulcera ab Andromacho scriptum. Hordei combusti drach. x. æruginis drach. xx. cere, drach. lxxx. cyprini heminam. Ceterū hoc medicamen eruginem multam continet. Porro combustum hordeum, uel si per se inspergatur, chironia ulcera iuuat.

Pastilli Aristarchi.

Pastilli Aristarchi πολύχρηστοι, hoc est ad multos usus. Nam præter alia, utiles sunt in principio phthificis, lienosis, coeliacis, & dysentericis, tribus obolis in potu datis. Myrrhe, drach. vj. croci, crocomagmatis, sing. drach. iij. citinorum, chalcanti, aluminis scissilis, aloes, singu. drach. vj. excipiantur uino Falerno, singanturq; orbiculi, & assiccari in umbra seruentur.

Polyide Sphragis. Malicorij, drach. vj. myrrhæ, drach. viij. aluminis scissilis drach. v. thuris, drach. iij. chalcanti, drach. iij. fellis taurini drach. vj. Vino dulci excipiuntur.

Pastillus Threpti ad aures pure fluentes, carnis excrescentias, & narium ulcera. Malicorij drach. x. galle omphacitidis drach. viij. aristolochiæ tantūdem. aloes drach. iij. myrrhæ, drach. viij. fissi drach. ij. thuris drach. iij. passo excipiuntur.

Pastillus diachylon.

Pastillus δια τῶν χυλῶν ad nomas & scabiosos affectus. Licij indicati, aloes Indicæ, myrrhe, eris, aluminis scissi, citinorum, thuris, sing. drach. iij. succi myrti, heming dimidium. conficito.

Pastillus niger: quo utor. Malicorij drach. x. aristolochie, galle, sing. drach. viij. aluminis fissi, aloes, sing. drach. iij. myrrhe, chalcanti, sing. drach. ij. thuris drach. iij. Vino excipiuntur: & quum res exigit, uino dulci diluuntur.

Ad erysipelata. Acaciæ drach. viij. misyos drach. iij.



opij drach. ij. thuris drach. iij. cum aceto excipiuntur.  
Faciunt etiam ad herpetas. Ad herpetas, Tiberij

Cæsaris. Diphrygis, meconij, aluminis fissi, acacie,  
sing. vnc. ij. aceto uel aqua diluens, utitor.

Aridum putrefaciens absq; morfu, ex descriptione An  
dromachi. Sandarachæ, arsenici, singu. drach. ij. calcis  
uiuæ, drach. iij. tritis utitor. Pastillus sanguinem

Putrefaciens  
absq; morfu.

comprimens. Chalcitidis, misyos, manne, sing. dra-  
ch. iij. tritis utitor. Ad ani uitia, alumine liquido

nucis magnitudine cum mellis cyathis duobus cocto  
utitor. Aridum cephalicum ab Asclepiade scri-

ptū, quod tollit squamas, ossa corrupta educit, & caua  
implet. Iridis Illyricæ, panacis, sing. drach. iij. aristo-  
lochis, drach. ij. manne tantūdem. contusis cribratisq;  
utitor. Aridum Asclepiadis, cicatricem indu-

cens. Calcis uiug, drach. vj. mannæ, thuris, squamæ,  
sing. drach. iij. redactis in pollinem utitor.

Crustas inducens. Asclepiadis. Chalcitidis crudæ,  
cadmig, sing. drach. iij. ieiunus ex saliuā excipito.

Medicamen Dia tessaron. Chalcitidis toste, misyos  
tosti, diphrygis, chalcāthi, sing. drach. iij. Ad nomas

Medicamē dia  
tessaron.

Asclepiadis pharmacum. Sulfuris uiui, auripigmenti,  
squame, sing. drach. j. æris cōbusti, quātū color exigit.

Arido et ex melle utitor. Etenim putrida ulcera, quum  
ambientes partes depascunt, nomas propriè appellāt.

Nomæ qualia  
vlcera sunt, &  
qualia medica-  
mēta postulat.

Qui affectus uehementissimis medicamētis indigent:  
ut sæpe in eis etiam cauterijs utamur.

Apellis medicamentum δια χαρτον, quod nomas non  
solūm fistit, sed incipientes prohibet. Chartæ combu-

Medicamē ex  
charta combu-  
sta, nomas cō-  
pescens.

ste, plumbi usti, æris usti & loti, arsenici, squamæ sto-  
momatis, singulorum equas portiones. sulfuris uiui, di-

midium: tritis utitor, uel cum melle, uel ex rhodino.

Ad carbunculos. Nitri rubei, arsenici, sandarachæ,  
chalcitidis, atramenti sutoriij, diphrygis, singulorū pa-

rem mensuram aceto læuigans, exiccansq; postea eis

Tttt iij



Carbunculus  
quid, & quali-  
bus egeat me-  
dicamentis.

tritis utitor. Etenim carbunculus ulcus est crustam ci-  
to cum ualida phlegmone circumstantium particularū  
excitans: adeo ut febres uehementes, & extrema peri-  
cula inferat. Quare ipsi crustę ualidum medicamentū  
imponere expedit, & ex ijs quę ad nomas conducunt

**G A L E N I P E R G A**  
**M E N I D E C O M P O S I T I O N E**  
**M E D I C A M E N T O R U M S E C U N**

dum genera, Liber Sextus.



**N** PRAESENTI cōmentario  
ad ea πολύχρηστα, hoc est multi usus  
medicamenta me conuertere est ani-  
mus, quæ tum ad alia multa singula-  
tim faciunt, tum ad putrescentes par-  
ticulas, aliter quidem affectas q̃ illa ul-  
cera, quę difficulter curabilia appellantur. In putrescē-  
tibus siquidem, ipsa putredo uagat̃: ob idq; tales dis-  
positiones cōplures Medicorum νομάς, hoc est, depa-  
stiones appellant. In illis autē, affectus secundum unū  
locū est circumscriptus: absq; ulla putredine: ita ut pha-  
gedęne uocare, exedant quidem partes uicinas, non ta-  
men putrefaciant ipsas, nec febres inferant, quę conse-  
qui ad depascentes affectus cum putrilagine, cōsueue-  
runt. Hęc igitur quę nunc scribentur omnia, mordacia  
sunt, si quis ipsis solis nō cerato temperatis utatur. At  
quæ cerato miscentur, purgare quidem ulcus sordidū,  
& carne replere possunt, atq; etiam duritiem quādam  
& tensionē discutere: non tamē difficilia curare. Quo-  
circa tum plurimū cerati miscemus medicamētis acri-  
bus, quum ulcus purum & siccum est: corpus autem  
curandum, & molle, & ad sentiēdum promptum: pau-  
cissimum uerō, si ulcus quidem ipsum sordibus, humi-  
ditateq; redundet plurima: egri autem corpus sit durū,

Nomx.

Phagedęne.

Cerati plurimū  
quādo acribus  
medicamentis  
misceat̃, & quā-  
do contra, pau-  
cissimum.



& parum sensile.

Anicetos Critonis, quasi di- Anicetos Cri-  
tonis.  
cas insuperabile pharmacū. Extrahit, rumpit, purgat,  
glutinat, pus educit, duritias discutit, lassitudines lenit,  
fracturis cum uulneribus auxiliatur, curat hominum  
atq; ferarum morsus, ad innumeraq; alia conducit.

Squame æris drach. lviij. pyrethri, staphisagrie, cocci  
cnidii, sinapi seminis, cachryos, columbini stercoris,  
aristolochiæ tenuis, gruginis, cyperi, eruce seminis, cu-  
mini, singulorū drach. xvj. nitri, salis ammoniaci, sing.  
drach. xxxij. baccarū lauri, mannæ, iridis, sing. drach.

cxx. aceti acris sextarios sedecim. decocti caricarum  
cyathos. iij. & S. Tusa cribrataq; omnia simul cum  
aceto sub æstu caniculæ laeuigantur. Vbi siccum & uiride  
euaserit, ficuum decoctio adiicitur, & simul emol-  
lita tolluntur, & in olla æris rubri asseruantur. Vteris  
autem una ipsius medicamenti parte aceto diluta, usq;  
ad consistentiam sordium, permista sex resing portio-  
nibus, cui nonnihil cere sit temperatum. Scribitur etiā

impetigini agresti congruere. Sic enim uocant, quæ à  
medicamentis imbecilliter siccantibus nihil iuuatur:

Impetigo agre-  
stis.

irritatur autem à ualidis. Porro caricarum decoctum  
lenissimum est, & maximè concoquit, simulq; digerit.

Caricarum de-  
coctum.

Acetum uerò, efficaciam aliorū medicaminum iuuat.

Aceti facultas

In quo quidem quæ macerantur sub sole estiuo, tenuē  
substantiam acquirunt, eoq; altius uirtus ipsorum pe-  
netrat.

Emplastrum Serapionis, contra omnia  
uulnera, punctus, et parotidas maximè ualens. Educit  
etiam pus, glutinat, seniliaq; & chironia persanat.

Serapionis em-  
plastrum.

Olei ueteris heminas. iij. argenti spume drach. cc. am-  
moniaci thymiamatis, drach. clxviij. resinæ, colopho-  
niæ, pityinæ, singu. drach. lxxviij. ceræ drach. clxviij.  
chalbani drach. xx. gruginis tantūdem. myrrhæ drach.  
viij. Conficito.

Humidum Andromachi ad  
nomas. Cere, resing, terebinthing, utriusq; drach. viij.  
adipis taurini curati, drach. iij. chalcitidis, drach. ij.

Humidum me-  
dicamen And-  
romachi,

T t t t iij



squamæ æris, drach. iij. mannæ thuris, drach. ij. gallæ immaturæ, drach. iij. olei myrtei, hem nas. v. Arida aceto & melle excipiuntur; dein liquida superfunduntur. Porro q̄ auxiliiorum quædam à ratione sola inveniuntur: quædam ab experientia, \* quæ ad id ratione non indiget: nonnulla utriusq; opem desyderēt: per sepe iam vobis est demonstratum: sicuti & q̄ ratione & experientia comperta, coniecturali uia ad eorum quæ inquiruntur inuentionem perueniunt: quæ uerò per rationem sperata sunt, confirmantur experientia. Quum igitur omnia artium opera frequenti exercitio absoluantur, non satis profectò est, generalia duntaxat ipsorum addiscere, sed etiam in particularibus subinde exerceri oportet. Nam ad ionum usus, exercitatioq; ad perfectorum possessionem est uia.

Artium opera  
frequenti exer  
citio absoluit.

Ægyptia An  
dromachi.

Ægyptia Andromachi. Argēti spumæ, drach. xliij. ricini heminas. vj. ceræ, drach. cxliij. ammoniaci thymiamatis, drach. lxxij. terebinthinæ drach. xxxvj. languste, drach. xvij. squamæ stomomatis, squamæ æris, aristolochie, thuris sing. drach. viij. myrrhe drach. iij. opopanax drach. ij. marinæ aquæ, ad conspergendam ceram, drach. L. Conficito. Etenim argenti spuma, quum mediū temperamenti sit, quod pertinet ad calorem & frigus: paululum ad siccitatem inclinat. At cera, materiæ locū obtinet, non uirtutis efficaciam adiuuat: tamen si uis quædam ei perexigua emolliēdi insit. Iam terebinthina, q̄ cera, magis mollit, calfacit, & digerit. Porro ammoniacum inter emollientia principatum obtinet: in digerētibz medium est. Quare compositum ex oleo ricini & gutta ammoniaca medicamentū, abunde potest digerere, emollire, & nimirum etiam siccare. Iam lana combusta, aristolochiaq; plurimū digerunt, exiccātq; thus autem digerit concoquitq;. Myrrha etiā non ignauiter calfacit, & exiccat: sed utrunq; opopanax præstat multo absolutius. Cæterum squama æris, stomoma-

Ammoniacū  
inter emollien  
tia principatū  
obtinet.



tis q̄; præter q̄; q̄ ualidè siccant, uim etiam astringen-  
di sortiuntur. Consentaneum autem est, Andromachū  
pro hemina uncias nouem mensurales accipere; ita ut  
sex heminae uncias quinquaginta quatuor mensurales  
absoluāt; quod idem est, ac si dicas mensuræ Romanæ  
libras. iij. S. Ego uerò olei Romanam libram, quam  
per dissecta cornua metiuntur, ponderaui quandoq̄;  
discere cupiens quantum grauitatis pondus cōtineret,  
inueni q̄; duodecim mensurales, decem vncijs ponde-  
ris æquales existere. Præscriptum igitur medicamen-  
tū cruentis uulneribus, ulceribus q̄; alijs non paucis bonū  
medicamentum redditur; sicuti & ad abscessus, & om-  
nia quæ discuti postulant. Nec ignoratis medicamen-  
ta quæ simul cum digerentibus etiam astringentia re-  
cipiunt, longè tutiora esse; quæ uerò absq̄; abstrin-  
gentibus digerunt, efficaciora quidem, non tamen perinde  
tuta. Sæpe siquidem fluxiones attrahunt, dum corpus  
quod curatur, plethoricum est, aut prauis succis redun-  
dat. Adeo itaq̄; digerit generosè prædictum pharma-  
cum, ut etiam pus, si non admodum copiosum sit col-  
lectum, discutiatur, absq̄; incisione cutis: emollire q̄; cal-  
losa, & quomodocūq̄; indurata possit. Congruit etiam  
nudatis neruis, & si in parte quapiam abscessi fuerint.  
Etenim præcisi nerui, tametsi periculo quod consortij  
lege oboriri solet, careant, tamen eas partes, in quas in-  
ferunt, sensu destituunt: tale q̄; medicamen desyderant:  
nam quæ humectant, facilè eos putrefaciunt.  
Medicamen fuscum Andromachi, Athene dictum, ad  
difficilia ulcera congruens. Argenti spumæ, drach. C.  
terebinthinæ drach. xxxvj. ceræ, drach. xxvj. minij sino-  
pici drach. xxiiij. ammoniaci thymiamatis drach. xxxvj.  
chalbani, drach. xij. aloes, drach. viij. diphrygis tantū-  
dem. æris combusti, mastiches, sing. drach. vj. aristolo-  
chiæ drach. v. propolis tantundem. mannæ drach. vj.  
squamæ gris tantūdc. Lapidis asij, drach. iij. trifolij se-

Hemina.

Libram mēsu-  
ralem olei, con-  
tinere vnc. x.  
pōderales, Ga.  
expertus est.

Digerentia q̄;  
bus abstrin-  
gentia sunt mis-  
ta, esse lōge tutio-  
ra, sed min⁹ ef-  
ficacia illis q̄  
tantū digerūt.

Humectantia, p̄-  
cisos neruos fa-  
cile putrefaci-  
unt.

Athene Andro-  
machi.



Hellepontia  
Andromachi.

minis, drach. ij. symphyti radice drac. j. & obolos. iij. olei heminas. iij. Conficito: Hellepontia Andromachi, propulsans phlegmonē: strumas, panos, & parotidas curans: nec non pus maturans, abscissusq; rūpens, & glutinans. Argenti spumę drach. C. picis drach. L. ladani drach. xxv. æruginis rase drach. viij. aris combusti, tantūdem, squamę drach. ij. olei ueteris, drach. cc. Conficito.

Tyria Damocratis.

Tyria Damocratis, ulceribus, ac moribus quadrupedum congruēs. Lithargyri lib. v. cerę lib. ij. Pityinę pinguis, lib. iij. æruginis, chalbani, aris combusti, squamę, singu. vnc. iij. Pinguis olei, lib. xvj. curiosē, conficito.

Attrahentium,  
digerentiumq;  
discrimen.

De emplastris digerentibus, & attrahentibus. Attrahentia medicamenta, non nihil etiam discutiunt; & quę discutiunt, pariter etiam attrahunt. Verū in digerentibus medicamentis, discufforia uirtus: in trahentibus, attractrix præpollet.

Salsum Andromachi.

Salsum Andromachi, digerens, extrahēs, ad multaq; utile. Salis communis, lib. iij. squamę vnc. iij. Magmatis, lib. S. mannę lib. j. cerę, lib. xiiij. olei cyprini, lib. xvj. quibus acetū affundit.

Medicamē ex  
baccis lauri.

Aliud Cresiphontis, partim discutiens, partim euocans, atq; detergens. Aphonitri, libram, mannę thuris, tantūdem. lixinę stactę, libram. Sunt qui addant etiam libram acetī. Aliud ex Baccis lauri. Resinę, nitri ruffi, cerę recentis, baccarum lauri, colophonię, seui uitulini, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. lxx. cyprini decimā sextam hemine partem, conficito.

Digerens Alexandri.

Aliud attrahens & digerens, ad multa utile. Argenti spumę, cerussę, chalbani, singulorum libram. salis fossilis, æruginis rase, singu. sē libram. olei sextarios tres. atramentū sutori, vnc. ij. conficito.

Aliud digerens meliceridas, Alexandri. Salis Hispani, argenti spumę, cerussę, sing. libram. Cere, terebinthi, utriusq; vnc. j. chalbani, uel opopanax, vnc. ij. sinapeos, vnc. vj. olei ueteris, libras tres. acetī sextariū



confundito. Aliud Epispasticum, discutiens stru-  
mas, parotidas, atq; omneis abscessus: conferensq; ad  
articulorum uitia. Salis fossilis libram: strigmenti pu-  
ris simi, lib. iiii. Chalbani drach. L. conficito.

Aliud quo usus est ad eadē Andromachus. Cerussæ,  
salis fossilis sing. drach. lxxx. chalcanti drach. xij. olei  
ueteris heminas. iij. aceti heminas. iij. Aliud Ascle-  
piadis ad eadem: Quod ualenter etiam mammarum  
abscessus digerit. Cera, terebinthina, nitri, olei uete-  
ris, sing. libram. aquæ heminam. Nitrum in aqua solu-  
tum igni admoueto, uaseq; cooperto, coquito, mo-  
uens ex interuallis. Quum autem strepere adeo de-  
sierit, liquida infundito, mouēs assidue, donec non co-  
inquent. Postea in mortarium transfusa, rursus tun-  
dito: inde excipiens, utitor.

Digerens Ab-  
clepiadis.

Aliud ad eadem:  
Cera, terebinthina, sing. drach. C. nitri spumæ, olei ue-  
teris, manna, thuris, sing. libram. lapidis asij, floris, seli  
brā. chalbani, ppoli, ammoniaci thymiamatis, sing.  
drach. xij. aquæ lixiæ quod sit satis, conficito.

## G A L E N I P E R G A

### MENI DE COMPOSITIONE

#### MEDICAMENTORVM SECVN-

dum genera. Liber Septimus.



ALAGMATA siue emollien-  
tia uocant Medici, quæ partes præ-  
ter naturam induratas emolliunt, cali-  
do omnia tēperamento prædita: non  
tamen exiccantia, quemadmodū nec  
manifesto humectantia. Nam quum  
exactē emollientia medium quendam ordinem inter  
humectantia siccantiaq; sortiātur, indurescentiū sub-  
stantiæ, ueluti fusionem quandam moliuntur. Vbi uē-  
rō fusa durities fuerit, digerentium medicamentorum

Malagmata q̄  
dicantur.

Digerentibus  
quādo utēda.



Adipis differē  
tiæ.

usus succedit. Porro leoninus adeps ualentissimè tum  
calfacit, tum digerit. Proximū locū habet pardī adeps,  
ut qui modicè emolliat. Vini minorem in calfaciēdo  
ac digerendo habet anserinus; habet tamē aliquatenus  
maiores in molliendo: pari spatio ab hoc recedit gal-  
linaceus. Suillus adeps, mollissimus, humidissimus,  
atq; aliorum imbecillissimus est: quare teneris corpori-  
bus conuenit. Caprarum & boum adeps, quanto suil-  
lo est ualidior, tātō magis corporibus & natura durio-  
ribus, & inter duriora scirrhosioribus congruit. Tau-  
rinus hircinusq; adeps ualidioribus tum corporibus,  
tum affectibus auxiliatur. Est autem cōmune tū phleg-  
mone, tum scirrho particulis laborantibus, reniti pre-  
mentibus digitis: distinguuntur tamen affectus ij sensu  
doloris & indolentia. Igitur magna phlegmone cata-  
plasmatis & humidis quibusdam medicamentis sana-  
tur: parua, cui scirrhosa durities permista fuerit, tum ca-  
taplasmatis, tum medicamentis cerati modo cōfectis:  
liquidisq; emplastris atq; emollientibus.

Phlegmone q̄  
bus medicamē  
tis indigeat.

Parygrō Herē

Medicamen Parygron Herē. Quod medet̃ particulis  
exigua phlegmone afflictis, non multo post confectio-  
nem tempore. Si uerò duritiem absq; dolore pars affe-  
cta contraxerit, aut si phlegmonode affectu sit libera,  
paulo etiam recentī uetustius utile fuerit. Eius itaq; cō-  
positio est talis. Adipis suilli recētis, curati, vnc. xliiij.  
ceræ vnc. xxiiij. cerussę vnc. vj. argenti spumæ tantū-  
dem. conficito. Atq; duritiem in scirrhū abeuntem,  
ualentiora præsidia p̄sanant: cuiusmodi sunt, tum me-  
dullarum genus, tum bdellium utrūq; Arabicum nē-  
pe, & Scythicum: necnon styraces: ex quibus eligēdus  
est pallidus. Nam niger deterior est. Iam ammoniacū  
thymiana, inter ea quæ emolliunt durities annūmera-  
tur: præcipuè quod pingue est, & recens. Medullarum  
optima est uitulina. Ex resinis aptissima est, Chia uo-  
cata, & larix. Post has pinea. nde ab Iietina, Strobilina

Styracis diffē-  
rentiæ.

Medullarū op-  
tima ē uitulina  
Resinarū diffē-  
rentiæ.



uerò uehementer est acris. Pityina, quam propriè physema uocāt, pinguitudinis expers, exiccat admodum. Has igit fugere, Chia uerò & abietina uti oportet, non ipsīs per se, sed cum cera, & aliquo aliorum, quæ conducere affectui uideantur. Brutia pix & ipsa eandem obtinet uim, nonnihil pinguis & tenax. Pix alia non est miscēda, sicuti nec bitumen: utpote iusto sicciora. Exiccantia quippe, mollientibus sunt contraria. Quoniam uerò & piceam, & phrycten resinam, & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum est, & aliā colophoniam quandam haberi, chiæ mastiche similem, quæ nō nihil molliens sortitur, quemadmodum ipsa mastiche & thus. Ad hæc Aegyptia mastiche nonnihil emollit. Thus etiam, quandam molliendi uim obtinet: uerū hoc quidem, coctum ex usu est, ueluti & scenigræci semen. Hoc etenim probè coctum emollit, ac magis adhuc, si adipi temperetur. Quæ citra coctionem liquari, diluiq; ob consistentiæ siccitatem, non possunt, oleoso aliquo indigent, cuiusmodi sunt, tum oleum ipsum, cui nihil astringēs inest: tum balneorum strigmenta, & qd uocatur susinū, & hoc multo magis comaginū. Huius generis est butyrum, althegq; & scenigræci decoctum. Porro inter ea quæ sic emolliunt, & ea quæ ualidis simè (cuiusmodi existunt styrax, & bdellium) ammonia cum thymiana idem potest quod propolis. Cæterū Scythicum bdellium Arabico est multo ad emolliendum præstantius. Chalbanum & opopanax, præterq; qd digerunt, etiam aliquid molliens sortiuntur. Opopanax tamen digerendo: chalbanum molliendo, coquendoq; præcellit. Ex his igitur quæ produximus, ualida ualidis, imbecilla imbecillis sunt adhibēda affectibus. At ubi post primam pharmaci impositionem, denuò ipsum applicas, oleo pingui partē affectam fouere conuenit. Ex ijs autem quæ ἐχέκολλα (quod tenacius hereant) uocantur, nullum auferendū est, prius q̃ sua spon-

Colophonia  
duplex.

Mastiche.  
Thus.  
Scenigræci se-  
men.

Bdellium.  
Ammoniacum  
thymiana.

Chalbanum.  
Opopanax.



Tenacia medi-  
camēta non eē  
amēdēda, pñ  
q̄ sua sponte  
excēdant.

Malactica pri-  
mi ordinis.

Malactica se-  
cūdi ordinis.

Amythaonis  
malagma.

te abscedant; \* sed ut adhæreant semper sinenda sunt, etiam si ægrotās lauetur. Vitanda autem omnino sunt medicamentosarum aquarum lauacra: præsertim quæ chalcanthum, alumen, & sulfur referunt. Quum igitur malacticorum sint uarij gradus, & differētiæ, certē malacticis primi ordinis ad exiguas durities, atq; in molli-  
libus utemur corporibus; ut secūdi, ad fortiores tum affectus, tum corporū habitus: ac similiter tum tertij, tum quarti, nimirum pro illorum ratione.

Malactica primi ordinis. Butyrū, uel resina colophonia, & cera candida nō uetusta, singula pondere equalia, inuicem liquata, primi ordinis malactica sunt. Liquidum similiter medicamen, quod Parygron uocāt, primi ordinis est. Emollientium imbecillimū est cera cum butyro soluta, aut ex fusino, aut comageno. At his imbecillius cererelæxon dictum. Iam ex ouis cerata facta, exiguam quandam relaxandi uim possident. Valentiora his, uerū imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex œsypo, resina, & cera pari pondere liquefactis.

Malactica secūdi ordinis. Emplastrū quod ad Mnasæum refertur, rectissimè secundo malacticorum ordini ascripseris, nimirum constans ex oleo ueteri, argenti spuma, & suillo adipe. Ceterū si omnia illa fuerint recentia, imbecillimum pharmacum fiet. Validius autem, oleo quidem existente ueteri; adipe autem recēte. At ualidius adhuc, ex uetustis ambobus constiterit. Quocirca secūdum uetustatem quidem olei & adipis, pondus autem singulorum quæ induntur: uarias differentias ipsum medicamentum suscipiet. Copiosa siquidem argēti spuma iniecta, medicamen potestate mollius euadet; paucior, ualidius; ac magis emolliet, si plus adipis immittamus; digeret fortius, si augeamus oleū.

Amythaonis malagma ab Asclepiade scriptum. Ammoniaci thymiamatis, vnc. xxxvj. cerę tantūdem, terebinthinę vnc. viij. bdelli, tantūdem, chalbani, thu



ris, myrrhe, sing. vnc. iij. cyprini heminas. iij. Conficito. Discutit omnem durittem. Valet contra præcordiorum tensiones, impeditosq; articulorum morus.

Malagma Dioscoridis, ad eadem. Cerae minam unā. resing phrycæ, chalbani, iridis Illyricæ, sin. ming dimidium irini fecule quod satis est. Vini quantū uolueris. Conficito.

Malagma  
Dioscoridis.

Malagma Lucij omnem duritiem digerens, articulosq; impeditos relaxans. Bdellij, seui uulini, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sin. drach. xvj. opopanax, chalbani, cachryos, styracis, thuris, sing. drach. viij. piperis grana clx. irinæ fecule, qd sit satis, ceræ, resing terebinthinæ, sing. selibram. Vini quod satis esse uideatur. Conficito. Est enim extremi emollientium ordinis: ut quo nullum durescentia magis emollire comperias.

Malagma Lu  
cij.

Malagma Neapolitæ ab Asclepiade scriptum, contra omnes durities: quod etiā pleuriticis auxiliatur. Vini pisitæ, sextarios sex. ceræ lib. sex. ammoniaci thymiamatis, phrycæ, utriusq; vnc. iij. terebinthing. thuris, myrrhe, aloes, aphronitri, lapidis Asij floris, gentianæ radicis succi, sing. vnc. vj. sagapeni, sulfuris uiui, propolis, sing. vnc. iij. panacis rad, psamyschi, piperis albi, sing. vnc. iij. Conficito, & utitor.

Malagma  
Neapolitæ.

Malagma Andromachi. Picis lib. iij. cere lib. ij. resing, libram. chalbani vnc. ij. ammoniaci thym. tantūdem. manne vnc. iij. aceti sextarios. iij.

Malagma An  
dromachi.

Malagma Andromachi ex meliloto. Nardi Gallicæ drac. x. cyperi, cardamomi, ireos Illyricæ, myrrhe, sin. drach. viij. croci, drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, drach. viij. terebinthinæ drach. L. cere recentis, drach. C. cyprini, heming dimidium. aceti quod sit satis. Conficito.

Emplastrū ex  
meliloto.

Malagma ex baccis lauri Andromachi. Cerae, picis brutæ, baccarum lauri, nitri, resing phrycæ, sing. drach. lxxv. chalbani, ammoniaci thymiamatis, cachryos, ameos, singu. drach. xij. piperis albi, drach. xvj. cyprini hemi, vj cōficito.

Malagma ex  
baccis lauri.



Ischiadicis ca-  
taplasma.

Ad Ischiadicos generosum. Rutę agrestis seminis, silphij, baccarum lauri, aphronitri, abrotoni, colocyn-  
thidis, cardamomi amcos, sing drach. iij. Rutę uiridis,  
picis, terebinthinę, ammoniaci thym. cerę, seui, sing.  
minę partem octauam. chalbani, drach. vj. opopana-  
cis drach. iij. sulfuris uiui tantūdem. Conficito.

Lienosis opti-  
mum cataplas-  
ma.

Ad Lienosos. Cerę minam. ammoniaci thymiamatis, minę dimidium. aluminis liquidi, drach. L. strig-  
menti, heminam. Capparis rad. calaminthę rad. myro-  
balani fecis, quod magma uocant, sing. drach. L. aceto

Hepaticis con-  
ueniens malag-  
ma.

aridis, oleo adiecto liquidis, utitor. Malagma ad  
Hepaticos. Ammoniaci thymia. bdellij, singu. drach.  
cxliij. croci, myrrhę, sing. drach. xij. cerę drach. cxliij.  
aceti, quartam partem heminę, cyprini, heminam.

Rheumatismis  
vētriculi & in-  
testinorum, ma-  
lagma.

conficito. Malagma ad rheumatismum stomachi  
& intestinorum. Oenanthę, vnciam. omphacij, vnc.  
iij. phœnicobalani carnis, vnc. ij. acacis, rosarū, alocs,  
sing. vnciam. gallę, aluminis, picis, sing. vnc. iij. cerę  
vnc. iij. Vinum aridis affunditur.

Hydropicis cō-  
ueniens malag-  
ma.

Ad Hydropi-  
cos, & flatuosos. Picis liquidę, cerę, utriusq; libram,  
nitri, sulfuris uiui, aluminis fissi, sin. vnc. vj. p. misceto.

Colicis malag-  
ma Antipatri.

Malagma Antipatri ad colicos. Silphij, drach. ij. he-  
leliphaci, casię, melanthij, staphidis agrię, chalbani,  
struthij, sulfuris uiui, sing. drach. iij. panacis, propolis,  
pyrethri, ammoniaci thymiamatis, nitri, singu. drach.  
vj. Asij floris, drach. xxv. cerę drach. cl. resinę, tantū-  
dem. olei heminam. Conficito.

Anodynōn ad  
podagram.

Anodynōn Nico-  
strati ad podagram. Cerę libram. Ammoniaci thy-  
miamatis, vnc. ij. opopanacis, vnc. iij. S. mecōij, vnc.  
iij. cyprinum ad contusionum eorum adhibetur.

Arthriticis au-  
reū malagma.  
Pleuritidi con-  
ueniens malag-  
ma.

Aureum malagma ad Arthricos. Resinę strobiling,  
lib. ij. chalbani, drach. xij. axungię porcine tantūdem.  
cerę drach. xxiiij. baccarum lauri, drach. xij. incoquito  
ut decet.

Aliud ad Laterum dolores. Cyperi,  
cardamomi, mannę, ammoniaci thymiamatis, tere-  
binthinę



binthinae, ceræ, irini, singul. libram. Misceto. Porro phlegmones, scirrhiq; eadem quodammodo generatio & curatio est. Nascitur enim ex confluxu humorum uterq; affectus; curatur iisdem uacuat: quâq; euacuationis modus utrobique idem non est. Quippe inflammationis quidem particulis tum repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tum discussoria semper ex usu est. Scirrhis autem, sola discussoria sine repellente. Itaq; summè indurata scirrhus, prorsus, insanabilia sunt. Dignosces autem ipsa hinc, quod nullus sensus partibus affectis supersit. At in quibus sensus quidē est, sed obscurus, hæc curantur pharmacis digerentibus incrassatum humorē; non tamen ualidè, ac uniuersim hoc agentibus; quod epispastica solent. Quocirca minimè sanè oportet mirari, si partes inflammate scirrhum interdum contrahant: dum uidelicet humor quidem influens est simul crassus & uiscidus; curatio autem medicamentis ualde exiccantibus administratur. Nam quemadmodum in externis rebus, permulta corpora quæ ignem contingunt, ab ipso torrētur; atq; rursus ab aqua emolliuntur; ita in particulis inflammationis, ex humore ipso, à calfacientibus & exiccantibus acerrimè desiccato, relinquitur quippiam crassum & uiscidum, nimirum omni tenui discussio. Atq; hac sanè ratione in morbis articularibus porri gignuntur; nec secus per nephritidas calculi. At si fluxio, quæ phlegmonem gignit, tenui substantia sit, curatioq; eius per siccantia & calfacientia pharmaca administretur, nihil scirrhum relinquit: imò refrigerantia uehementer, astringentiaq; scirrhus procreare tunc solent. Vnde multis per erysipelata uehementer refrigeratis, occalescere solent humores. Igitur primus usus in dolentibus inflammationibus est, qui medicamentis abundè humidis simul & modicè calidis administratur. Alter paulo crassioribus, & siccantioribus constat. Tertius relaxantibus nominatis,

Inflammationis  
curatio.

Scirrhi curatio

Scirrhi incurabiles, ab iis qui possunt curationem suscipere, quomodo discernantur.

Phlegmonæ quando in scirrhum degenerent.

Pori quomodo generentur.

Calculi ut gignantur in renibus

Refrigerantia quando scirrhus producant.

Inflammationibus quæ medicamenta conuenire videantur.



quæ nonnulli inter malagmata collocant. Sunt autem inter ea, maximè emollientia quidem, quæ consistentiam cerati referunt, quum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxante conflantur. Temperatur ipsis œsypi, resinæ, & picis, modicum: sicuti & thus, & chalbanum, & nonnihil ireos Illyricæ.

**Acopa medica**  
mina qualianā  
esse debeant.

**Resinarum dif**  
ferentia.

**Adipis diffe**  
rentia.

**Dura corpora**  
valentiora me  
dicamenta po  
stulāt, q̄ q̄ mol  
li carne sunt  
prædita.

**Acopon The**  
misonis.

De Acopis, siue labores lenientibus. Acopa medicamenta omnia, liquidæ cōsistentiæ necessariò esse debent. Inter quæ sanè oleū per se, eos laboribus qui summam cutem infestant, persanat: altius autem ingruentes, uehementioresq; , alicui relaxanti, & mediocriter calfacienti cōmixtum: ut chalbano, resinæ terebinting, colophonixq; phryctæ appellatæ. Quibus calidiores sunt abietina, & strobilina. Terebinthinam uerò larix nonnihil calore superat. Cæterū id genus omnia relaxantibus oleis miscentur, quale est Sabinum: iniecta interdum & cera. Iam uerò ἀκροπὸν unguen est, ubi dolor altius infestat, medicamē ex semine abietis, chamæmeli, anethi, & floris populi: præterea susinum, gleucinum, & comagenum: & quæ tum ex medulla, tum adipe componuntur: suillo quidem, moderatissimè relaxante: gallinaceo autem, his uehemētius, & hoc adhuc magis anserino. At adeps leoninus, & pardi, ualidior est, ut iam uehementer calfaciat, eoq; discutiat insigniter. In medio horum, bubuliq; & caprilli, consistit uulpium atq; hyænæ adeps. Meminisse autem oportet. dura corpora requirere ualentiora pharmaca: mollia uerò & humida, minimè talia medicamenta perferre posse. Nec ignoratur, quæ dicuntur myracopa medicamenta, ex acoporū cum unguentis temperatura fieri, nihilo cæteris præstantiora, nisi odoris fragrantia. Acopon Themisonis ab Asclepiade scriptum. Sampsuchi, roris marini foliorum, fœnigræci, sing. sextariū unum. cardamomi, brathyos, sing. sextarij dimidium. vini dulcis sextarios tres, olei yenafrani, trepōdo, cere



MED. SEC. GEN. LIB. VII. 307

libras.ij. conficito ut decet.

Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacei, cyprini, gleucini, ceræ, terebinthi  
næ, sing. vnc. ij. conficito.

Acopon ex  
melle.

Acopon Aphrodæ, *δυσώδης*, hoc est foetidū appellatū.

Ceræ, terebinthinæ, sing. drach. viij. chalbani, drach.

Acopō Aphro  
dæ, foetidum.

vj. olei ueteris, heminas duas, medullæ ceruinæ drach.

vij. conficito.

Aliud ad omnem neruorum do

Acopō ad om  
nem neruorum  
dolorem.

lorem. Resinæ terebinthinæ, drach. lvj. ceræ drach.

xxvij. ammoniaci thymiamatis, drach. xxxij. chalbani

tantūdem. medullæ ceruinæ, drach. xxiiij. olei ueteris

heminas duas. conficito.

Aliud *διὰ τοῦ καστορίου*:

Acopon ex ca  
storio.

hoc est ex castorio: quod solutis, & omni diuturno ma

lo auxiliatur. Oesypi, vnc. iij. medullæ ceruinæ, vnc.

iiij. terebinthinæ, vnc. iij. ammoniaci thymiamatis, chal

bani, castorii, piperis albi, euphorbij, adarces, nitri spu

mæ, opopanacis, sing. vnc. ij. olei styracis, vnc. iij. unā.

olei irini, vnc. ij. olei ueteris, heminam unam. cere feli

bram. conficito.

Vnguentum dolores articu

lorum discutiens. Thuris, piperis albi, sing. drach. x.

aphronitri, drach. viij. myrrhæ, drach. iiij. ammoniaci

thymiamatis drach. vj. aceti, quod sit satis. olei cypr

ni heminam unam.

Medicamen ex populo.

Acopon ad ar  
ticulares, dolo  
res.

Populi nigræ surculorum minam. cucumeris agrestis

rad. lib. iiij. casia fistulæ, lib. ij. vnguenti crocini, lib. ij.

croci, vnc. iij. uini odorati sextarios. xij. olei sabini sex

tarios. x. sampsuchi, ceræ, sing. lib. iiij. Surculos populi

diligenter contusos in uase duplici unguentario conti

neto: quibus sampsuchum, cucumerisq; radices concī

fas adiicito. His uinum superfundito. Omnia diebus

nouem macerari finito. Sequēti die oleum adiiciatur,

& rursus accuratè tunsa, igne non acri incoquito. Po

stea liquori expresso ceram subactam, & medullam li

uem factam indito. Igni imposita coquito. Vbi liqua

ta fuerint, ab igne tollens, crocinum adiungito, moue

toq; continuè. Crocinum uerò læue factum, terrestris

Medicamē ex  
populo ad arti  
culares dolo  
res.

Vuuu ij



testudinis sanguine excipito, ut olei ueteris crassitudi-  
nem habeat. Liquata croco iniecta, rursus tūdito, atq;  
exceptis utitor. Arthritide, & ischiade liberat.

Podagricū me-  
dicamē flauū.

Aliud flauū Clemtiens. Cuius usu nouimus homines  
toto distortos corpore, conualuisse à podagra, chira-  
graq;. Olei Sabini, lib. xij. cucumeris agrestis rad. lib.  
xij. ceræ, terebinthing, medullę ceruine, chalbani, sing.  
lib. j. Oleum diuidimus, & seorsum in eo ranas, seor-  
sum item radices incoquimus. Dein liquore percola-  
to, ad pharmaci confectiōem utimur.

Acopō Haliei.

Acopon viride Haliei. Ceræ, terebinthinæ, olei uete-  
ris, sing. selibram. aphronitri, vnc. iij. chalbani, ærugi-  
nis rasæ, sing. vnc. iij. opopanacis, vnc. vj. ammoniaci  
thymiamatis, manne, sing. vnc. iij. aceti, melini, cypri-  
ni, irini, sing. vnc. ij. seui caprilli, vnciam. conficito.

Acopon Casti.

Casti Acopon, ad diuturnos affectus & conuulsiones.  
Pysselæi, Syriaci vnguenti, utriusq; sextarium. ireos  
Illyricæ, parem modum. terebinthinæ, libram. axun-  
gig tantūdem. Rasuræ naualis, vnciam. Incoquito, ru-  
ta uiridi mouens. Gleucini confectio Androma-

Gleucini con-  
fectio.

chi. Myrrhæ, nardi Indicæ, cuiusq; lib. ij. costi, lib. iij.  
styracis, libram. bdellij, sampsuchi, xylobalсами, iun-  
ci odorati, cardamomi, spathæ, ireos Illyricæ, misyos,  
asari, sing. lib. ij. meliloti, nardi Gallicæ, sing. libram. as-  
palathi, calami, sing. selibram. aristolochiæ longe, tan-  
tundem. roris marini seminis, sextarios duos. thuris, ca-  
stæ, singu. lib. iij. scenigræci sextarios duos. sphagni, a-  
momi, sing. lib. ij. corticis thuris, libram. rosarū sicca-  
rum, lib. ij. carpobalsami tantūdem. croci vnc. iij. bac-  
charum lauri, libram. piperis albi, tantundem. opobal-  
sami, uascula tria. malabathri foliorum, lib. ij. nucleos  
pineos uirides duos. rutę uiridis vnc. ij. salis ammonia-  
ci, nitri, cuiusq; vnc. iij. uini ueteris, sextarios. ij. mu-  
sti boni, uascula duo. S. olei ueteris. lib. v. præparato  
diebus quinquaginta. Ad dolorem lassitudinemq; col-



lendam, medicamen est longè accōmodatissimū.

Acopon Heræ, ad diuturnos dolores coxendicos, ar- Acopon Heræ.  
ticulos impeditos, & paralyfin, admodum efficax.


Olei ueteris, irini, laurini, pyracini, ceræ, sing. lib. vj.  
terebinthine, piperis, euphorbij, singu. vnc. ij. ammo-  
niaci thymiamatis, vnc. iij. castorij, opopanax, chal-  
bani, medullæ ceruinæ, sing. vnc. ij. Liguabilia liqua-  
ta siccis affundito, & unitis utitor.

# G A L E N I P E R G A

## MENI DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM SECVN-

#### dum Loca Liber Primus.



VOD non modò affectus ipsi, sed  
etiam ægri tēperies, naturaq; partis Curationē quę  
affectū, ipsam curationem common indicent.  
strent, alibi à nobis est demonstratū.

In hisce autem cōmentarijs, de com-  
positione pharmacorum ad singulas  
corporis partes congruente, differere est animus: ad  
quod iam negotium accingimur, à uitij capillorum  
exorss. Porro generatio pilorum, eadem est quæ plan-  
tarum. Nam quemadmodum ex istis quædam arte &  
arbitrio agricolæ: quædam, iuxta naturales causas pro-  
ueniunt: eodem modo & in animalium corporibus, ar-  
uo qdem alicui, triticum, aut hordeū, aut aliud quod-  
dam cerealium seminū in se insita habenti, caput assi-  
milatur: alijs uerò herbis quę in \* aridioribus crescūt  
regionibus, reliqui totius corporis pili similem genera-  
tionem sortiuntur. Siquidem non secundum primam  
rationem, sed per accidens quoddam natura ipsos con-  
suevit gignere. Igitur affectus pilorū sunt, tum deper-  
ditio omnimoda: tum coloris mutatio: qualis in utili-  
gine alba, quam leucen uocāt, fieri consuevit. In id ge-  
Pilorum gene-  
ratio, eadē est  
quæ plantarū.  
Pilorum asse-  
ctus.

Vuuu iij



Medicamenta nus autem affectibus, sicuti in alijs omnibus, summè  
sunt semper ta- curādum est, ut quæ præsidia adhibebimus, aut iuuent,  
liā, ut si non aut certè nō noceāt. Atqui usus pharmacorū ametho-  
profint, non læ dos, non modò non potest, sed et obest frequenter.  
dant.

De Alopecia, Caluitie, & Ophiasis.

**Q**uemadmodum ex plantis ipsis, nonnullæ qui-  
dem, ob humorum inopiam resiccatae, extabe-  
scunt: nonnullæ autem, q̄ humoribus à sua natura alie-  
nis imbuantur: eodem etiam modo capilli, aut propter  
penuriam humorum, à quibus consueuerunt nutriri:  
aut propter prauitatem, corrumpi assolent. Ac ppter  
inopiam quidem, caluities accidunt: propter uitium autē  
succorum, Alopecia, & Ophiasis. Etenim læsa capitis  
pars, serpenti similis in ophiasis apparet. Alopecias  
autem, ob id ita appellari ferunt, q̄ uulpibus frequen-  
ter accidunt. Iam uerò, quales tandem sint ipsi corru-  
pti humores, ex colore cutis in capite facillè licebit ti-  
bi discernere. Alijs nāq; albidior apparet: alijs nigri-  
or: atq; pallidior alijs. Quare in istis primū totius cor-  
poris purgationem molieris, aut pharmaco pituitam  
ducente exhibito: aut quod bilem pallidam, aut nigrā  
eliciat: coniectura redundantis humoris, ex colore cu-  
tis inita. Ego uerò hiera exhibita semper ipsos purga-  
ui: aliquando nigro ueratro adiecto, ubi melancholicū  
succum uacuare erat animus: aliquando scammonio,  
si amara bilis purganda esset. Vbi uerò pituitosiores  
exuperare humorem conieci, nihil admiscui. Tales si-  
quidē, præsertim ex capite, hiera ex colocynthide pur-  
gare humores consuevit: simulq; cum ijs, alios quosdā  
etiam si scammonium, aut ueratrum nigrum, aut epi-  
thymum, non addatur. Catapotia etiam ex aloe, quæ  
tum scammonium, tum colocynthidem admixtam ha-  
bent, commodius ita affectos purgare solent. Post to-  
tius autem corporis purgationem, apophlegmatismi  
pituitam è capite detrahare præstat: ac dein, localibus

Capilli a qui-  
bus causis cor-  
rumpi soleant.

Caluities.  
Alopecia.  
Ophiasis.

Color cutis q̄-  
litatem humo-  
rum subtus pu-  
trescentium in-  
dicat.

Pitorum corru-  
ptiōis curatio.

Hiera ex colo-  
cynthide.



uti auxilijs. Cæterum incipientes ophiases & alopecias, per astringentia & refrigerantia præsidia cohibere conuenit: adultæ autem, digerentibus discutiendæ sunt. Ego uerò quendam adolescentem in principio affectionis curauì sola purgatione ex hiera dia colocynthis. Prius tamẽ catapotia ex aloë undecim ei exhibueram, cicerum magnitudine. Habent autem catapotia hæc, colocynthis, partem unam: aloes et scammonij, utriusq; partes duas: quibus partem unã succi absynthij addo. Antea uerò etiam mastichẽ chiam, & bdellium imiscebam. Porro pharmacum extrinsecus adhibendum, si præter hoc quòd uitiatos humores discutiat, etiam idoneum sit ad probum sanguinem attrahendum, ueluti est thapsia, censendum sanè est optimum medicamen. At uerò quum thapsia longè calidior sit, q̃ affectus postulet, meritò eius per se usum uitamus. Exulcerationes quippe excitare consuevit, ac omnino quosdam inflammatos tumores. Quamobrem quædã quæ illius uehementiam mitigent, necessariò admiscemus: id quod ceratum ex oleo aliquo tenuium partiũ (cuiusmodi Sabinum est) prestare commodè poterit. Vñs quandoq; sum etiam sola thapsia, sed uehementi illius facultate, larga aquæ affusione exoluta. Porro ex pharmacis prædicto affectui congruentibus, uehementer quidẽ calfacit euphorbiũ: sufficienter autẽ laurinũ, siue oleum, siue unguen. Licet igitur ipsis per se uti, euphorbio quidẽ, oleo intrito, ac læuigato: laurino uerò, solo, citra alterius admistionem, illito. Si tamen nimis fluidum appareat, parum ceræ ipsi addat. Quum uerò multo calidius sit recens euphorbium, si quidem bimo, aut trimo ipso utaris, ad libram unam Romanam olei, euphorbiũ uncia unam iniicies: recenti autem euphorbio, sicuti & thapsia, & omnibus fortibus pharmacis, parcius utendum est. Peccatũ siquidem infra modum, nullum detrimentum adfert: su-

Catapotion  
ex aloë com-  
positio.

Thapsiæ facul-  
tas.

Euphorbium.  
Laurinum.

Peccata infra  
modũ non ad-  
ferũt detrimen-  
tum.

Vuuu iij



Vetusta phar-  
maca suas fa-  
cultates amit-  
tere.

Vigor medica-  
mentorū ex  
qbus notis ex-  
pendi queat.

Limnitis.

Adarcium.

Alopeciis con-  
gruentia medi-  
camēta simpli-  
cia.

Alopeciis inue-  
teratis optimū  
medicamen.

pra uerò, aliquando exasperat, exulceratq; cutem,  
atq; inflammationem excitat. Similiter etiam fugien-  
da sunt, omnia ualde uetusta pharmaca: quandoquē  
dem uel metallica ipsa, ubi nimis antiqua sunt, suas  
facultates amittunt. Vniuscuiusq; autē medicamentū  
uigorem, iis qui saepe ea conspexerunt, licet cogno-  
scere, tum ex odore, tū ex gustu, atq; adeò interdum  
ex colore, consistentiaq;. Est itaq; inter ea quæ alo-  
peciis conferunt, calidissimum medicamen euphor-  
bium: eo autem minus calidum, est thapsia: post hāc,  
sinapi, nasturtiumq;. Iuxta alium autem modū lim-  
nitis (quæ adarcium & adarce uocatur) nulli horum  
secundum est. Post hāc succedūt sulfur, & nitri spu-  
ma, ipsumq; nitrum molle, ustum, & quod Breni-  
carium uocatur: quemadmodum & aphrolitron al-  
bum, laue, atq; laxum. Deinde ueratrum utrunq;, &  
erucæ semen, & laurinum unguentum, aut oleum:  
ad hāc alcyonium utrunq; ustum, & non ustum: ca-  
lamiq; tum radices, tum cortex, ambo usta. Quin &  
pix liquida, & cedrinum, quod cedriam uocant, &  
murium stercus, ursæq; adeps. Hyænæ etiā, leonis,  
pardalis, anserisq; adipēs cōgruunt: & quicunq; te-  
nuium partium substantiam sortiuntur. Amygdalæ  
etiam amaræ totæ ustæ, cōmodæ sunt: & thus aceto  
acerrimo maceratum. His itaq; omnibus pharma-  
cis licet utaris, fortibus quidem, ceratum liquidum  
temperans: debilibus uerò, laurinum oleum immi-  
scens. Rursus, inueteratas quidem, ac difficulter cu-  
rabiles, cum fortibus persanare conaberis: incipien-  
tes autem & paruas, cum imbecillis. Ad alope-  
cias composita. Euphorbii, thapsiæ, laurini, sing.  
drach. ij. sulfuris uiui, ueratri, utriusq; drachmā unā.  
ceræ drach. vj. misceto, utitorq; hoc, ceu fortissimo  
pharmaco ad inueteratas, ægrèq; curabiles alope-  
cias. Si thapsia nō adsit, pro ipsa licet tantūdem adii-



cere seminis nasturtij, aut erucæ, aut ipsiusmet nasturtij. At loco laurini, picem liquidam pones. Admiscui etiam aliquando mel, nec deterius euasit pharmacum. Porro quæ ex adipibus, ac modica item thapsia constant, similiter prosunt, præsertim si euphorbium & adarcium addatur. Sit autem adipis leonini, pardalij, & hyænæ, cuiusq; pars una: quibus miscere anserinum atq; ursinum poteris: ita ut ad duodecim adipum uncias, thapsiæ aut euphorbij unciam unam iniicias: quanq; ambo etiam potes adiacere, si efficere fortius pharmacum uelis. Auspicari autem semper à leuioribus conuenit, & respectu effectus, quem pharmacum primò admotum produxerit, sic facultatem eius aut lenire, aut augere. In alopecia igitur, primùm quidem capillos nouacula tollere expedit: dein affectam cutem per lintelum nec asperum, nec molle nimis, confricare: ac uidere ad quantum ruborem per huiusmodi motionem peruenit. Magnam nanq; spem successuræ curationis tibi iniiciet, si per modicas defrictiones rubefiat: quæ moderatæ affectionis significatio existit. Si uerò per multas frictiones, tandem succedat rubor, grauiorem tum affectionem, tum curationem indicat: præsertim si quædam cuticulæ, etiam si multum confrices, non rubescant. Præ omnibus autem cauendum est, ne in fortium pharmacorum admotione, cutis ultra q̃ par sit, cõcalescat: id quod tum ex colore ipsius, tum tactu deprehendes. Colore nanq; flauior apparebit, & digitorum contactu satis calidam agnoces. Quare tunc ad molliora trãseundum: aut eodem utendum quidem, sed cerati, aut adipis, aut liquoris cuiuspiã oleosi, ui ipsius exoluta. Vtendum est & olei calidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane, fomētisq; & scarificationibus: necnon cucurbitis, & cerati inunctionibus. Cæterum perse-

Leuiorib' medicamentis esse i primis utendum, quando alopeciiis medemur.

Alopeciæ facile curabilis argumentum.



Alopecie re-  
bellis curatio.

Alcyonium.

Lucernarum  
oleum est te-  
nuius cōmuni.

uerante affectione, ut cū est assidua rasura, & ru-  
bificatione ex sinapi, præscriptisq; frictionibus: se-  
quētib; autem diebus, illita pice, aut oleo cedrino,  
& post frictionem, scarificatu. Quidam uerò acicula-  
rum aceruo affectam cutim compungunt. Post hæc  
omnia, pharmacis quæ ex alto euocare, & meatus  
transmutare possint, utendum. Curandum aut per-  
petuū est, ut in aere calido, insolatoq; (si id fieri pos-  
sit) omne pharmacum applicetur. Hyemis uerò tem-  
porē, præstiterit in balneo his pharmacis uti. Porro  
alcyonium ustum, illitumq; ex lucernarū oleo, me-  
diocres discutit alopecias, pharmacū mediocre quū  
sit. Est autem lucernarum oleum cōmuni magis te-  
nuium partium. Aliud Herge, ad molli carne præ-  
ditos. Sem. erucæ, & nasturtij, nitri, sing. partem  
unam: contritis affunditō picem liquidam, utitorq;.

Aliud à Critone descriptum. Herinaceorum  
cinere permisto ursino adipi, utitor. Aliud. Cala-  
mi radices uistas, adipeq; ursino exceptas, impone.

Aliud ad inueteratas. Muscerdæ, thuris, cuiusq;  
drach. ij. aceto acerrimo dissolutis utitor. Aliud.

Cinerum ranarum minimarum in ollula usta-  
rum, muscerdæ, ueratri albi, radice calami ustæ, pi-  
peris albi, singulorum æquis portionibus aceto ex-  
ceptis, fricato. Aliud ex libris Cleopatrx. San-  
daracham tritam, largoq; uisco querno exceptam, lo-  
co per nitrum prius præparato, imposito. Aliud.

Scillæ, ueratri albi, utriusq; drach. j. ex aceto trita,  
prærasis & nitro confictis, imposito. Aliud.

Muscarum capita contrita affrica. Aliud præ-  
cellens. Murium domesticorum ustorum, panni-  
culi ampelini usti, dentium equinorum ustorū, adi-  
pis ursinī, medullæ ceruinæ, corticis calami, singulo-  
rum æquis portionibus simul exceptis melle, utitor.

Aliud Archigenis, ad alopecias in altum pro-



gressas. Cum aceto, nitri gleba, aut fici folijs, usq; ad dilanationem defrica: deinde deterfo sanguine, be- tam ex uino coctam impone: aut caricas uistas, cum uino, aut lentis farinā ex uino, pro cataplasmate ad- hibe: Aut cantharidas uistas, pice liquida exceptas, ad ceratūq; liquidi formam redactas, impone. Aut testudinis marinæ sanguinem illine. Aut thapsiæ succum cerato exceptum illine. Aliud Asclepia-

dis Bithyni. Spumæ nitri, partes duas: salis ammo- niaci, partem unam: quibus tum uistis, tū tritis, acer- rimoq; aceto dilutis, præscalptam leuiter alopeciam illinito. Aliud Sorani. Stercoris felis aut cro-

codili, drach. viij. sinapis drach. iij. ex acri aceto læ- uigatas imposito. Aliud. Fici folia cum aceto,

donec lanugo prodierit, affrica: dein stœbes succum illine. Aliud. Locum per pumicem proritato,

& sulfuris, spumæ nitri, ammoniaci, sing. æquas ptes mixtas cū aceto illinito. Ad caluescentes præter

ætatem, & ad menti pilos non nascētes, remedium.

Adipis taurini insolati, lib. j. adarces vnc. j. suc- cū thapsiæ, vnc. j. S. myrrhæ, vnc. j. polytrichi, calli- trichi, sing. lib. S. membri asinini, splenis asinini, la-

dani, sing. lib. j. Ladanum in modico uino conterito:

adipem ad aque uaporem liquefacito: dein asininum membrum assatū, donec insumatur, radito: splenem

uerò cum polytricho & callitricho in noua olla tor- refacito: omnia deniq; contusa gleucino, aut sabino

excipito: & ante balneum iis utitor. Sciendum autem est, ladanum sordes esse ab hircorum barbis desum-

ptas: quas illi sibi ex cisthi madore contrahunt.

De capillorum defluuio.

**E**st & alia pilorum affectio, quæ ad raritatem cu- tis, inopiamq; substantiæ pilos gignentis, consequit:

maximè supueniens à morbo cōualescētibus. Qua- propter curatio etiam hoc modo læsorum non eun-

Alopeciis alii<sup>9</sup> progreslis re- media Archi- genis.

Caluescētibus maturius, reme- dium.

Ladanum esse sordes ab hircorum barbis desumptas.

Capillorū de- fluuii causæ.



Capillorū de-  
fluuii curatio.

Astringētia ue-  
hementer refri-  
gerant, alimen-  
tiq; influxū re-  
primunt.

Defluuiis capil-  
lis opimū me-  
dicamē est, qđ  
ex ladano, &  
lentiscipo oleo  
conficit.

dem scopum, quem alopecia, habet. In alopeciis si-  
quidem, ut uitiatum humor consumatur, primum  
scopum habemus: in his uero, ut capitis habitum ro-  
boremus, & alimentum boni succi attrahamus, cu-  
tiq; densitatē & raritatem moderatam restituamus.  
Quamobrem ad pharmaca humectantia aliquid mo-  
deratē astringens admiscere oportet, quale est lada-  
num: quod utraq; in se moderatē complectitur, quæ  
ad hoc symptoma conueniunt: caliditatem nempe  
mediocrem, & astringendi uim moderatam. Quare  
si capiti prius raso, perfricatoq; , aliquo mediocriter  
astringenti oleo (cuiusmodi Hispanū, & lentiscinum  
est) illinatur, maximē ex usu est. Nam quæ uehemen-  
ter astringunt, omnia etiam refrigerant, & alimentū  
influxum reprimunt: propter cuius inopiam capilli  
defluunt. Atqui intentio nostra est sanguinē affluen-  
tem non modō non præpedire, sed etiam prolecta-  
re: cogere autem sensum, & astringere rarefactam  
cutem. Quare ad defluuios capillos omnium præ-  
stantissimum medicamē est, quod ex ladano, & len-  
tiscino oleo conficitur. Quod si largē defluant capil-  
li, maiorq; uideatur esse raritas cutis, pro lentiscino,  
myrteo utendum. Licebit aliquando unguentū ad-  
hibere nardinum, in ætate frigida, & hyemali tem-  
pore: sicuti in diuitibus foliatum, & spicatum. Dēbet  
autem ladanū liquari in duplici uase, ac reliqua po-  
stea illi misceri. Atq; hæc sanē medicamēta mihi suf-  
fecerunt, unā, cū resectoria, salubriq; uictus ratione,  
quæ in plerisq; etiam sola suffecit. Archigenis  
remedium contra defluuios capillos. Ladani &  
absynthij æquales partes, & iuniperi baccas. x. tritas,  
in linteolum illigato, & in oleo per dies quinq; ma-  
cerato, ex eoq; caput illinito, & neq; capilli decidēt,  
neq; gignentur furfures. Aliud Cleopatraz ca-  
pillis augens cito, densansq;, & denigrans. Lada-



num. ex oleo, uinoq; dulci leuigatum, incrassatumq;  
præfrictis illinito.

Comptoria ab exornatoria medicinæ  
parte, quomodo differat.

**C**omptoriæ qdem scopus est, inducere pulchritudinem. Exornatoriæ medicinæ partis, quicquid secundum naturam est, id omne, in corpore custodire: ad quod etiam naturalis pulchritudo consequitur. Indecoro enim aspectu est caput alopecia uitiatum: sicuti etiam oculi cilijs, & supercilijs nudati. Nō solum uerò ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem, pili conducunt. At faciei colorem per pharmaca nitidiorem, aut rubicundiores reddere, aut pilos capitis crispas, aut fuluos, aut nigros, aut auctos: hæc inquam comptoriæ prauitatis, non medicæ artis sunt opera.

Comptoria & exornatoria artis p̄s quomodo differant.

Pili ad qd conferant.

De tincturis capillorum.

**Q**uandoquidem tamen iam consuetudo hæc inualuit, ut uetulæ quidē passim capillos denigrent, tanq̃ turpe sit canos habere: mariti autem id probent, spectaculum permolestū censentes, uxorem aniculā cano capite habere: sanè quæcunq; prædelicijs seipsas ornant, earum nulli tale quippiam à me petenti, exhibui: quæcūq; uerò honestiores, tum ut notæ culpam effugerent, tum ut molestias maritorum uitarēt, capillos suos nigros reddere optarunt, ijs certē, ne ex astrictoria ui nigrorem inferentiū oblederentur, consului, ut cedri liquore uterentur, ita ut tribus aut quatuor horis ante balneum illi inerent, & postea detergerent: idq; per quatuor aut quinque dies facere pergerent. Cedria siquidem non modò nihil lædit, sed etiam cōmoda est eis quæ facilè offenduntur à frigore: abundè uidelicet calfaciēs. Ad hæc, defluentes capillos corrigit, & non defluentes auctiores reddit. Contra uerò, quæ ex austeris & acerbis

Aniculā & cano capite uxorem habere, spectaculum fastidendum censetur.

Capillos denigrari cedri liquore.



composita sunt, magnopere lædunt. Cæterum materia ex qua constant hæc, etiam quippiam tenuiū partium habeat oportet; quo non in superficie tantum, sed in profundo etiam cutem permutet, progrediendo usque ad capillorum radices. Non solum autem in periculo uersatas sepe scio feminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis ab huiusmodi medicamentis inducta. Offenduntur tamen citius, quæ frigidius

Similibus affectionibus facilius singula corripitur: minus tamen periclitari.

Periclitari in morbis minus, quibus contingat.

Capillos tigentia, ab Archigene prodita.

capitis temperamentum sortiuntur. Frigidæ namque particulæ frigidis affectionibus: calidæ calidis corripuntur facilius. Verum minus periculum subeunt, utpote quum à minori causa lædantur, quæ frigidius habent temperamentum. At calidæ, propterea quod agrè & uix tandem lædi à frigidis causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperatæ causis, maiorem læsionem incurrunt. In morbis siquidem minus periclitantur illi, quorum naturæ, ætati, habitui, ac temporis ipsa ægritudo congruit.

Tingentia capillos, ab Archigene prodita.

**R**adicem capparidis cum muliebri lacte, uel asinino ad tertias concoquito, & ad noctem pro cataplasmate imposito. Aut urina canis in quinque aut sex dies asseruata lauato. Aut corticis salicis succum ex oleo affricato. Summè namque denigrat. Denigrant barbam suber aridum & plumbum ustum, cum betæ crudæ succo mellis spissitudine illita. Fuluos aut reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiti. Crispos reddes capillos, si spuma salis cum myrrha confricaueris.

De pharmacis corrumpentibus pilos.

Pilos corrumpentia pharmaca.

**E**X Pharmacis corrumpentibus pilos, quædam propriè psilothra nominantur: quædam capillorum attenuatoria: quædam penitus extirpantia. Atque hæc sanè ultimò nominata, periculosi sunt usus: Ex liquidis igitur est lixiuium tali uis præditum. Ex aridis



autem & metallicis, arsenicū, & sandaracha, & calx non extincta. Manifestum itaq; est, uehementem ipsum uim, per admissionem imbecilliorū pharmacorum, frangi: quorum congruentem miscellæ modum coniciet primò, qui ipsorū uires cognorit. Deinde uerò per experiētiā defectum corrigeret, aut et addet.

*Psilothra Critonis.*

**C**alcis uiuæ partes duas: auripigmenti partem unam. Hæc in mortarium plumbeum cōiecta, aqua aut ptisanæ succo affuso terito: atq; ubi nigra reddentur, calfacta illini, maximè in balneo, iubeto.

*Psilothra Critonis.*

Aliud. Amyli, calcis uiuæ, auripigmenti, sing. ꝑnc. j. contritis utitor ex aqua dilutis.

*Quæ pilos disperdant.*

**D**isperdencia pilos componunt ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum cruore, marinæ testudinis sanguine, lachryma uitis albæ, lachryma hederæ, similiterq; bryoniæ, atq; oleo insulso. Ex marinis item scolopendris, urticaq; marina, & stellis marinis, nitro, & amurca, ad hæc admistis. Quin & fortiora his ex herinaceis & salamandra componunt, in oleo coctis. Admiscent autem ipsis alcyonia, & sandarachen.

*Pilos disperdencia.*

*Quæ pilos attenuant.*

**A**tenuantia pilos, deterforie sunt facultatis. Igitur hordei, fabarum, atq; erui farina, spuma nitri, atq; ipsum nitrum, familiaria pharmaca sunt, omnibus ad tollēdas sordes usurpata. Assiduus autem eorum usus etiā pilos attenuat. Quæcunq; uerò fortius detergent, in ijs qui ualde duros & magnos pilos habent, adhibere oportet. Ac talia sanè sunt nitrum ustum, nitri spuma, & aphrolitrū spumofum, pumex, testæ ustæ, os sepiæ, utrunq; ueratrum, struthium, bryoniæ & dracunculi radix, aristolochia utraq; canchry, radix panacis, atq; id genus alia.

*Pilos attenuantia.*



Quòd si hæc ipsa odorata facere uis, cyperum, melilotum, rosas siccas, iunci odorati florem, iridem illyricam, melissophyllum, & cydoniam herbam eis admiscebis. Si uerò pro diuitibus pharmacū præpares, spicam nardi Indicam, Celticamq; & montanā iniicies; necnon Eretriada terram, solium malabathri, amomū, myrrham, crocum, costum, & hedychrom.

## De furfuribus.

Furfures capit  
tis a serosis suc  
cis oriuntur.

Furfurum capi  
tis curatio.

**Q** Vibusdam se scalpētibus furfuribus similia ex capitis cute decidunt, ob idq; Medici hoc symptoma furfures uocant, à uitiosis iisdemq; serosis succis proueniens, quos absumere propositum est, ijs qui huic malo mederi uolūt. Manifestum igitur est, discussoria & extersoria pharmaca adhibenda esse, præparato prius uniuerso corpore, si uitiosis succis redundet. Admiscuerūt quidam huiuscemodi pharmacis etiam astringentia nonnulla, quibus partem læsam ita corroborarent, ut non faciliè influentes humores susciperet.

Remedium Archigenis contra furfures. Nitri spumam, & atramentum sutorium æquis partibus, cum uino tundito, utitorq; ter aut quater in mense.

Aut uini Rhodij fecem, & punicis, & nitri, pares portiones, cum lupinis affrica.

## De phthiriasi, hoc est, morbo pediculari.

Pedūculi in ca  
pite a quibus  
causis oriānt.

**P**ediculi nonnullis in capite acruatim gignuntur, ex multis humoribus calidis quidē, sed non ad tantam caliditatē progressis, ad quantā perueniunt acres atq; serosi humores. Quare manifestum est, in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiā animalcula huiusmodi gigni possibile est; nō in superficie, in qua ipsi consistunt furfures. Pharmaca itaq; ipsorum necessariò exiccantia sunt, & quæ ex alto trahe re, & euacuare possunt, magis utiq; q̃ ea, que conueniunt furfuribus.

Remedia Archigenis contra morbū pedicularē.  
Staphidis



**S** Taphidis syluestris, partes. ij. sandarachæ & nitri,  
utriusq; partem. j. cū aceto & oleo capiti illine.

Pedicularis  
morbi reme-  
dia.

Aut oxylapathi radicem cum oleo. Aut ueratrum  
album, & staphidem syluestrem, & nitrum, pari pon-  
dere cum oleo in balneo adhibe.

De Achoribus, hoc est ulceribus capitis manātibus.

**I** Nter affectus inuadentes capitis cutem, Achor an-  
numeratur, ex genere tumorum præter naturam  
existens: quo affectu infestata particula, foraminibus  
quibusdam tenuibus erodit, tenui humore modicèq;  
uiscido redundantibus. Ad similitudinē uerò eius pro-  
ximè accedit alia cutis affectio, quæ Ceriō Græcis, La-  
tinis Fauus, uocatur: habens maiora foramina, in qui-  
bus humor hymettio melli similis continetur. Genera-  
tio ipsis ex humore mixto est, qui partim tenuem, sero-  
sumq; ac mordacem: partim crassum succum in se ha-  
bet. Tenuis itaq; humor, utpote mordax, primū quī-  
dem, ad scalpendum ipsos impellit: progressu uerò tē-  
poris, ad sculpturam, tum tumor augetur, tum forami-  
na circa ipsum erumpunt. Manifestum igitur est, hu-  
mores qui affectionem gignunt, debere uacuari. Qui  
si etiam fluant amplius, prohibendus in primis est ip-  
sorum influxus, per capitis, atq; uniuersi corporis eua-  
cuationem. At uerò si affectio ipsa sit parua, sola reme-  
dia localia sufficiunt, uel si minimè totum corpus ua-  
cuetur. Ea igitur pharmaca idonea erunt, quæ crassum  
humorem incidant, quæq; facultate sua necessariò dis-  
cutiant, repellantq;. Atqui acetum ex incidentium or-  
dine existens, ultra hoc quòd discutit, etiam reprimi-  
t, depellitq; id quod influit: \* quum nimirum secundum  
substantiam suam habeat exiguum quid calidi: pluri-  
mum autem frigidi, sed tenuium partium. Esse autem  
debet acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus  
uini qualitas persentiat. Ac tali profectò pharmaca  
metallica imbues, achoribusq; ex ipsis medeberis. In

Achores.

Cerion,

Achorū, fauo-  
rumq; curatio

Aceti facultas



cipere autem ab imbecillioribus præstat, præsertim si simul dolor infestet. Aptæ igitur ad hanc rem sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiaq; terra: præterea pompholyx, spodiū, lithargyros, & cadmia tenella. Quòd si his remedijs malum non cedat, pharmacum ex chara siccum, aceto dilutum illinito. Prius tamen capillos abrades. Quòd si quando in ulcus manans inflammatum simul & afflictum dolore, incidas, lenies primum dolorem ipsum per humectum, cōcoctoriumq; & emolliens pharmacum, & quod acrimoniam arce-re possit: cuiusmodi sunt tum uocatum parygron, tum quæ sedis ulceribus, & cancris opitulantur.

Remedia Archigenis ad achoras.

**C**Admiam cum oleo ueteri illinito. Aut cinbari similiter tritum imposito. Aut chalcit. dē cum myrteo oleo, uel suillo felle liquido inungito.

Remedia Apollonijs ad Achoras:

**C**Aput succo betæ illinito, aut laurino oleo, aut crocino unguento, aut taurina, aut camelina urina. Vel furfurum chœnicem dimidium in aquæ heminis duabus madefacito, posteaq; terito, cremoremq; excolato, cumq; dimidia aceti hemina ad lini spissitudinē coquito, & ex eo caput fricato. Vel cucumeris agrestis radicum coctarum succo partē lēsam illinito. Vel argenti spumæ, drach. viij. foliorum rutæ tenerorum drach. v. olei drach. viij. aceti quartam partem hemina: simul trita capiti illinito.

Quæ Crito ad Achoras prodidit.

**F**Iculneæ surculos, aut folia tenera trita cum aqua imposito. Aut recrementi ferri, & rosarum par pondus cum uino tūdito, impositoq;. Vel lithargyri, drach. L. foliorum rutæ tenerorum, drach. xxv. aceto diluito: & rosaceo, aut myrteo excepta, cum penna illinito. Vel, si affectio fuerit inueterata, Ladani, cerussæ, singu. drach. viij. sulfuris uiui drach. iij. uino &



myrteo oleo subactis utitor.

Ex libris Cleopatrx ad Achoras.

**F**oenograceo tenui cocto, & in betæ nigræ succo macerato, caput eluatur. Post ablutionē uerò myrto cum uino & oleo trita, illinatur: superneq; betæ folia imponantur. Vel cerusse, thuris, sing. drach. ij. sulfuris drach. j. trita ex oleo illinito.

Remedia Sorani contra Achoras.

**P**lumbaginis, sulfuris uiui æquales partes terito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut lētiscino, illinito. Vel sulfuris uiui, lithargyri, cerusse, sing. & aquas portiones, croci dimidiam: trita cum passo cretico illinito.

Ad psidracia, & achoras, pustulasq; ulcero-  
sas, & eruptiones in capite.

**A**D affectiones præscriptas, conuenienti uti oportet uictus ratione; corpusq; atq; caput purgare, catapotijs ex aloe, colocynthide, & scammonio, succo braslicæ coactis. Dein localia remedia adhibenda sunt: cuiusmodi existit adiantum ex rosaceo illitum: aut fœnigræci decoctum affricitū: aut malua cum farina hordeacea pro cataplasmate imposita: aut melilotum cum farina fœnigræci, cicerumq; decocto impositū: aut ipsum met cicer decoctū, impositumq;: aut amare nuces cōmansæ & illitæ. Discutit autē maximè & lilij radix affricita: & thus cum uino & aqua: & lupinorum amarorum decoctum: & bulbi cum nitro affriciti:

thus præterea ex aceto illitum: putamē mali

punici cum laurino illitū: & anchusæ

radix usta, tritaq; cum oleo, &

per pinnam inuncta.


Pustularū capl  
tis medicatio.

X x x q̄



GALENI PERGA-  
MENI DE COMPOSITIONE  
MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca, Liber Secundus.



Capitis dolor  
discrimina &  
generationes  
variae.

Dolor capitis  
nullus ad humi-  
ditatem conse-  
quitur.

Similariū par-  
ticularum mor-  
bi in pura intē-  
perie cōsistūt.

VI citra distinctionem scripserūt au-  
xilia doloris capitis, maius detrimen-  
tum, q̄ emolumentum, attulerunt ijs,  
qui eis fidem adhibuerunt. Nec enim  
omnes ob unam affectionē caput do-  
lent: sed tum ipsae affectiones plures  
sunt, tum curatio ipsarum singulatim propria existit.  
Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicem  
citra humorum affluxum; alia iuxta humorum qualita-  
tem uersatur; tertia, secundum eorum solam multitudi-  
nem accidit; quibus accedit quarta, quum transitus li-  
quorum atq; uaporum ipsi humores obturant; ac prae-  
terea quinta, dum in quibusdam capitis partibus, pro-  
pter imbecillitatem, spiritus flatuosus innascitur. Est  
quum ob causam aliquam procatareticam (cuiusmodi  
sunt ardor extrinsecus, aut refrigeratio, aut ebrietas,  
aut ictus) dolor capitis accidit. Vehementis simili-  
gaur capitis dolores fiunt, iuxta caliditatem & frigiditatem:  
maximē quum inaequales fuerint: moderati autem iux-  
ta siccitatem; ad humiditatem uerō nullus consequē  
dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores,  
capitis dolor oritur, uehementior quidem, ob calidos &  
frigidos accidit: moderatior autem, ob exiccātes citra  
calorem aut frigus. Humectātes uerō, penitus nullum  
dolorem inferunt, quantum ad qualitatem quidem ip-  
sorum attinet: nam ob multitudinem sanē, instrumen-  
talium partium morbos efficiunt: non tamen similariū  
particularum ullum aliquem: quū nimirum earū mor-  
bi in pura intemperie consistant. Ad haec, affectiones  
ob copiam humorum ortae, citra quidem obturationē



caput grauāt: cū obturatione uerò si quidē ea modera-  
ta fuerit, moderatē dolorificæ fiunt: sin fortes, uehemen-  
ter affligunt. Quòd si etiam mordacem qualitātē mul-  
tudo humorum sortiatur, etiam iuxta hanc dolorem  
augebit. Quòd uerò ad naturam affectarum particu-  
larum pertinet, interdum quidem extra caluariam affe-  
ctio fit: aliquando intra: & interdum quidem omnes  
externas, aut internas partes infestat: interdum autem  
non omnes, sed unam tantum speciem corporis: arteriā  
nempe, aut uenam, aut neruum, aut membranā, aut  
cutem, aut ipsum deniq; cerebrum. In uniuersum igit,  
singularum affectionum curationis scopum, ratio nos  
docet: materiæ uerò facultates experientia cōmōstrat.  
Porrò aliquando sola intemperie calida ex insolatu la-  
borat caput: aliquando cum ipsa intēperie accedit etiā  
humorum affluxus: precipuē quum uniuersum corpus  
laborat plethora, quæ fit ipsis quatuor humoribus ex  
equo auctis: aut etiam sanguine solo. Nam quum alius  
quispiam humor redundarit in corpore, non plethorā,  
nec simpliciter plenitudinem, sed pituitæ, aut bilis fla-  
uæ, aut atræ, tunc plenitudinem dicimus. Igitur eis qui  
ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primū  
contactum apparet: oculosq; rubros habēt, ac frigidis  
tum perfusionibus, tum illitionibus, oblectantur. Prin-  
cipio itaq; repulsoria curatione est utendum, ex refrige-  
rantibus, astringentibusq; constante. Postea uerò mi-  
tigatoria & cōcoctoria pharmaca, ad repulsoria misce-  
re oportet. Deinde etiam ex discussorijs quippiam ad-  
dendum, paulatim detractis pharmacis quæ repellūt.  
Optima sunt autem censenda, quæ substantia tenuiū  
partium sunt prædita. Quapropter in principio quidē  
melius est frigidissimū rosaceum perfundere, iuxta frō-  
tem nempe, & tempora, & occiput: non tamen longē  
inferius. Neq; enim facile exurit ea pars: neq; etiam,  
citra noxam, refrigerantia sustinet, propterea q̄ isthic

Capitis dolor  
discrimina, se-  
cundum diffe-  
rentiā affecta-  
rū particularæ.

Plethorā fieri,  
quatuor ex equo  
humoribus au-  
ctis: aut etiam  
sanguine solo.

Doloris capi-  
tis ab ardore  
concreto, iudi-  
cia, & curatio.

Occiput nec fa-  
cile exurit, nec  
citra noxam re-  
frigerari, prin-  
cipiū spinalis  
medullæ quum  
sit.

Xxx, x ij



Spinalē medul-  
lam in sexagin-  
ta nervos diutri-  
bui.

Sincipitis re-  
gionē esse ap-  
tissimū ad trās-  
mittēdas vires  
medicaminum  
applicandorū.  
Rosaceū exu-  
stis cōmodum,  
qualiter cōfici  
debeat.

Chamæmelino  
oleo in quibus  
sit vten dū cer-  
poribus.

Refrigerandi  
medicamenta  
ratio.

Pergamus Ga-  
lii patria.

Stupefaciētia,  
et quę vehemē-  
ter astringūt re-  
frigerando, vi-  
tāda in capitis  
doloribus eē.

principiū medullæ spinalis existat, ad stipitis modū in ramulos complures diuisę, uidelicet in sexaginta (ut existimo) nervos. At uerò regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis ad coronalem futuram, & ob ossium tenuitatem & raritatem, faciliē tum caliditatem, tum frigiditatem omnium quę adhibentur pharmacorum, intrò distribuit. Quare siue refrigerare oporteat ex caliditate ardorem, siue calfacere frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Rosaceum autem ipsum, quo in exustis utemur, ex oleo crudo (quod omphacinum appellant) citra salis admistionem, confici debet: nempe rosas quę plurimis in eo maceratis. Sit autem rosaceum non uetus, sed eo ipso anno confectum. Proximum à rosaceo chamæmelinum existit, quo utendum in ijs corporibus est, quibus inducere uehementem frigiditatem ueremur: qualia sunt fœminarum, eunuchorum, puerorumquę, ac breuiter eorum omnium, qui molli carne sunt præditi, albumquę colorem sortiuntur. Refrigerabis autem quęcunquę adhibere uoles, in aqua uehementer frigida collocata: quę si non adsit, niuem uasculo circumpones. Etenim frigidorum fontium & niuis maxima Romę est ubertas, quemadmodum apud nos in Pergamo. In regionibus autem calidis, qualis Ægyptus est, ubi maxima fontium frigidorum atquę niuis Penuria, sub dio rosaceum per integram noctē exponi debet: eiquę semper ului, aut portulacę, aut lactucę, aut psylli, aut polygoni succū iniicere oportet: sicuti & solani aliquando pa ululum, & pampinorum uitis, & uuarum immaturarum. A papaueris uerò & mandragorę succo abstinendum, quum non citra damnū refrigerent. Vitanda etiam sunt, quę cum refrigeratione manifestē astringūt: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscēdum, si quando necessitas postulet. Propterea sanē & solani succū aut nunquę penitus, aut modicē certē, admiscemus: sic etiam & mali



punici, & mali cydonij, & mespili. Ad hanc tamē rem malorum punicorum acidorū succus præstantior est: magis enim refrigerat. Equidem aliquando cucurbite cremorem permiscui omphacio. Poterit etiam quis similiter seridis succo uti, necnon tum hortensis, tum sylvestris lactucæ. Quin & mororum non admodū maturorum succus est aptus ad refrigerandū. Si igitur calvus sit æger, aut breues habeat capillos, uberrimē refrigerari poterit: tum per iam dicta, tum per omnia illa quæ erysipelatis auxiliant. Qui ex frigore caput dolent, ijs facies decolor, minimeq; arefacta conspicitur: & frigidus neq; gaudent, neq; item iuuantur. Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum rutaceum oleum, si calidum affundatur sincipiti, perfectē hominem liberat. Si uerò uehementiori calore sit opus, euphorbium oleo indatur, & pharmaca quæcunq; cōstant ex pipere. Inungenda autem est facies, ac tum aures, tum nares, precipuē irino, amaricino, & nardino unguētis: necnon solatis, spicatisq; uocatis. At opobalsamum sæpe expecti sumus ad nullam affectionem calore indigentē, euidenter opitulari. Sampsuchinum autem, laurinum, & serpyllinū cōmendo. Propinādum p̄terea ijs est uinū tenuium partium, & motus corporis præcipiendus, lauaq; calida: & quandoq; à raphano uomitus. In capitis autē inueteratis affectibus, necessarō pilos radimus, aut præsecamus ad cutim usq; ac rasis quidē, admouemus pharmaca emplastica: liquida uerò ijs, q̄ breuissimē habent capillos præsectos. Ac sanē medicamenta refrigerantia, ex ijs quæ erysipelata curant, sunt transferenda: calfacientia uerò, ex pharmacis calfacientibus conficiēda: quorum simplicissimum est ex euphorbio compositum. Sufficit autem uncia euphorbij unā, ad tres ceræ liquefactæ in olei libra una, conijcere. Atq; utendum quidem astrin genti oleo, ad affectiones quæ indigent calore, non est: sed aliquo tenuiū

Refrigeratū  
sylua, qbus tu-  
to vti in capi-  
tis doloribus  
possumus.

Doloris ca-  
pitis orti a fri-  
gore idicia, &  
curatio.

Opobalsamū  
ad effectiones  
indigentes ca-  
lore, nō magno  
pere opitulari.

Dolorum capi-  
tis inueterato-  
rum curatio.

X x x x i i j



Dolorum capi-  
tis ab ebrieta-  
te curatio.

partium, cuiusmodi Sabinum existit.

Quibus autem ob potionem calidiorum uinorum, ca-  
put repletum uaporibus aut humoribus calidis (solent  
etiam hi uel absq; uini potu, suapte natura ad caput at-  
tollit) dolore affligitur, iubendi n̄ sunt, si crudum adhuc  
in eis uinum p̄maneat, ut hausta aqua tepida uomāt.  
Quòd si etiam post concoctionem caput doleant, re-  
frigerantibus ac repellentibus est utendū: quae est ro-  
faceum per se, & cū aceto, aut hederæ, & brassicæ cre-  
more. Quin & ipsa brassicæ folia calida macerata, ca-  
pitiq; circūposita, ac obligata, naturaliter ebrietate re-  
sistunt. Cæterum somni quietisq; cura in primis habē-  
da est: ubi uerò per totum diem quieuerint, ad uesperā  
loti, cibis boni succi nutriendi sunt, non tamen calfaciē-  
tibus. Sunt autem tales prisanæ succus, & sorbitio ex  
alica, & panis ex aqua, & oua sorbilia absq; garo. Ad-  
misceatur autem eis ex melle, uel ex sale condimentis  
aromatum præparato, quantum sit satis ad suauitatē  
saporis. Ex holeribus congruit illis lactuca, utpote bo-  
ni succi atq; refrigeratoria: necnō brassica, ut q̄ uapo-  
res resiccet: sic & ex leguminibus lens. Potu uerò om-  
nino aqua utendum est. At quia nonnullis uentriculus  
à frigidæ potu subuertitur, malum punicū ipsis super-  
edēdum est, aut solum per se, aut cū alica flaccida cali-  
da, p̄beq; cocta. Quin & mala Cestiana appellata in  
urbe Roma, citra cocturam quidem, sunt austera. post  
cocturam uerò, stomacho euadunt cōmoda. Coquen-  
da autem sunt ad uaporem aquæ suspensa. Abstinen-  
dum uerò à palmulis est, ut quæ ex proprietate dolorē  
capitis excitent. Quòd si moderatē iam habeant, &  
aquā bibere nequeant, permittendus est eis potus ali-  
cuius uini diluti et aquosi, quale est in Italia Sabinum:  
in Asia Titacazenum. Quin & moderatē habētibz,  
gallorum testiculi & alæ, & saxatiles pisces, mollesq;  
exhibendi sunt: necnon columbarum pulli. Hæc uerò

Cestiana mala

Palmulas ex  
proprietate ex-  
citare dolorem  
capitis.



omnia, citra garum et uinū, in albis simplicibusq; co-  
quantur iuribus, quæ ex aqua, oleo, anetho, ac modico porri constāt: ad cocturæ finem, salis pauxillo adiecto. Cæterū ante cibum quidem pluribus deambulationibus est utendum: post acceptū uerò cibum, breuibus, ac lentis. Oportet tamen nec multa edisse, nec statim post cibum sumptum inambulare, sed post duas, aut tres, aut plures horas. Quòd si quando à uaporibus aut humoribus in caput sublatis, reliquæ quædam supersint, in poris ipsis, meatibusq; angustis impactæ, & ob id etiam perseueret capitis dolor, non rosaceo, sed utendum primū chamæmelino est, moderatè calido: postea uerò irino. In balneo uerò caput calida perfundatur, nō modò ut aliquid eorum quæ circa ipsum consistunt, discutiat, sed somni etiam conciliandi gratia. Quapropter secundum etiam, aut tertium, ad uesperam, balneum apparandum est: post quod exhibendæ lactucæ ex aceto, cui pauxillum, aut omnino nihil gari additum sit: uerū aqua affusa multa, ita ut acetū exaquet, nisi acetum sit planè aquosum: quale utiq; illi desyderant: quando quidem quod acerrimum est, aliquem calorem sortitur. Post hæc uerò postera die, quæ magis caput calfaciant, administranda sunt: ita ut ad irinum aliquando amaracinum unguentum, aliquando nardinum addamus. At capitis dolor ob plagam cōspiciuam ortus, nihil est aliud q̃ inflammationis: quæ non ex plaga solū aut casu, sed absq; manifesta etiam causa, iuxta omnes partes fieri ob affluxum humorum consueuit. Si igitur plaga uulneris aut cōtusionis existat causa, plures scopi erunt ad inuenienda præsidia. Vnus qui circa uulnus uersatur, quod, postea q̃ fuerit constrictum fibulis, glutinantia & arcentia phlegmonem medicamenta postulat. Secundus contusioni est intentus. Tertius, to-

Albi iuris cōpositio.

Balneum conciliat somnū.

Capitis dolor ob plagam ortus, quos medendi scopos largiatur.



Dolor capitis  
ex ictu vel ex  
tus, cur sepe ex  
tendat per uni  
uersum caput.

Capitis dolor  
ex plaga, quan  
do existat peri  
cufus.

Meningem ce  
rebri uulnera  
tam congruti  
nantia.

tus in doloribus est: qui interdum quidem in ipsis so  
lis percussis partibus fiunt: plurimum autem ad ui  
cinas etiā partes se extendunt. Etenim pericranium,  
& eius cutis exterior, propriam continuāq; substan  
tiam habent, per totum caput extensam: ob idq; sanē  
contingit uniuersum caput dolore affici: præsertim si  
ad perioftion membranam, quæ cranio est adhæ  
rens, plaga ipsa penetret: cui medebimur diuidentes  
pericranium membranam, subdiumq; illi os raden  
tes, utq; illic rursus concreascit caro, curantes. Quod  
si ob cōmercium illud quod per futuras perioftion  
habet cum duro cerebri inuolucro, etiam intra calua  
riam distribuatur phlegmone, non absq; periculo ta  
lis dolor contingit. Contingit autem non rarò, ubi  
quis tex sublimi cecidit, ut aliquid circa cerebrū, aut  
membranas eius, rumpatur: quod ubi cōtigat, adhuc  
amplius inualefcit ipse capitis dolor: affectioq; tota  
ægrè curabilis redditur, & periculū maius, magisq;  
præceps imminet. Optimum itaq; fuerit in his, nisi  
ætas prohibeat, uitalis uel facultas appareat debilis,  
curationem à uenæ sectione auspicari: & conuenien  
tibus capitis irrigationibus subinde uti, oleo dulci  
imbuentes lanam, capitiq; illam circumpor. entes.  
Quod si aut per ætatem, aut uires, non liceat sangui  
nem ipsum detrahare, deiciēda alius per clysmum  
est, tum ut eius excrementa uacuentur, tū multo ma  
gis ut reuellantur humores ij, qui consueuerunt fer  
ri ad affectas pticulas. Postea uerò auxilijs utemur  
ad inflammationes congruentibus. Si igitur meni  
brana cerebri uulnerata fuerit, egregiè ipsam cōglu  
tinat (ut ait Archigenes) calaminthæ succus infusus,  
& farina milij arida inspersa: deinde butyrum & ro  
saceum, ac adeps suillus insulsus, uetusq; , omnia in  
unum commixta, tepēfactaq; , & infusa. Hoc modo  
affectos, à uino & cibis crassioribus abstinere oportet.



ter, maximè si correpti sint febrì. Etenim affectio ipsa nobis auxilia indicat: quantitatem autem singulorum, particularemq; materierum differentiam, tum affecta particula, tum ægri temperamentum com-  
monstrat: necnon uitalis facultas: deinde ætas: ambientisq; nos aeris temperies, iuxta regiones, anniq; tempora, & prædominantem anni constitutionem euarians. Porro ad phreniticos, quandoquidem omnia quæ extra caluariam circa cutem atq; ipsum pericranium consistunt, immunia ab affectu sunt, rectè, mea quidem sententia, alijs pharmacis acetum miscuerunt ueteres. Siquidem ad affectiones in profundo delitescentes, pharmaca diuersa ab iis, quæ affectibus in superficie hærentibus congruunt, debent administrari. Exoluitur namq; omnium ipsorum uis in transitu per profundum: & ob id ad propria affectioni auxilia, aliquando contrariæ, & nocentis facultatis pharmaca temperamus. Quippe acetum ex se, quum nec mitigandi, nec laxandi uim habeat, præter rationem miscetur auxilijs ijs, quæ ad dolentem inflammationem administrantur. Quia uerò per sinciput pharmacum penetrare uolumus, ob id sanè ali-  
quod eorum, quæ in profundum deducunt, miscemus: interdum qdem frigida facultate, sed tenuium partium, præditum: cuiusmodi acetum existit: interdum uerò calida, quale est euphorbium. Quocirca, dum crassæ membranæ cerebri nudè instillamus rosaceum ( quod fieri solet, ubi ossiculus aliquod est exemptum ) solum ipsum leniter tepesfactum infundimus. Quum uerò citra denudationem, integra existente caluaria, rosaceum cupimus ut per sinciput ad membranam cerebri penetret, acetum illi, ut ipsum perducatur eò, temperamus: cuius uehemens facultas, tum per uiarum transitum, tum per rosacei miscellam, exoluitur. Iam uerò, inflammationes quæ in ca-

Affectiones sitæ in profundo diuersa pharmaca ab iis, quæ hærent in superficie, desiderant.

Acetum cum miscetur rosaceo ad phrenitidē.

Fractio cranio, commode instillari rosaceum tepens in crassam meningē. Acetum quando sit rosaceo miscendum ad affectiones capitis.



Acetum rosa-  
ceo mistū, qui-  
bus proſit, &  
quib⁹ obſit in-  
flāationibus.

Myrrhæ odo-  
rem conciliare  
dolorem capi-  
tis.

Opio quando  
ad capitis do-  
lorē urī debeat  
mus.

Hominem in  
multis halluci-  
nati.

Capitis dolo-  
ris ob uentricu-  
li cōſorti: ob-  
orti, & indicia,  
& curatio.

pitis cute, aut etiam in pericranio consistunt, si qui-  
dem citra uehementem dolorem accidunt, per mo-  
dici aceti ad rosaceum mitionem iuuari possunt: le-  
dentur autem, si & magnæ fuerint, & dolorem uehe-  
mentem induxerint. Adhæc, rosaceum cum aceto, in-  
cipientibus: in uigore uerò consistentibus, rosaceum  
solum administramus: quemadmodum etiam in in-  
duratis, absynthium ei atq; pulegiū miscemus: nam  
quæ absq; duritie iam decrescunt inflammationes,  
pharmaca laxatā desyderāt. Porro ad dolores capi-  
tis, in quibus exiccare est animus, commodissimum  
cataplasma ex lolij farina & adipe anserino confici-  
tur. Sciendum autem est, myrrhæ odorem plurimis  
etiam sanis dolorem capitis conciliare: unde eos ip-  
sos qui iam caput dolent, non parum offendet. Opio  
autem eo tantū tempore uti cogimur, dum præ do-  
loris uehementia æger de uita periclitatur. Extinguit  
siquidem sensus, maximeq; solidas partes offendit,  
adeò ut postea correctione sit opus. Quum autē dif-  
ficile sit, ut qui homo est, non in multis hallucinetur,  
quædam uidelicet penitus ignorando: quædam ma-  
lè iudicando: quædam negligentius scriptis traden-  
do: mirum cuiquam esse non debet, si aliquādo deli-  
quisse comperiatur Archigenes, in ijs quæ de curatio-  
ne capitis doloris conscripserit.

De capitis dolore à uentriculo exorti.

**N**onnulli autē uel si modicus humor in eorum  
uentriculo colligat, & præsertim circa os eius,  
statim caput dolent: atq; ob id, si diutius à cibo absti-  
neant, offenduntur. Augetur quippe esuriētibus eius-  
modi humorum malicia. Quum igitur huiusmodi af-  
fectus capiti proprii non sint, sed ab humorum no-  
xijs uaporibus à uentriculo uolitantibus exoriātur,  
quemadmodum etiam ob id genus succos, alijs suf-  
fusorum symptomata eueniunt: capiti adhibenda re-



media non sunt: sed q̄; celerrimè qui in uentre con-  
tristant succi, uacuandi. Vacuantur autem in ijs qui  
ad uomitum sunt procliues, facillè ab aque potu: egrè  
uerò uomentibus, difficius. His igitur conabimur  
q̄; primum cibum boni succi, ac uentriculo commo-  
dum exhibere, si res ita ferat, à balneo: si nō, ante bal-  
neum tantum cibi offeremus, ut non lædantur inde  
postea lauantes. A cœna autem modicum absinthij  
in potu dabimus: postridie uerò, in posterumq̄; , si-  
milem uictus rationem illis instituemus, donec exa-  
ctissimè concoquant. Quo tempore iam licebit illis  
modicum panis præbere circa tertiam aut quartam  
horam, aut citius, aut tardius: sic tamen, ut satis am-  
plum spatium ad consuetam balnei horam intersit.  
Quod si qui panem absq̄; obsonio edere nequeant,  
his oliuas, aut palmulas, aut uuas, aut tale quippiam  
addemus, iuxta naturæ cuiusq̄; proprietatem. Cæte-  
rùm ad prauorum in uentre colligendam succorum  
copiam, plurimum conducit tum imbecillitas conco-  
ctricis potentia: tū oris uentriculi infirmitas; quem-  
admodum etiam ad capitis hinc dolores gignēdos,  
tum facilitas sensus, tum caput ad eiusmodi humo-  
rum uapores suscipiendos promptum: sicuti etiam  
& in nōnullis oculi. Qui igitur propter acres humo-  
res caput dolent, mordacem dolorem, non tēsiuum,  
percipiunt: at fames in tensionibus commoda est:  
contraria autem iis, qui mordaces humores college-  
runt in ore uentriculi. Quum itaq̄; hic mordax hu-  
mor fuerit amarus, pallida & flaua bilis uocatur: quæ  
ob leuitatem insitam sursum fertur, ad os uentriculi:  
quum uerò pituitosus, aut acidus, aut salsus fuerit, ma-  
gis in totius uentris spatio continetur: ac fuerit sanè  
optimi, si in fundo uentris is cōtineatur. Omnium  
autem est pessima constitutio, dum uitiosi humores,  
uentris tunicis ineluibiler sunt deñxi, & imbibiti:

Vitiosis succis  
in uentriculo  
colligēdis, quæ  
conferant.

Famem aduer-  
sari iis q̄; mor-  
daces humo-  
res collegerūt  
in ore uentri-  
culi.



Hieræ picræ,  
optimi medica-  
minis ad ex-  
purgandos hu-  
mores tunicis  
uentriculi infi-  
xos, descriptio.  
Crocī odorem  
ferire caput.

Hiera picra q-  
bus congruat  
affectibus.

Dolor unde  
exoriatur.  
Cōtinuitatem  
quæ soluant.

Phlegmone fit  
a sanguine.  
Erysipelas ori-  
tur a flaua bi-  
le.

quibus educendis optimum remedium est hiera pi-  
cea, cuius talis sit compositio. Aloes, drach. C.  
cinnamomi, spicæ nardi, xylobalsami, Chia masti-  
ches, asari, & croci, ling. drach. vj. Præstantius au-  
tem est pharmacum, ubi minus de aloe additur: mi-  
nus q; etiam ex croco: quando quidem nōnulli ex usu  
ipsius oblæduntur capite: id quod sæpe ex solo eius  
odore perpetimur, Quare optima erit ea compositio,  
quæ aloes drach. xc. croci quinas receperit: qua sa-  
nè ipse utor. Præstat etiam pro asaro carpesiū conij-  
cere. Propinatur ad summum ex pharmaco drach-  
ma una cum aquæ calidæ cyathis tribus: minimum  
uerò, dimidium eius præbetur. Confert autem hoc  
pharmacum, ijs qui suffusorum afficiuntur sympto-  
matis, & mulieribus quæ non pro dignitate purgan-  
tur. Quemadmodum autem in uentris & intestino-  
rum regionibus ob caloris quidem inopiam, inter-  
dum ex cibo ac potu uapor flatulentus producitur:  
propter imbecillitatem uerò facultatis comprehensi-  
uæ, adedò inflantur atq; replentur ea organa, ut ipsius  
quidem repletionis ratione tendantur: ob rēfionem  
autem impense doleant: sic etiam in partibus quæ ad  
caput pertinent, possunt hæc eadem contingere. Et  
enim ob dissolutionem continuitatis partium dissi-  
milarium, dolor oritur. Dissoluunt autem ipsam, ero-  
dentia, dissecantia, distendentia, uehementer calfa-  
cientia, atq; refrigerantia. Si igitur erosionis, aut pun-  
ctionis sensum percipiāt ægri, acredo uel humorum,  
uel flatus, causa putāda est. Si uerò citra morsum ten-  
dantur, tensio ipsa uel ab spiritu flatulento, uel ab hu-  
moris colluue, oboritur: quo in genere phlegmone  
erysipelas q; consistit: phlegmone quidem, ubi pluri-  
mum sanguinis affectam particulam occupat: erysi-  
pelas uerò, ubi biliosus fuerit is humor. Quod si ab  
utrisq; redundantibus aliqua pars repleatur, aut in-



inflammatio erysipelatoſa, aut eryſipelas inflamma-  
 tum talis affectio erit. Maximè itaq; artis curandi con-  
 iectura in affectionum cognitione conſiſtit: quæ ubi  
 inuentæ fuerint, curationem non coniecturaliter, ſed  
 ſcientificè indicant: cum hoc quòd etiam cognoscere  
 datur, q̃ ægrè aliquæ affectiones medelis cedant: in  
 quibus ut utamur ſemp̃ remedijs ab indicatione pro-  
 ſectis, rationi eſt conſonũ: tamenſi nihil iuuare in prin-  
 cipio uideantur. Aliquando enim adeò uehementer  
 in anguſtijs meatuũ flatus uaporofus, atq; eo adhuc  
 magis uiſcidus craſſus ue humor, impingitur, ut mul-  
 to tempore ad curationem ſit opus. Ac ſanè quæ ſic  
 infarta ſunt, attenuare oportet, dilatareq; meatus, per  
 quos excernantur, habita ſimul prouidentia, ne quid  
 aliud amplius influat: utq; p̃s affecta corroboretur,  
 ne ipſa etiam flatulentum gignat ſpiritum. Qui igitur  
 primi ad eiufmodi affectiones pharmaca compo-  
 fuerunt, meritò habuerunt opus materia uaria: ſi qui-  
 dem influentem ſubſtantiam, ſiue humor, ſiue uapor  
 ea ſit, repellere neceſſarium exiſtit: impactam uerò  
 concoquere, & attenuare, eandemq; ipſam diſcutere:  
 ac nihilo minus, immo longè magis, affectæ parti ro-  
 bur inducere, ne uidelicet quod influit, ſuſcipiat: utq;  
 attenuatum excernat, impactumq; concoquat, atq;  
 ſubtilius reddat. Ergo in propoſita diſpoſitione, ſi do-  
 lorificus calor unà cum ſpiritu flatulento præpolleat,  
 in principio quidẽ repulſoria curatione eſt utendum,  
 quæ ex facultate refrigerante conſtat. Quod ubi fa-  
 ctum moderatè eſt, ex mitigatorijs & concoctorijs  
 quippiam ad repulſoria miſcere oportet: dein diſcuſ-  
 ſoria addēda ita, ut paulatim repulſoria detrahamus,  
 donec pharmacum ipſum plurimũ quidem digerens  
 attenuatoriumq; reddatur: minus autem concocto-  
 rium & mitigatorium: miſimum uerò repulſorium.  
 Portulaca igitur refrigerantis & aquoſæ ſubſtantix

Tumores cõ,  
 poſiti.

Coniectura ar-  
 tis medicæ, in  
 affectuum co-  
 gnitione conſi-  
 ſtit.

Præſidia opti-  
 ma, cur ſepe in  
 principiis nihil  
 iuuare uidean-  
 tur.

Impacta eẽ co-  
 quenda, atte-  
 nuanda, diſcu-  
 tiendaq;.



**Aceti facultas.**

**Boreæ frigidi-  
tatem, esse te-  
nuū partium.  
Rosacei facul-  
tas.**

**Inedia nō esse  
utēdum in cau-  
sis biliosis.**

**Vena in qui-  
bus non sit se-  
canda.**

**Clysmos for-  
tes ualide re-  
uellere a capi-  
te.**

**Capitis dolen-  
tis remedia.**

**Capitis dolo-  
ris a bile orti,  
indicia, & cura  
tio.**

**Bilis qbus me-  
dicamētis pur-  
ganda.**

est: minus ea polygonum: in solano tantum crassæ & terreæ est admistum, quantum attritionis. Acetum repulso-riam simul & attenuatoriam, immo & disculso-riam facultatem sortitur: utpote quod secundū tem- periem, frigiditate quadam tenuium partium prepol- leat, nō secus q̄; exquisitè serenus Boreas. Rosaceum porro, repulso-riæ, concoctricis, mitigatricis, ac deniq; disculso-riæ facultatis est princeps. Vt ergo sermonem iam habitum repetam, neq; in biliosis causis iniun- genda est inedia: neq; utendum uenæ sectione, si puer aut senex sit æger, aut uirium imbecillitas adsit. Licebit autem uti ualidis clysmis, q̄; maximè hi pos- sint reuellere à capite, uacuareq; non modò quæ cir- ca uentrem & meienterium consistunt, sed etiam quæ in simis hepatis hærent. Commendat autem Archi- genes irrigationes ex ruta, oleo, & aceto intrita, ad do- lores capitis: sicuti & succum baccarum lauri cū ace- to, & ruta. Sciendum uerò est aridam rutam esse mul- to acriorem, & calidiorem uiridi. Qui caput ob humorem biliosum dolent, iis signa similia sunt eis quæ ab ardore proficiscuntur. Accedit his maior mor- sus, & faciei pallor, & nonnunquam oris amaritudo. Aetati autem uigoris, & temperaturis calidiori- bus, & uitæ sollicitæ, & iis qui flauam bilem accumu- lant, hæc affectio præcipuè cōtingere solet. Itaq; bal- nea temperata, & unctiones, & potus dilutus, eis exhibēda sunt, omnisq; uictus ratio tum \* humidior, tum boni succi, constituenda. Euacuandus item bi- liolus humor per absynthij cremorē est, aut per aloē, & per ipsam picram antidotum, per se datā, aut mo- dico scamoni adiecto: uel per catapotia ex aloe con- fecta. Illinenda frons pastillo croceo, aut appellato Trigono, aut aliquo alio his simili. Si cum uni- uerso corpore caput consortij lege afficiatur, prospici- endum illi est. Igitur si plenitudo humorum, ac ma- ximè



ximè circa uenas constiterit, tundemus uenam. Si uerò magis qualitas inualuerit, utemur purgati pharmaco. Si caput uni tantum parti condoleat, ut hepati, uentri, aut ipsius ori, illis in primis opitulabimur: nepe calida in ipsis præpollente intemperie, panem ex diluto uino exhibentes, sorbitionesq; ex alica: ac foris etiam utentes irrigationibus, quæ tum refrigerent, tum firmitudinem addant. At si ob uiscidos & crassos in uentriculo contentos humores caput quis doleat, etiam hos exturbabimus, acetum mulsum in potu præbendo. Ex hyssopo etiã origanoq; potionibus, & quæ his adhuc ualentiores sunt, magisq; incidendi ui præditæ, utemur: necnon à radiculis uomitu, irrigationibusq; & cataplasmatis calidioribus.

In doloribus autem capitis qui ab initio inuaserunt cum febris, uena secanda est, post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediatur: & præsertim in corporibus bonæ habitudinis, & multo sanguine redundantibus. Quod si serius post septimam diem dolor ipse prehenderit, aluo prius abundè per clysterem soluta, cucurbitulæ ad occiput, aut ceruicem, sunt affigendæ: caputq; irrigationibus ex oleo fouendum: rosaceo quidem, & cum modico aceto, in calidioribus, & tempore æstiuo; chamæmelino uerò, in frigidioribus habitudinibus, ac hyeme: quinta parte aceti illi adiecta. Illinenda frons in frigidioribus quidem, est ex cyphi: ex crocomagmate aut, in calidioribus. Porro uitandæ sunt in oibus capitis affectionibus ea quæ subduntur: nepe viticis semē, absynthij succus, lac in potu, glâdes quercinæ in cibo, oliuæ nigræ, arbuti fructus, eruum, quod etiam exoluit articulos; amplius autem offendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem etiam perturbant lentisci fructus, crocus, paucedanum, cyclaminus sicca cum uino epota. Styrax modicus quidem potatus, tristitiam uultus discutit: multus uerò, somnos turbat.

Capitis dolorum cum febre ab initio affligenti, curatio.

Cucurbitulæ quando affligendæ occipiti.

Capitis in omni dolore quæ sunt uitanda.

Crocus perturbat mentem.

Styracis facultas.



lentos conciliat.

## De Cephalæa.

Cephalæa.  
descriptio,

**C**ephalæa inueteratus & ægrè cedens capitis dolor uocat, qui ex leui occasione maximas exacerbationes habet: adeò ut neq; strepitum, neq; uoces uehementiores, neq; lumen splendens, neq; uini potum, neq; odora menta caput repleant, ægri perferre possint: neq; item motum: sed in quiete & tenebris decubere ob doloris magnitudinem uelint. Etenim tanquã à malleo percuti sibi uidentur. Sunt qui ueluti contundi ac distendi sibi ea quæ circa caput sunt, sentiunt: nõ paucis uerò usq; ad oculorum radices ipse dolor progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando quidem continuos dolores: aliquando uerò exacerbationes, & interualla. Manifestũ igitur est, hanc affectionem con-

Cephalæa magis deicit facultatē, q̃ cephalalgia.  
Cephalæa varia symptomata a diuersis causis producta.

Dolor capitis intra caluariã situs. cur extendatur ad oculorum vsq; radices.

re, quemadmodum in cephalalgia. Verũ ad maiorẽ imbecillitatem deueniunt in hac affectæ particulæ capitis. Ac sanè quidam ex sic affectis, cerebri inuolucra dolitant: quidam pericranium dũtaxat. Dolores igitur cum grauitate, multitudinem humorum significant: cũ mordacitate uerò, aut humorũ, aut uaporum acredine: ut cum pulsu, obortam inflammationem: at cũ tensione, si quidem citra grauitatem & pulsum accidat, spiritus tenuis ac flatulenti multitudinem indicant: cum pulsu uerò, membranosi corporis inflammationem: at si cũ grauitate distentio accidat, humorũ multitudinem intra membranas contẽtam arguit. Rursus, dolores quidam in superficie herentes, pericranei affectionẽ significant: qui uerò in profundo sunt, cerebri inuolucrorũ. Quibuscunq; autẽ affectio intra caluariam est, ijs usq; ad oculorum radices dolor extendit, propterea q̃ oculorum tunicæ ex cerebri inuolucris suam ducunt originem. Si uerò putrefactus humor calidior fiat, cũ febri capitis dolor inuadit. Febricitant autẽ omnino, & qui



dolent propter inflammationem. Si igitur totius corporis plenitudo sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore uniuerso uacuato. Si uero imbecillum existēs caput, sublatos ad se humores ac uapores susceper, materiā reuellere oportet in totum corpus, atq; ita mederi particulæ. Reuellemus itaq; & clysmis, & uinculis extremorum, & pluribus ifernarum partium frictionibus, interdū etiam sanguinis ex cubito detractiōe. Quod si amplius redundare sanguis uideatur, etiam reserata in naribus uena, & sanguine, quantum par sit, vacuato. Dein hieram dabimus exacutā: posteaq; apophlegmatismis elicientibus pituitam, & medicamentis quæ naribus inferuntur, utemur, qualia sunt quæ ex elaterio, & cyclamino cum lacte & porro apparantur. Caput autem curabis, quando quidē reuulsorij uti oportet, per repulsorias irrigationes. Caterū post totius corporis euacuationem, uteris caput uacuātib; deinijs quæ firmitudinem addant. Repellit igitur immaturum oleum, rosaceumq; per se, & cum aceto, & expaupaueris capitulis, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, & menta uiridi præparatum. Applicentur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior multitudo humorū extiterit: frigida uerò, ubi calidior, biliosiorq;. Digerit autem oleum dulcis simū calidum, & magis inueteratum, itemq; sicyonium. Si uerò cras sior sit copia humorum, spondylium, aut serpyllum, aut pulegij comam, aut calaminthen, aut mentham, oleo incoquens, multitudinem euacuabis. Eadē hæc parti etiam firmitudinem addunt, quapropter usq; ad perfectam curationem ipsis utendum est. Omnium porrò longè maximè discutit perfectè corroborat uerbenaca recta, oleo incocta. Coniicienda etiam ad eam crocodiliadis præsertim iuxta aquas nascentis, radix. Maximè etiam conferunt sub hydrijs aselli nascentes, si oleo incoquantur. Aduerte autem, capitum papaue-

Reuellēdi a capite modi diuersi.

Venam reserata in naribus conferre ad dolorem capitis. Errhina.

Caput esse uacuandū post totius corporis euacuationem. Repellentia.

Digerentia.

Verbenacæ rectæ facultas. Ascelli.

Yyyy ij



Papaueris ca-  
pitibus quādo  
sit nobis vten-  
dum.

Sal est ad capi-  
tis fomēta inc-  
ptum.

Perseæ fructū  
in Persis letalē  
ēē in Ægypto  
autē innocuū.

Cucurbitulis i  
affectibus capi-  
tis quādo vte-  
dum.

Cohibitio spi-  
ritus.

Sternutatoriū  
ab Asclepiade  
scriptum.

Apophlegma-  
tismus Ascle-  
piadis.

ris usum, tempestiuum esse incipiente affectione: nocere autem, si ijs in dolore inueterato utantur. Iuuant uero non instrenue fomenta tum ex semine lini & rosaceo; tum etiam confecta ex milio: nam quæ ex sale fiunt, ob grauitatem, capiti negotium facecunt. Archigenes inter cataplasmata uaria, uiticis semen, perseg uiridis folia, & myrrhā æquis partiōibus mista, exceptaq; Ægyptio unguento, fronti admouere præcipit. Cæterum in sola Alexandria ipse Perseam arborem uidi: cuius fructum in Persis quidem letalem esse; in Ægypto autem innocuum, sunt qui contendunt. Porro sanguinis à locis affectis detractiones conuenire in affectibus inueteratis, non Archigenes modo, sed omnes serè Medici consentiunt. Verum cucurbitæ occipiti affixæ, ex reuulsorijs auxilijs sunt, quū humores ad oculos, aut ad anteriorem capitis partem ferri consuetos, auertere properamus. Iubet autē Archigenes ut sternutatorijs quatiāmus caput, fasciolaq; circumposita collo, spiritu cohibitionem moliamur. Iam uero, ad affectiones frigidas inueteratas, eadem medicamenta ex thapsia & sinapi soleo adhibere: minimè autē ad calidas. At chamæmeli (quā anthemidē uocāt) florem quidē, olfactu auxiliari dolenti capiti, ait Archigenes: folia autem nocere. Sternutatorium ab Asclepiade scriptum. Veratri albi, radicucumeris syluestris, struthij, sing. partes. ij. castorij, acori, nitri rubei, euphorbij, cumini Aethiopici, sing. partem. j. trita insufflato. Medicamen ab eodem traditum, quod mansum caput purgat. Piperis albi, origani, staphidis syluestris, cassiæ, sing. drach. ij. excipiantur passularum exacinarum, aut caricarum carne, & mādenda exhibeantur. Cæterum non statim à principio efficacissima adhibere conuenit, sed à debilioribus auspicari. Porro fortia pharmaca, quibus ad mouēda sternutamenta utimur, mitigatiorum admistione lenita, moderata sūt. Ob id quædam ipsorum muliebri lacte



recēti & aqua diluo: post hoc, oleo dulci: dein betæ suc-  
co: & anagaliidis quæ florem cœruleum habet, itidem  
succo: atq; ita sensim in usu eorum progredior, donec  
postremum etiam per opobalsamū tālia dissoluo. Ego  
autem melanchium soleo infundere naribus: aliquando  
quidem aceto acri præmaceratum: aliquando oleo ue-  
teri intritum. Interim uerò dum æger errhinis utitur,  
habeat os aqua plenum.

Errhina quib;  
leniri debeant  
liquoribus.

Os aqua replē  
dum esse, dum  
quis errhinis  
utitur.

#### De Hemicrania.

**H**emicrania uerò affectio dolorifica est, dimidiam  
tantum capitis partem infestans: interdum quidē  
dextram: interdum autem sinistram: quæ futura exten-  
sa secundum illius longitudinem, terminatur. Vt pluri-  
mum autem per circuitus exacerbatur, influxu uapo-  
rum, aut humorum, causam dolori suggerente. Quidā  
igitur ipsorum circa temporum musculos uehementer  
dolitant: quidā dolorem longē ulterius progrediētem  
habent. Sunt qui adeo uehementer cruciētur, ut ne ma-  
nus quidem contactum facillē ferant: in quibus palā  
est, pericranium affectum esse, neq; eius cutem omni-  
no immunem ab affectione existere. Rationi igitur cō-  
sentaneum est, uaporum, aut humorum, aut utrorūq;  
influxum, aut à cerebro & illius inuolueris, aut ab uni-  
uerso corpore illuc trāsmitti. Quapropter ubi quis he-  
micraniam curare aggreditur, prius quali purgatione,  
aut uenæ sectione æger indigeat, consideret: atq; ita  
deinde ad capitis auxilia progrediendo, tum per digi-  
tos suæ manus, tum per linteū, dimidiam frontis par-  
tem, & eam maximē quæ circa temporis musculū est,  
confricando excalfaciat: id quod ante exacerbationis  
tempus faciundum est. Post exacerbationē uerò, phar-  
macis hemicranicis dictis utendum: si quidem multa  
caliditas in doloribus percipiatur, ijs quæ refrigerans  
quippiam habet: citra uerò hanc, eis quæ \* sufficiēter  
excalfaciūt. Vtriusq; tamen aliquid ex ijs quæ robur &

Hemicranie  
descriptio.

Hemicranie  
causæ.

Hemicranie cū  
ratio.

Yyyy ij



Hemicranis i-  
ueteratis reme-  
dium,

Euphorbiū re-  
cens quidē, esse  
candidius; pal-  
lidius autē in-  
ueteratum.

Pergamus pa-  
tria Galeni.

Hemicranis fri-  
gidis quę opitu-  
lentur.

firmitudinem addūt, misceatur, quod astringentem ui-  
delicet facultatem sortiatur. Porro ex meis præcepto-  
ribus quidam ad hemicranias inueteratas utebatur pi-  
peris albi, & crocemagmatis singulorū drachmis dua-  
bus; mistis cū euphorbi drachma dimidia. Quum au-  
tem cito facultas euphorbi exoluatur, in huiuscemodi  
sanē medicamentis non est utendum ueteri. Est autem  
candidius, quod recens est: nam quod inueteratū exi-  
stit, flauiozem aut pallidiorē sibi colorem contrahit.  
Similiter etiam & columbarum turricularum, sibiq;  
uictum quærentiū, stercoris, & atramenti scriptori, li-  
cebit addere utriusq; dimidiam drachmam: ex ipsisq;  
omnibus aceto acerrimo dilutis, conficere medicamē  
hemicranie sanandæ idoneum. Ad hanc autem rem,  
Pergamenum nostrū atramentū multo est præstātius.

Aliud pharmacum ad hemicraniam, & omnem in-  
ueteratam capitis affectionem summē utile. Croci  
drach. xv. chalcāthi, drach. x. aluminis scisilis, drach.  
xij. myrrhæ, opij, omphacij, sing. drach. iij. gūmi, drac.  
xv. omnibus tritis vinum Phalernum adiice, et rursus  
tanq̃ collyriū tere, deindeq; in pastillos redige. Postea  
uero ex posca dilutis utere. Sæpe simpliciter euphorbi  
illitione misti cum oleo & cera, sum usus. Sufficit au-  
tem ad libram olei cuiuspiam tenuis, ceræ quadrantē  
inijcere, & euphorbi vnciam vnam: quo quidem me-  
dicamine vtendum in ea tantū hemicrania est,

quæ à frigidis causis oritur. Iuuat etiam hos  
si oleum tepidum instilletur in aurem:  
euphorbi vncia, cum libra olei  
prius temperata.




## GALENI PERGA

## MENI DE COMPOSITIONE

## MEDICAMENTORVM SECVN-

## dum Loca Liber Tertius.

## De affectibus aurium.



VRIVM dolores nonnulli quidē fiunt ex frigiditate; nonnulli ob inflā-  
mationem, uel cutis meatū auris am-  
biētis, uel etiam nerui auditorij. Qua  
uerò ratione inflammatio ipsa partes  
inflammatas distendens, dolorē exci-  
tat, eadem flatulentus spiritus, transitum non habens,  
dolore cruciat. Consimilis etiam fit dolor à serosis hu-  
moribus \* in toto corpore genitis, ei qui ex mordaciū  
humorum forinsecus aduenientium illapsu contingit.

Dolores igitur à sola ortos frigiditate, calfacientia  
q̃ celerrimè curant. In quem usum solent nonnulli ru-  
stici exenteratas cæpas oleo replere, & in feruenti cine-  
re modicè calfacere, atq; ita auribus ipsum infundere.  
Alij non cæpas modò, sed allium etiam oleo frigentes  
postea ipsum instillant auribus. Ego uerò euphorbio  
omnino modico, ad multū uetus oleum admisto utor,  
ueluti etiam pipere exquisitissimè trito. Prodest etiam  
amaracinū oleum ipsis infundi, & optimam nardum.  
Quòd si aliquod oleum tenuium partium, in quo rutā  
præcoxeris, auri infundas, magnopere iuueris. Magni-  
ficè autem eos mitigat oui candidum, quo etiam ad lip-  
pitudines utimur: itemq; lac muliebre. Plurimum iuuā-  
tur item, ex adipe anserino, uulpinoq; infundi tamen  
omnia debent mediocriter calida.

At si inflammatio adsit, nardinum unguentū, cum phar-  
maco appellato Basilico cōmodissimè infunditur. Por-  
rò medicamen Basilicon, alio nomine dicit tetraphar-  
macum. Est etiam & Cōmagenum perutile, & ex adi-

Dolores auris  
quæ causæ ex-  
citare possint.

Doloris auris  
a frigidi-ate  
orti remedia.

Aurium inflā-  
matarum cura  
tio.  
Basilicon phar-  
macum.  
Tetrapharcū.

Yyyy iiij



Opium quibus  
miseri debeat  
ad inflammatas  
aures.

Sapa ex musto  
dolorē sedat.  
Dolore affligē  
te, præstat om-  
nino nō tange-  
re auditorium  
meatum.

Rosacei opti-  
mi compositio

Doloris aurium  
a flatulento spiri-  
tu, aut a crassis  
humoribus ex-  
citati, curatio.

Aristolochia  
triplex.

pibus pharmacum. Cogente uero dolore, necessum est etiam his quæ sensum stupefaciant, uti. Miscetur autem opium muliebri lacti, & oui candido, quæ ipsa per se, sæpe aurium inflammationibus contulerunt. Miscetur etiam & castorio opium: uerum multo ante usum tempore, præparatum id esse oportet: & miscetur quidem, in uehementissimis doloribus, pari in minoribus autem duplo. Liqueor quo hæc diluuntur, sit sapa ex musto: multo namque magis hæc, quam dulcia uina, dolorem sedat. Verum ego nullum pharmacum dolore uexatis infundo, neque etiam per lanam instillo, nimirum experientia edoctus, quod præstat neque omnino contingere doloris tempore auditorium meatum. At remisso dolore, per auriculare specillum, obuolutum lana mollissima, partem dolentem foueo: pharmacumque in iuncio modice tepescitum in aurisuforio specillo: postea uero forinsecus tui orificio auditorij meatus, cum uniuersæ auri, mollem lanam impono. Iam quæ ex fomentis crassa & spissa fuerint, cuiusmodi sunt spicata & foliata unguenta, diluenda sunt ungento nardino: uel (si æstas sit, & caloris sensus ægrum in aure inflammata infestet) rosaceo, uel amygdalino. Conficitur bonum rosaceum ex oleo immaturo, salisque: experte, in quo plurimæ rosæ sint maceratæ.

Si uero flatulentum spiritum, aut humorem crassum & uiscidum, qui transitum non habeat, inclusum esse coniecero, etiam ex pharmacis liberantibus ab obstructione, quippiam admisce. Porro frigidityte antegressa, spiritus flatulentus colligitur: grauitate uero capitis, cibisque: pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humores: quibus si accedat frigiditytas, dolores contingunt. In his igitur spuma nitri, & nitrum ipsum molle, eiusmodique: aphrolitrum, & oleum amygdalinum, rationabiliter in pharmaca auricularia miscentur. Ex hoc genere est utrumque: ueratrum, & struthium, & amygdalæ amaræ, & ex tribus aristolochiis, quæcunque fuerint ad



MED. SEC. LOCĀ, LIB. III. 345

manum, & iris Illyrica. Inijcies aut & cinnamomum si habueris, aut, si id non habeatur, casiam, tum eam quæ Zigit, tum quæ Motos uocatur: ac præterea Carpesium. Aurium etiā meatus ab obstructione liberāt, quæ lapides in renibus atterunt: atq; omnia breuiter, quæ tenuium partium substantiam absq; mordacitate sortiuntur. Ex quorum numero est etiam cucumeris syluestris radix, itemq; bryonia, & ari, & dracunculi, & cetaurea, & polii, & omnino amatorum omnium. Rursus, moderate aurium inflammationes, & nō pulsatiles, rosaceo & aceto simul temperatis, tepesactisq; atq; infusis curantur. Glaucium etiam ex aceto in cote medica tritum, doloribus à modica inflammatione ortis opitulatur. Prestat autem pastillum ex glaucio, multæ sanè utilitatis pharmacum, prius præparatum habere: qui fit ex glaucio probè cum aqua pluuiali trito, deinq; in pastillū coacto, exiccatoq;. Licebit uerò decimam quintam gummi ad glaucium portionem addere, ut melius compingi in pastillum possit. Quin & collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita, eis profunt, auribus instillata: atq; his nihil minus collyria ex croco. Ulcera aurium recentia, tum glaucium solum cum aceto tritum curat: tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco & ex rosīs cōfecta: quemadmodum etiam quod Nili dicitur. Curat item ea Damocratis collyriū ex myrrha. Quæ uerò pure manant citra dolorem, atq; id moderate patiuntur, iisdem medicamentis curantur. At quæ fortiter affliguntur, per eiusmodi qualis est pastillus Andronis, & qui ad Musam refert, sapa, modicoq; aceto dilutus. Quod si hæc ab ipso morbo uincantur, scoria ferri ad plurimos dies in sole ex acerrimo aceto contrita, laeuigataq;, est in trepidè utendum. Huiusmodi etiā ulcera pastillo meo, ex charta combusta ipse aliquando curauī. Porrò per papaueris succum mitigantur aurium dolores: haud

Casia duplex.

Aurium meatus obstructos quæ referent.

Aurium moderate inflamationes rosaceo & aceto simul temperatis curantur.

Pastilli ex glaucio, ad inflamas aures.

Aurium ulcerarū remedia.

Aurium purulentarum curatio.

Pastillus ex charta combusta.

Papaueris succus aurium dolores mitigat: affectionem autem non sanat, nisi ex acciden- ti quodam.



item affectiones iuuantur: nisi fortè ex accidenti quis eas iuuari dixerit, q̃ nimirum sedato dolore, atq; inde somno sequuto, natura ipsa affectus dolorem gignentres concoquat. Per aurium autem inflammationes, galinaceus atq; anserinus adeps, si quidem euacuatum corpus inuenerint, & humorem, qui inflammationem excitat, non amplius influentem, dolorem leniunt, affectioni q; auxiliantur. Si uerò humore adhuc fluente adhibeantur, affectioni quidem nihil opitulantur: leniunt tamen doloris symptoma: ut si ob humorum acredinem aliquis morsus contingat. At pharmaca ex papaueris succo, omnia sensum stupefaciunt: & ob id sanè tunc solum illis cogimur uti, ubi nullum aliud mitigatiuum doloris contulit. Miscetur autem castorium papaueris succo, ut uehementem eius frigiditatem retundat: quo nomine etiā meconium ipsum, & quidem rectè, nonnulli torrent: quāquam satius mihi uidetur uti illo minimè torrefacto, inueterato tamen, & cum castorio permisto. Porro galbanum susino unguento dilutum, melli q; & rosaceo commistum, discutit citra molestiam aurium inflammationes, in quas nihil fuit iam amplius, doloribus q; à frigore opitulatur. Ad uehementes aurium dolores medicamen ab Andromacho scriptum. Castorij drach. ij. succi papau. drach. iij. opopanacis drach. ij. spumæ lycij, drach. j. passo excipito, & tepesactis utitor. Aliud eiusdem ad purulētas aurium & ueteres affectiones. Fabæ Aegyptiæ internæ amaræ, aluminis scissi, piperis albi, spumæ nitri, croci, opij, malicorij, myrrhæ, thuris, nardi, sing. drach. ij. castorii, drach. j. aceti & mellis, quod sit satis, conficito. Aliud eiusdem, ad dolores flatulentos, & aurium sonitum congruens. Nitri, myrrhæ, sing. drach. j. rosacei cyathum. j. aceti tantūdem: simul tritis utitor. Aliud ad aurium sonitus. Veratri albi drach. j. castorij obolum. j. spu

Stupefacienti.  
bus quādo co-  
gamur uti me-  
dicamentis.



mae nitri sexquibolum: tritis cum aceto optimo utere.

Aliud ad purulentas aures. Alumen scissum ustum, & myrrham cum melle terito, & praelotæ auriculæ pharmacum lana exceptum imposito.

Auricularis compositio probata, ex Apolloniæ libris.

Myrrhæ, thuris, sing. drach. ij. nucum amaranthi drach. j. spumæ nitri, drach. ij. aluminis scissilis, malicorij, sing. drach. j. spicæ nardi drach. ij. aloes drach. iij. uini nulli ueteris, cyathos. iij. Arida trita uino mulso admisceto, & cocta in stanneo uase reponito, ac tepido utitor.

Ad carnem excrescentem in auditorio meatu: quo usus est Heraclides Tarætinus.

Aeruginis rasæ drach. viij. squamæ æris drach. iij. mellis heminæ dimidium. Arida trita, ac melle excepta, donec rubeant, coquito: & ablatis utitor.

Aliud ad sanguinis ex auribus eruptiones, Heraclidæ Tarentini. Marubij succum exprimito, & acetum dilutum infundito.

Aut mali punici in aceto cocti succum exprimito, infunditoq;.

Aut polygoni succum cum modico aceto. Ad uermes innatos auribus, ueratrum album cum melle imitte, aut aridum insuffla: aut rubi succum infunde.

De sonitu aurium.

**E**X Sonitibus aurium, alij quidem, spiritus flatus lentius sunt soboles: alij uerò, ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt: quemadmodum etiam in oculis oriri solent suffusorum imagines, ob uapores exhalantes ab ore uentriculi. Cæterum neutrius affectiōis exacta cognitio haberi in principio potest. Porro si in febribus sonitus fiant, minimè interturbandi sunt: ut plurimum namq; statim sedantur. Si uerò ob flatulentum spiritum, cui non pateat exitus, sonitum fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc rem dissecantibus, attenuatorijs, ac discussorijs admotis pharmacis, nihil contulerit: simulq; apophlegmatismis usus sit, & uniuerso prospexerit capiti: huic merito in hanc suspicio-

Aurium ex crescenti ulcere remedium.

Aurium sanguinem effundentium, remedium.

Aurium uermes exterminantia.

Sonitum in auribus causæ.

Sonitus aurium per febres non esse cōpescendos.



Sonituū auri-  
ob exquisitam  
sentiendi faci-  
litate[m] citior[um],  
curatio per stu-  
pefacientia[m].

nem inclinatus animus erit, uidelicet sensus audiendi exquisitam facilitatem, causam eius rumor[is] existere: præsertim si acuto audiendi sensu præditus esse æger appareat. In talibus igitur, ex sensum stupefacientibus quippiam soleo admiscere: cuiusmodi est mandragoræ, & papaueris succus.

Ad sonitum remedia ab Archigene prodita.

Sonitui auri-  
remedia uaria  
ab Archigene  
prodita.

**I**N Sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum, & oleum, crassitudine mellis. Aut radicis syluestris cucumeris succum. Si uerò protrahatur, omnibus amaris, acribus, attenuatorijs, & discussorijs, quibus utimur ad dolorē ex crassis humoribus ortum, utaris, singulis in aceto coctis, admistoq; melle. Aut reclinato egro, & nitro trito in aurem insperso, acre acetum infunde tepidum, ac postquam feruere desierit, exerge lana, & nucum amararum succum infunde, lanaq; obtura. Cæterum quibus ob maximam ad audiendū facilitatem, id genus sonitus fiūt, castorium & cicutæ semen cum aceto trita instilla.

Ad auditus grauitatem.

Auditus graui-  
tatis curatio.

**I**N Surdastris, qui exiguas quidem uoces omnino non audiunt, magnas autem uix percipiunt, hoc ipsum symptoma ualde suspectum habere oportet. Paulatim nanq; temporis progressu augescens, perfectam surditatem inducit. Quapropter per hieram purgandi sunt, et per catapotia ex colocynthide: pituitaq; eis per apophlegmatismos detrahenda, & caput resiccandum est, eiq; ut robur addatur, omni studio curandū. Vtendum etiam attenuatoria uictus ratione. At in ipsam aurem pharmaca iniicienda sunt, quæ crassos uiscidosq; humores cōminuant, & dissecent. Cuiusmodi existunt hæc, quæ Apollonius prodidit. Caparum succo & resina oleo dilutis, utitor. Aut oleo nucum & resina mistis pariter utitor. Vel adipem anserinum, & fel bubulum, ac laurinum, ex æquo mista instillato. Porro



surdastri contrariis præfidiis habent opus ipsi qui aurium doloribus infestantur. Quippe in doloribus affectæ partes exquisitam quietem desiderant; surdastri uerò, uehementem motum postulant; transmutationemque in contrariam ei, quæ iam adest, dispositionem.

Fomenta ad aurium dolorem, ab Apollonio scripta. Fomentis porro utendum est per spongiæ aqua calida imbuta, sac sufficienter expressas; itemque per cucurbitas affixas. Amplius uerò & per uaporem ex arundinibus perforatis allatum. Oportet autem alteram arundinis oram, auriculae cavitati adaptari; alteram uerò, in ollam perforatam habentem operculum, & undique obturatum, incumbere. Sit autem in olla absinthium in aqua feruefactum, quo uapor inde sublatus perferatur ad auditorium meatum. Confert etenim hoc fomentum etiam auditui graui.

Aurium dolor  
fomenta.

Archigenis ad surditatem remedia.

**C** Halbanum cum aceto & melle feruefactum instilla. Aut collurio ex nitro, fici, & sinapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea uerò assiduè acutisque uocibus, & uicissim grauib; inclamamus; & per tubam sonitu incusso, conamur malum depellere. Post hæc, & asphodeli radices oleo ueteri incoctas, commodè infundimus, caprinaque assidue eluimus urina.

Surditatis re-  
media ab Ar-  
chigene scri-  
pta.

Eiusdem de corpusculis quæ auribus illabuntur.

**Q**uod si aqua illabatur auræ, auxiliatur acetum, & cum altero pede, qui respondet affectæ auri, exilire, aliquantulum se ipsum inclinando: hoc enim modo facile excernitur. Quin & exuctio simplex per os, aut etiam per stipulam, egregie aquam extrahit. Si uerò calculus, aut fabæ, aut consimile quid in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito: aut lana circa auriculum specillum obuoluta, & resina tincta, extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharmacum fieri po-

Aures illapsa  
corpa quo mo-  
do ab eis excu-  
rienda.



test. Quòd si neq; sic sequatur, sternutatorio in nares iniecto, os ac nares obturato. Facta nanq; spiritus inclusi extensione, id quod est illapsum, efflabitur: idq; assidue, donec excidat, facito. Nam si intus manserit, aure inflammata conuulsiones inducet. Optimè etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, cōcusio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum, & in caput sublatum, concutiens ipsum uibrabis. Si uerò perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatum, caput ad tabulam firmare iubeto: dein leuata tabulæ iuxta caput parte, deferri finito, idq; sæpius facito. Mouebitur enim sic quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur. Atq; ita angusta & concava specilli parte immissa, scitè extrahito. Si uerò faba, aut consimile quippiam in aurem illapsum, in ea hæreat, maledactumq; & tumefactum, dolores inferat, impossibile quidem est integrum ipsum eximere. Quare per specilli concuum diuidere id industriè expedit, atq; ita particulatim extrahere: deinde sapam, aut uinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex laniatione oblæsum. At uerò si animal aliquod sit illapsum, scammonium aceto dilutum, aut absynthij, aut peucedani succum, nitrumq; ac sulfur, cum radiculæ succo instillato.

## De parotidibus.

Parotidas esse glandularum secundum aures inflammationes. Inflammationum incipientium curatio.

Parotidum medicatio.

**P**arotides è genere quidem inflammationum existunt. Fiunt autem, glandulis secundum aures affectis. Cæterum prima parte curationis partium inflammationarum in eis minimè utimur. In illis siquidem plurimum curatione reprimente, repulsoriaq; uti conuenit: præcipuè quum nec malignum sit, nec multum quod influit: nec uniuersum corpus plethoricum. Sic nanq; spongia sola ex posca imposita, incipientes inflammationes represcit. Verum in parotidibus con-



trariam curationem molimur: nempe pharmaca attra-  
ctoria adhibentes: & si hæc nihil memorabile efficiât,  
etiam cucurbitulas affigentes, aut fomēta assidua ad-  
hibentes, conantes q̄; ut infestans humor ad cutim ip-  
sam trahatur: præsertim si affectio in capite hæreat.  
Similiter quum natura per acutas febres, redundantes  
humores ex uasis ad regionem inter cutem et subiecta  
corpora pellit, quandoquidem illis etiam glandulæ  
imbuuntur, multo satius uidetur tunc opitulari naturæ,  
febres per \*abscessus curanti. Verū si uehementi im-  
petu influant humores, nihil nos curiosius agētes, om-  
nia permittemus naturæ. Nam siue cucurbitam, siue  
aliud pharmacum humores ex alto eliciens, admo-  
uerimus, uehemens dolor hominem apprehendit, un-  
de & uigiliæ, & febres oriuntur, atq; exoluuntur uires.  
Mitigare itaq; tunc, & non influxum prouehere, opor-  
tet, per cataplasmatum maximè lenientium usum: cu-  
iusmodi est quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis  
lini farina, cum mulsâ, aut fænigræci, aut althææ, aut  
chamæmelorum decocto conficitur: & quæcūq; non  
modò humectam habent caliditatem, per quam miti-  
gare dolores ualent, sed etiam influentes succos pos-  
sunt concoquere, suppurareq; . Quod si etiam sanguis  
redundare uideatur, per uenæ ipsum sectionē uacua-  
binus, præsertim si liceat per uires. Ergo si humor non  
discutiatur, suppurantibus pharmacis est utendum: cu-  
iusmodi est frumenti farina cum oleo & caricarū de-  
cocto: itē quod ex polline & fermento conflatur phar-  
macum. At si suppuratæ fuerint parotides, tūc aut per  
sectionem pus elicere oportet, aut per pharmacū ab-  
scessum rumpere, quale est Smilium uocatū, & quod  
ex alijs constat: aut tētare, ut ipsum per attractoria &  
tenuantia medicamēta discutiamus: bis in die iisdem  
ablatis, & fomentis admotis, donec dolores remise-  
rint. Vbi uerò iam plurimum puris discussum fuerit,

Naturæ impe-  
tus quando mi-  
nime sit iuan-  
dus.

Cataplasma  
dolorē leniens.

Suppuratio qñ  
& quibus me-  
dicamētis mo-  
lienda:  
Pus suppurata-  
rum parotidū  
quibus modis  
uacuandum.



tunc iam primum semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet; dein uerò neq; ex re est id facere, sed ipsis pharmacis permittere, ut si quid reliquum in profundo hæreat, ipsum discutiant. Quòd si durities adlit, ea ipsa quoq; mollienda est, emollientibus medicamentis ad attractoria admittis.

Parotidib<sup>9</sup> uaria remedia ab Archigene prodita.

Plantago constat ex facultate discussoria simul & repulsoria.

Repulsoria quoniam miscenda medicamentis parotidum.

Archigenis ad parotidas. Rumicis radices in uino tenuium partium coctas, applicabis parotidibus citra uehementem dolorem ortis. Aut buccina marina, aut purpuras uistas, melle aut axungia exceptas imposito. Aut ficum aqua marina muria ue incoctam, admoue; aut lanam etiam butyro imbutam. Cõmendat etiam usum plantaginis, tametsi ex mistis facultatibus, discussoria nempe & repulsoria constet. Ego uerò nunquam pharmacis ad parotidas destinatis repulsoria admisceri operæpretium existimo, nisi fortè aliquando pauxillum repulsorii, multo discussorio addatur; idq; ubi citra uehementem dolorem ipsæ irruunt parotides.

Aliud Archigenis ad discutiendas parotidas. Lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, modica calce uiua addita, pro cataplasmate imposito. Aliud. Picis brutiæ, mannæ thuris, utriusq; drach. j. terebinthinæ, palmularum Syriacarum nõ ueustarum, pinguium, carnis puræ, utriusq; drach. ij. omnibus simul unitis utitor. Aliud. Caricarum, chalbani, nitri, sing. drach. j. sulfuris, tertiam unius drachmæ partem, terebinthing, opopanacisq; utriusq; pauxillum, simul unitis utitor. Quòd si medicamentis parotis non cedat, Archigenes consulit esse confugiendũ ad cucurbitulã, adhibita scarificatiõẽ. Porro simplices parotidas curat, emplastrum Mnaseg, & quod ex succis constat, & quod ex prifana. His molliora adhuc, sunt cerati forma, tũ ex butyro, tũ ex œsypo conflata, ostreis, aut buccinis, aut purpuris uistis additis, adipeq; porcino salis ex parte, singulis quadrantis pondere. Sic ipsum etiam



etiam licet conficere. Butyri, vnc. j. ceræ vnc. ij. S. ostreorum vstorum, redactorumq; in pollinem, vnc. ij. Conficito & vtor. Efficacissimum nanq; est ad parotidas.

De affectibus narium.

**E**X genere tumorum præter naturam polypodes Polypodes.  
in naribus generantur: ut ozæna ex genere ulce-

rum. Secundum genus autem excretionum præter naturam, sanguinis effusiones contingunt in morbis acutis. Primum itaq; de ozænis sermonem faciam, quæ ex humorum acrium, putrilaginosorumq; influxu gignuntur: nam si ij duntaxat sint acres, ægrè curabilia ulcera inducunt, graueolentia uerò non item. Cæterum cura cõmunis tum his ambobus, tum etiam polypo est, primum caput siccare, corroborareq;: quũ palã sit ob redundantiam uitiosorum humorum, fieri ab eo in ipsas nares defluxum. Capite roborato, naribus adhibenda curatio est, scopo in ozænis proposito, ut affecta pars per mixtę facultatis pharmaca, tum repellentia, tum discutientia, exiccetur. Repellunt itaq; tum austera, tum acerbata, quæ communem astringentium appellationem sortiuntur. Discutiunt calidam & siccam uim obtinentia. Archigenis remedia ad ozænas. Obline eos chalcitide, uel atramento sutorio, uel psorico, ex melle tritis. Vel iridem & sandaracham cum melle illinito.

Ozæna a quibus gignantur humoribus.

Ozæna atq; polypi cõmunis curatio.

Repellentia q;

Discutientia q;

Ozænarum remedia.

De polypo narium.

**P**olypus tumor est qui præter naturam in naribus generatur, polypodis carni as similis. Quę affectio ex crassis & uiscidis humoribus gignitur: ob idq; mixta medicamentorũ materia indiget, quę partim astringat, partim secet & tenuet, partim etiam discutiat, condensetq;. Asclepiadis ad ozænas remedium. Aluminis scissi, drach. ij. myrrhæ, sandarachę, sing. drach. iij. gallę drach. j. æris usti, tantundem. Tritis utere, na-

Polyp i descriptio, causę, remedia.

Ozænarum remedia varia.



ribus prius uino odorato elotis, & pharmaco per specilli extremum admoto.

Lamponis ad ozænas, egilopas, polypos, & quæcunq; uelis citra sectionem, uisionem uel extirpare, remedium. Scobis æris rubri, vnc. j. salis ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis tantūdem, aluminis rotundi, quadrantem, aceti acerrimi heminas sex. Arida terito, & affuso aceto, omnia in uas æris rubri conijcito, in eoq; ad solem sub ardore caniculæ cum rubri æris radio agitato, donec exarescat pharmacum: quod postea in mortariū translatum, diligenter terito, in fictiliq; recondito. Vsu uerò exigente, aquam sorbendam dato, quæ ut ore cōtineatur, præcipito: dein pharmacum per fistulam insufflato, uel etiam melle exceptum immittito.

Escharas ingentitas naribus, excutiedas sternutatorijs eē.

Punicorū succū ad ozænas polyposq; magnifice cōmendat Galenus.

Rosarum puluis in quibus curare polypos soleat.

Cæterū post huiusmodi pharmacorū adhibitionem, etiam sternutatorijs utimur, quo uidelicet tectoria ulceri obducta excutiamus, q̄ tribus aut quatuor diebus ferè excidere consueuerunt. Vbi uerò exciderint, adipe anserino, ac butyro cum cerato curant. Porro ipse in ozænis polypisq; p̄stantissimū pharmacū reperi succū ex malis punicis, tū dulcibus, tū austeris, acidisq; & maturis & integris, pariq; magnitudine & numero maceratis, expressum. Cæterū si humectior esse polypus uideatur, plus ex austeris malis est cōtundendū. At ex aridis pharmacis, diphryge citra mordacitatē aliquando per multum tempus consumptura polypum noui. Probatur etiam prædictum ex malorum succis collyrium, si ubi exaruerit, redigatur in pollinem, indeq; exuffletur, aut etiam per specilli nucleū indatur. Omnia autem hæc assiduè facere oportet, ut nunq̄ ab affecta parte absit pharmacum, quum facilè ab humiditate eluatur. Iam uerò rosæ siccæ contusæ, inditæq; in ijs qui molli carne sunt præditi, citra noxam curare aliquando solent polypos. Nam pleraq; eorum quæ polypodas exterunt, eos exacerbant, si quando ab scopo



aberrarint. Cæterum ulcera in narium meatibus semper per pastillos curauī, Andronium uidelicet, & Passionis, & Polyidæ, & Bithynum, & per eum quem ipse composui. In diuite uerò quopiam, qui odoratum pharmacum exigebat, hedychroi usum excogitauī, ipsumq; Phalerno ueteri dilui, et mirum quàm breui affectio ipsa est curata.

Narū ulcera  
qbus medica-  
mentis curet.

Heraclidæ ad sanguinis è naribus eruptiones remedia.

**V**bi grumos sanguinis eduxeris, lanā specillo obuoluito, eamq; in lycio aqua diluto ibuito, & sanguine manantē locū illinito. Aut linamentum ex elychnio contortum, madidatumq; aqua, & chalcitidis poliline inspersum inserito. Aut mentham tritam indito. Iuuat etiam frontem spongijs refrigerare, extremaq; uinculo excipere, qua parte magis contracta uidentur obturareq; aures, & os pluuiā aqua & frigida opplere. Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem è naribus. Spongiam cruda pice imbutam, & linamento exceptam indito. Aliud. Putaminis oui, & galle omphacitidis, utriusq; partem unam. Trita linamento intorto, aqua aut aceto madefacto, excipito, inditoq;. Andromachi ischoemos. Chalcitidis, drach. C. chalcanti, drach. L. Misyos assati, drach. xxv. æris vsti drach. xij. & S. tritis utere.

Sanguinis ena-  
ribus eruptio-  
num remedia

## G A L E N I P E R G A

### M E N I D E C O M P O S I T I O N E

#### M E D I C A M E N T O R U M S E C U N -

dum Loca, Liber Quartus.



**D**E Oculorum affectibus, ocularijsq; medicamentis, agere in præsentī cōmentario est consilium. Pompholyx igitur lota nulli pharmacorum mordacitatis exper

Zzzz ij



Pompholyx  
optimū est me-  
dicamē oculo-  
rū fluxionibus

Oculorū fluxio-  
nibus cur non  
sint admeuen-  
da obstruen-  
tia pharmaca,  
ante capitis va-  
cuationem.  
Albumen oui.

Foenigræci de  
cocti facultas.

Extergētia me-  
dicamēta quæ  
sint.  
Putrefacientia  
medicamenta  
quæ sint.

tiū inferior est: atq; ob id ea utimur ad tenues & acres oculorum fluxiones, sed uacuato prius capite et uniuerso corpore. At uacuamus quidē corpus, uenæ sectione, purgatione q; caput autē, per apophlegmatismos uindicamus à pituita. Potest tamen pompholyx lota, quemadmodum etiam spodiū, atq; amyllum, simul & moderatē resiccare humores: simul q; ne per tuniculas euacuetur ea quæ in magnis oculorū uenis, superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius q̄ caput ab humoribus ad oculos defluētibus purget, utatur obturantibus pharmacis, uehementes dolores ob tunicas distentas inducet, et ob multitudinem influentium humorum, aliquando ipsarum rupturam aut erosionē pariet. Eiusdem generis cum prædictis pharmacis subtenuis ouorum liquor existit, abundē ualens humiditates oculorū abluere, & exasperata lenire: ob-  
turandi autem tenues meatus non parem illis facultatem sortitur, sicuti nec similem uim resiccandi. At fœnigræci succus, quod ad uiscositatem attinet, similis est ouorum albugini: discussoriam tamen possidet facultatem, & moderatē calfactoriā: ob id q; multos dolores mitigare cōsueuit. Maximē p̄dictis cōtrarij sm genus existunt liquores acres, ut Cyrenaicus, Medicus, acetum sagapenum, tum euphorbium, omnes q; breuiter, qui citra exasperationem calfaciunt uehementer. Forti autem facultate sunt prædita extergentia medicamēta, cuiusmodi est æris squama, chalcitis usta, es ustum, flos æris, misy, sorī, atq; stibium. His adhuc aliud genus adiacet, erodentium uidelicet, siue putrefacientium: quale est auripigmentū, & sandaracha, & Asiæ petræ flos: cuius facultatis misy etiam paululum particeps est. Est & aliud genus pharmacorum, quod in oculares compositiones inijcitur, eorum uidelicet quæ natura astringunt. Quæ igitur mediocriter hanc uim habent, influxus repellunt: quæ uerò uehementer, am



pliozem dolorem infligunt, tunicas exasperando, q̄ iu-  
uent influxionum impetū repellendo. Porro quæ me-  
diocriter astringunt, lippitudinibus cōmodissima exi-  
stunt: conferunt autem & reliquis ferē omnibus affe-  
ctionibus ulcerum, pustularum, atq; fluxionum. Sunt  
uerō huiusmodi. Folia rosarum, & flores, & succus.  
Ericę fructus, spica nardi, malabathri folium, crocus,  
lycium, & hypocisthis. Vehementiorem his astringē-  
di uim acacia & omphacium habēt, quæ & ipsa in suc-  
corum genere numerantur. Balauſtium etiam, & cyti-  
ni, & gallæ omphacitides, ex genere eorum sunt quæ  
multum astringunt. Inflammationes et alias affectio-  
nes concoquunt, myrrha, crocus, castoriū, thus, & cre-  
mor foenigræci decocti: quæ etiam discussoria faculta-  
te sunt prædita, & p̄sertim ex ipsis myrrha. Hæc itaq;  
sylvia ocularium medicamentorum existit. Porro quæ  
medicamenta substantia terrestri sunt, citra manifestū  
calorem aut frigus, ea emplastica nominantur, uim ha-  
bentia contrariam ipsi, quæ ab obstructione liberant,  
quali facultate insigniuntur Samius aster, pompholyx  
lota, eiusq; cinis elotus, atq; etiam cadmia tum uſta, tū  
lota, cui deterforij etiam nonnihil inest. Pompholygi  
uerō & spodio parum quid inest astringens, quemad-  
modum etiam plumbo post exustionem. Nam & hoc  
pharmacum omnis mordacitatis est expers, parum ta-  
men quid aſtrictionis sortitur. Amylum etiam exactē  
lotum, q̄ mitissimum est, & medium, ut nec aſtrictio-  
nem nec acredinem habeat, hoc est nec calorē, nec fri-  
gus. Quin & cerussa lota proximē accedit ad facultatē  
plumbi uſti, atq; eloti: manifestē tamen astringit: amy-  
lum autem & samius aster, quatenus ex gustu & odo-  
re licet colligere, sunt penitus qualitatis expertes. Igi-  
tur uniuersum huiusmodi pharmacorū genus, siue mo-  
dicam in gustu aut odore qualitatem exhibeat, siue pe-  
nitus nullam ostendat, ueluti aquæ purissimæ, expers

Lippitudini cō-  
uenire, q̄ aſtrin-  
gunt mediocri-  
ter.

Astringentia  
vehementer q̄  
sint.

Ocularia me-  
dicamenta.

Emplastica me-  
dicamēta, quæ  
& sint, & di-  
cantur.

Amylum

Aq̄ purissimæ  
sunt qualitatis  
expertes.

Zzzz ij



Corneę tunicę  
erosę, quę me-  
dicamenta cõ-  
gruant.

Arterię secus  
aures, & tẽpo-  
rum quãdo in-  
cidendę sint.

Collyria Libi-  
ana & cygni.

Collyria læui-  
gandi modus.

Lactis mulie-  
bris vsus com-  
modissimus vl-  
ceribus corneę  
exiit.

Fœnigræci de-  
coctum,

qualitatis uocatur, moderateq; per solam terrestrẽ sub-  
stantiam secundum propriam naturam siccatur. Ac sa-  
nè sola hæc medicamenta conueniunt in erosionibus  
corneę tunicę, ipsiusq; rhagoidis prolapsibus, ob in-  
fluxum tenuium atq; mordacium humorum ortis: quũ  
nimirum astringentia cohibeant effluentes humores,  
atq; ob id dolorem ex mordacitate ipsorum ortum in-  
tendant: acria uerò, affectionem simul adaugeant. In  
uniuersum tamen ipsi particulę affectę, quo facilius  
curationem recipiat, prospicimus, tum uniuerſi corpo-  
ris purgationibus: tum reuulsionibus: primum quidẽ  
ad infernam corporis partem: dein etiam ad occiput,  
& ad capitis cutem. Vtimur etiã sectionibus arteria-  
rum, interdum quidem incidẽtes eas quę retro caput,  
iuxta aures sunt exporrectę: interdum autem earũ par-  
tem, quę temporibus inest: idq; ut medeamur disposi-  
tioni, quę tunicis oculorum est genita, ob quam etiam  
optimus sanguis ad tunicas ipsas delatus corrumpit̃.  
Ad has igitur solas dispositiones conuenire uidetur p̃-  
dictorum medicamentorum genus, citra mordacita-  
tem exiccans in affecta parte cacochymiam, à qua id  
quod influit corrumpitur. Vocantur autẽ collyria quę  
ex eiusmodi medicamentis cõstant, tum Libiana, tum  
Cygni: nempe ob candorem, qualem cygni possidẽt.  
Præualeat quippe in ipsis amyliũ, & terra Samia, & ce-  
russa Rhodia, quę præstantior est, & candidior. Sunt  
qui collyria id genus in cotibus terant, lacte boni suc-  
ci ex nutricis uberibus instillato: ut astrictoriam, uim  
quę ouillo inest, effugiãt. Etenim quum in lacte sero-  
sa quædam, exterſoriaq; facultas insit, eius usus con-  
gruens est ad propositam curationem: quippe ulcera  
explenda, extergentibus citra acrimoniã habent opus  
medicamētis. Quòd si huiusmodi haberi lac nequeat,  
per fœnigræci decoctum terere collyria preſtiterit, ut  
pote quod exterſoriam quandam uim habet, qua oua



omnino sunt destituta.

De aspritudinibus palpebrarum.

**Q**Uum agrè curabiles prædictæ dispositiones existant, adhuc earum difficultatem adaugent palpebrarum asperitates: à quibus etiam in lippitudinibus, tunicæ oculorum commorsæ, affliguntur dolore. In illis tamen audemus ad pharmaca inflammationi congruentia, non nihil ex detergentibus immiscere, ueluti est collyrium ex uino, aspritudinibus accommodatum: quo primum ea quæ ad palpebras succereuere, deprimantur. Nam ubi oculi minus infestantur inflammatione, ea quæ aspredines expurgare possunt, administramus. At dum cornea exulcerata est cum mordaci influxione, impossibile est tali aliquo uti pharmaco. Cornea siquidem ipsa amplius exasperabitur: uelut uero impèsius prociadet, hominemque uehemens dolor corripiet, augebiturque ipsius fluxionis malignitas. In huiusmodi itaque affectionum miscella, solent Medici, præinopia consilij, palpebras ipsas reuertere, atque absque medicamentis purgare, idque tum specilli concauo, tum molli spongia. Quidam ex præceptoribus meis, ex pumice laeuigato, cum tragacantha aut gummi, collyriū faciebat, eoque ab extentis atque reuersis palpebris, aspritudines deradebat. Vbi uero temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus tunc iam ea quæ palpebras extergunt, paulatim adhibere medicamenta: quæadmodum ubi fluxus omnino fuerit iam resiccatus, & palpebræ moderatè habuerint, caua ulcera sunt collyrio ex thure complenda.

De lippitudine, siue ophthalmia.

**O**phthalmia est inflammatio periostij membranæ, quam etiam agnatam uocant, quæ alijs, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis, forinsecus agnascatur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscripta ossa. Ob id enim omnia quæ circum oculos sita sunt, usque ad ma-

Collyrium ex uino.

Aspritudinis palpebrarum curatio.

Lippitudo. Ophthalmia est inflammatio periostij tunicæ, quæ barbari ceniū ciliuā appellāt.

Zzzz iij



las quandoq; simul per uementem lippitudinem in-  
tumescent. Igitur pharmaca omnia huiusmodi affe-  
ctionem curantia, ex genere eorum sunt, quæ medentur  
inflammationibus: assument tamen necessariò nonni-  
hil, pro ipsius partis natura, quæ excellentem molliciẽ,  
atq; eximiam quandam supra omnem totius corporis  
cutem, ad patiendum facilitatem est nacta, ob sensus  
subtilitatem, ac raritatem substantiæ. Adhibenda

Ophthalmiæ  
eò gruentia me-  
dicamēta qua-  
tia esse debeāt

itaq; sunt pharmaca repellentia, minimè tamẽ exaspe-  
rantia, hoc est, non uementem astringentem sortita:  
sed quæ tum propria sua substantia moderatiora sint,  
tum lenitiui liquoris admistione adhuc magis talia red-  
dantur. Voco autem lenitiuos liquores oui candidum,  
& fœnigræci decoctum, magisq; adhuc ipsum lac. Ut  
plurimum uerò albumen oui cum accommodatis phar-  
macis lippitudines curare sufficit, per collyria uideli-  
cet uocata monohemera, hoc est diaria. Sæpe siqui-  
dem magnas inflammationes, hæc adeò mitigauerunt,  
ut in uesperam quidẽ homo balneo uteretur: in sequen-  
ti uerò die, nardino collyrio ad instaurationem & cor-  
roborationem inungeretur. Admiscere autem ei cir-  
ca primam inunctionem minimum quiddam acrium  
& sistentium medicamentorum oportet: ut circa secun-  
dam paulo amplius quiddam priore. Sufficiunt namq;  
hæ duæ pharmaci adhibitiones, & deambulatione  
aliqua non multa ante balneum. Foveri tamen oculi  
per spongiam debent ex meliloti & fœnigræci deco-  
cto, semel quidẽ, aut bis in die, si mediocris sit dolor:  
sæpius autem, si uehementior.

Oculorum vi-  
cēra, quia me-  
dicamenta po-  
stulent.

#### De ulceribus oculorum.

**O**culorum ulcera eandem secundum genus cura-  
tionem requirunt, quam reliqua omnia: ob ipsius  
tamen partis naturam, quæ lenissima eis adhibenda sunt,  
quale est, quod ex lota pompholyge constat. Admiscē-  
tur ipsis etiam succi quidam non solum mordacitatis



expertes, sed qui etiam uehementissimos mitigare dolores possint, ueluti mandragorę succus. Quidā etiam polygoni succum miscuerunt, ut aliij, ipsoꝝ ouorum candidum. Quæ omnia dum tempus utēdi instat, miscenda sunt: propterea q̃ faciliē acescunt: quo tempore etiam rosarum additur succus. Eorum autem omnium esse debet scopus, ut ulcus mundum seruetur: utpote partium natura ipsum replente, atq; ad cicatricem ducente. Si itaq; inflammatio adhuc oculum urgeat, aut quispiam etiā dolor, collyria ex thure, & metallicis lotis, & succis mordacitatis expertibus, adhibenda sunt. Vbi uerò sordida reddita ob eorum usum ulcera fuerint, ex repurgantibus quippiam miscēdum est: quale existit Paccianum croceum, ex uino: quod etiam aspritudines exterit, pterygiaq; attenuat. At uerò ulcera quæ per erosionem tunice corneæ fiunt, ita ut aliquid ex ipsa rhagoide procidat, repellentibus & astringentibus pharmacis opus habent. Discussoria autem postulant tum pustule, tum pus intra rhagoidem contentum. Recētia igitur, & adhuc inflammata, pharmacis ex myrrha, thure, & croco sedantur: uetustiora autem, nonnihil ex discussorijs desyderant, quemadmodum etiam induratae tunicarum inflammationes.

De ocularium pharmacorum uiribus.

**I**gitur omnimodæ acrimoniæ sunt exptes hi tres liquores, scēnigræci decoctum, lac, & candidum oui: ex quorum genere existimare oportet tum gummi, tum tragacantham. Quippe nisi prædicta illa tria, tum copia, tum usu, prompta & expedita essent, possemus utiq; parum gummi, aut tragacanthæ in multa aqua maceratum, in eundem usum ueluti illa assumere: & per ipsa etiam in medica cote collyria terere: & per sola infusa, serofos in affectis oculis generatos humores eluere. Oculariū itaq; pharmacorum unum genus in illis tribus liquoribus, atq; etiam in

Paccianū collyrium.

Oculariū medicaminū uires. Gummi. Tragacantha.

Oculariū medicamentorum genera uaria.



tragacantha, gummi, metallicisq; elotis consistat. Al-  
 terum uerò genus eorum sit, quæ modicam morda-  
 citatem fortiuntur, propterea q̃ quædā eis sunt ad-  
 mista, quæ parū astringunt, deterguntq;: qualia sunt,  
 rosæ, & thus: illæ quidem, pauculam astrictionem;  
 thus uerò modicam extergendi uim, possidētes. Ha-  
 bet tamen ob moderatum calorem thus etiā & con-  
 coctorium quid, ac doloris mitigatorium. Ex eodem  
 genere cum ipso, quantum ad concoctionem & di-  
 scussionem attinet, censendus est crocus & myrrha:  
 quæ inter se in eo differunt, q̃ crocus quidem, mo-  
 deratè astringat: myrrha uerò, citra astrictionē, non  
 instrenuè discutiatur, & resiccat humiditates. Sūtq; hæc  
 uiribus præstantiora thure, & ob id etiam maiorem  
 discutiendi uim habent: quum autem careant ui de-  
 tergendi, ad ulcerum curationem thure inferiora exi-  
 stunt. Huius generis medicamentorum, concoctorij  
 inq; & discussorij, lyciū quoq; est, & castorium. Sar-  
 cocolla ēt concoctoriū & discussoriū medicamētum  
 existit, ac magis q̃ ipsa, chalbanū. Meliloti uerò deco-  
 ctum ad cōcoctoriam facultatem assumpsit ēt quid  
 astringitorium, eiusdem ferè generis cum croco exi-  
 stens. Inijcitur etiam in oculares compositiones la-  
 pis hamatites uocatus, humores resiccandi uim ha-  
 bens, ueluti & cadmia. Mitius tamen pharmacum la-  
 pis ipse q̃ cadmia existit, utpote ex humida substan-  
 tia, non terrestri, ueluti cadmia, generationem inde-  
 ptus. Hui similis est lapis Schistus dictus, sed fortio-  
 rem obtinet facultatem. Quod uerò stibium uoca-  
 tur, illotum quidem, fortem astringendi facultatem  
 ostendit: lotum autem, exoluit: ut propè ad uim mor-  
 dacitatis expertum accedat. At æs ustum uehemen-  
 tem extergendi possidet facultatem, itemq; squama  
 eius, & flos. Nec minus efficax, sed minus mordaci-  
 tatis expers chalcitis usta est. Quòd si lauentur talia

Thus dolorem  
 lenit, conco-  
 quitq;.

Crocus mode-  
 rate astringit.  
 Myrrha citra  
 astrictionem, di-  
 scutit, resic-  
 catq;.

Lycium.  
 Castorium.  
 Sarcocolla.  
 Chalbanum.  
 Meliloti deco-  
 ctum.

Lapis hamati-  
 tes.

Cadmia.

Schistus lapis.  
 Stibium.

Æs ustum.  
 Aeris squama,  
 flosq;.

Chalcitis usta.



pharmaca, exterforia quidem adhuc manent: tanto tamen imbecilliora, quantum amiserunt mordacitatis. Huius generis sunt etiam misy, & ærugo, fortissima pharmaca, ijs quæ sycosi & callis conueniunt, admista. Sunt qui etiam gallas admisceant, uehementer astringens pharmacum: sunt qui etiam chalcanthum, quod unâ cum acredine uehemētissimè astringit. Moderatius tamen redditur ustum, & lotum. Ad hanc syluam pertinet & stomomatis squama. At thuris cortex, astringit quidem & ipse admodum: prædictis tamen est longè inferior. Porro manna thuris à thure ipso differt, q̃ exiguum quid astrictiōis fortatur, ratione corticis thuris, cuius nonnihil contraxit. Quæcunq; igitur ex astringentibus multam terream compagem habent, aspritudines, & sycoses, & callos consumunt. Cæterum quæ ex succorum genere sunt, ueluti omphacium, & hypocisthis, eluuntur faciliè in subliationib; diffuētia simul cum lachrymis. Ex hoc genere est glauciū, & acacia. Citra mordacitatem uerò: exterget cerui cornu ustum, ueluti etiam caprinum: non tamen dolorē sedant, nec concoctoria facultate sunt prædita, ut thus, frigidi nimirum & sicci tēperamenti existētia. Mixtæ facultatis est aloe, quēadmodū rosa. Habet enim qđ exterege-  
re est natū, aliquid in se amarū: sicuti et astrictorium quippiam, ut & cōmittat, & ad cicatricem perducatur.

Quæ ad scabras affectiones conueniant.

**E**X Iis quæ ad scabras palpebrarum affectiones cōueniunt, sunt sales ammoniaci, & lapis Asius, tum ipse, tū eius flos: & quod psoricum appellatur, non simplex, neq; sponte natum, sed præparationis modum indeptum. Admiscetur ijs & misy ustum, & sandaracha, & arsenicum. Ex medicamentis uerò aromaticis, casia, malabathri folium, & amomum, cinnamomumq;.

Lota euadere imbecilliora.

Misy.  
Aerugo.

Gallæ.  
Chalcanthum.

Stomomatis  
squama.

Thuris cortex  
& manna.

Omphacium  
Hypocisthis.  
Glaucium.  
Acacia.  
Cerui cornu  
ustum.

Aloes facultates.

Scabris palpebris quę operantur ferant medicamenta.



Quæ induratis auxilientur.

Induratis tuni-  
cis oculorum  
quæ conferās.

**C**ompositiões quæ ad induratas oculorum tu-  
nicas congruunt, ex succis constant, & amnio-  
niaco thymiamate. Miscent autem eis myrrha, thus,  
chalbanum, & consimilia.

Quæ suffulis medeantur.

Suffusorum re-  
media.

**A**d Suffusos habetur compositum medicamen-  
ex succo fceniculi, hyænæ felle, ac melle Attico  
constans: cui uonnulli caprillū fel addiderunt. Nunc  
autem in pretio habetur pharmacum ex felle scaro-  
rum compositū: sicuti & quod ex myrrha stacte con-  
ficitur: quorum omnium promissa magna: effectus  
autem interdum nullus.

Pharmacum aridum ad tuendam oculorum  
ualetudinem à me compositum.

Oculos robo-  
rans pharma-  
cum.

**L**apidis phrygij, ter usti, totiesq; extincti, sed pri-  
ma quidem extinctione, butyro: secunda, uino  
odorato: tertia attico melle, ad ipsum extinguendum,  
iniecto lib. j. æris usti, piperis albi, folij malabathri,  
sing. vnc. j. Stibij, drach. xij. Postquam uerò omnia  
fuerint læuigata, & reponere medicamentum uelis,  
adijce opobalsami Syriaci vnc. j. S. Porro usus ip-  
sius ad solas palpebras competit cum specillo indu-  
cti, citra tunicarum ipsius oculi contactum.

Aridum ad circunrosos oculorum angulos ab Ascle-  
piade scriptum. Spodij Cyprij, drach. iij. ompha-  
cij aridi, drach. ij. nardi obolos. iij. piperis fricti, gra-

Ocularia, medi-  
camenta uaria,  
a medicis ua-  
riis conscripta.

na. xv. tritis utere. Pharmacum calliblepharon,  
exornandis palpebris accommodatum. Facit & ad  
lippitudines inueteratas. Stibij usti ac uino ex-  
tincti, drach. xvj. plumbi usti & loti, drach. viij. fuligi-  
nis thuris, spicæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, squa-  
mæ grise, sing. drach. j. omnibus tritis ac repositis uti-  
tor. Aridum Philoxeni ad pruriginosos & cir-  
cunrosas angulos. Facit & ad obtusum uisum.



Cadmice, drach. iij. salis ammoniaci, drach. ij. piperis albi drach. j. tritis & læuigatis utitor.

Liquida oculares compositiones ad omnem extuberantiam carnis tollendam: & ad incipientem lippitudinem.

**C**ompositio qua usus Philippus est in Cæsaria. Misys affati, drach. viij. myrrhæ drach. iij. cadmiæ, drach. viij. croci drach. ij. salis ammoniaci tantūdem, nardi indicæ, piperis albi, utriusq; drach. j. mellis Attici cyathum unum: misceto. Panchrestos Erasistrati ad lippitudines omnes, & ad purulentas aures. Aeris usti, myrrhæ, singul. drach. j. piperis obolos. ij. misys tosti drach. j. croci obolos. ij. uini Chij heminam. j. passi cretici hemine dimidium. Coquantur ad lentum ignem ut decet. Philoxeni liquida exacuens uisum, ac cicatrices & callos extens. Ammoniaci thymiamatis drach. iij. æruginis drach. ij. uino diluta, & contrita, melle Attico excipito. Compositio largi exacuens uisum. Succi radice fœniculi partem unam: mellis tantundem: misceto. Alia. Succus radix fœniculi, succi chelidoniæ, mellis Attici, sing. drach. j. misceto. Ad tingendas albugines. Gallam tritam per specilli nucleum calfactum imponito: dein chalcanthū aqua dilutum admoueto. Ad glaucos oculos, quo pupillæ nigræ reddantur. Malicorij dulcis succum infundito: dein post temporis interuallum hyoscyami florem cum uino tritum instillato. Ad paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus. Chalbani partem unam cum modico nitro mixtam imponito. Cataplasma Heraclidis Tarrentini ad uehementes oculorum dolores. Rosarum uiridium, aut siccarum, drach. iij. croci drach. j. opii tantundem, excipito meliloti decocto, aut passo, utitorq; Aliud. Rosarum, uiolearum albarum,

Oculorum uehementes dolores soluentia cataplasmata.



Oculorum flu-  
xionibus repel-  
lendis aggluti-  
natorium phar-  
macum.

meliloti, caput papaueris, sing. drach. ij. croci, opij, myrrhæ, sing. drach. j. oui assati uitellū. Tritis & passo subactis utitor.

Agglutinatorium ad repellendas fluxiones ab oculis. Pollinis, myrrhæ, man-  
næ thuris sing. drach. j. candido oui excipito, tempo-  
ribusq; & fronti admoueto.

Collyriū Moschio-  
nis, ad epiphoram, dolores, atq; fluxiones congruēs.  
Glaucij, drach. vj. Sarcocollæ drach. viij. croci drach.  
iiij. gummi drach. ij. tragacanthæ, succi mandragoræ,  
sing. drach. ij. opij drach. j. Aqua pluuiali excipito, uti-  
torq; . Paccij sphragis. Cadmiæ ustæ, & lacte ca-  
prillo, siue muliebri, extinctæ ac lotæ, asficcataq; in  
umbra, drach. x. æris usti ac loti, acaciæ, utriusq; dra-  
chmæ. x. opij drach. vj. croci tantundem gūmi drach.  
xv. aqua pluuiali excipiantur.

Collyrium ad  
acerbissimos oculorum dolores. Cadmiæ ustæ & lo-  
tæ, acaciæ, stibij usti, & loti, aloes Indicæ, sing. drach.  
viij. croci, myrrhæ, opij, sing. drach. iiij. gummi drach.  
viij. aqua excipe, utereq; ex ouo Ego etiam pōpho-  
lygis & thuris, utriusq; drach. iiij. adieci.

Malabathrinū  
medicamentum  
vehementibus  
oculorum do-  
loribus.

Mala-  
bathrinum nostrum ad uexationes dolorum. Cad-  
miæ drach. xvj. acaciæ, drach. xl. æris usti & loti, drach.  
xiiij. opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indicæ, casto-  
rij, croci, aloes, sing. drach. ij. myrrhæ drach. iiij. ceru-  
sæ drach. viij. stibij loti tantundem. gummi drach. xl.  
aqua excipito & utitor ex ouo in principio affectio-  
num, & etiam in declinatione, \* ubi panchrestum  
ab ipsa parte remoueris.

Collyrium try-  
phera nomina-  
tum.

Collyrium album try-  
phera dictum, admodum lene, ad epiphoras maxi-  
mè congruens. Cadmiæ lotæ drach. xvj. ceru-  
sæ drach. viij. amyli, gummi, tragacanthæ, singul.  
drach. iiij. opij drach. ij. aqua excipito, & cum ouo uti-  
tor. Cygnus inscriptus Reginæ, ad maximos ocu-  
lorum dolores. Cadmiæ drach. xvj. cerusæ lotæ  
drach. viij. amyli, tragacanthæ, acaciæ, opij, singul.



drach.ij. gummi drach.xij. excipe aqua pluuiali, & dum uti uoles, adijce cādida ouorum quatuor, recen-  
tium.

Aerianum pharmacum ad ueteres ac re-  
centes affectiones accommodatum. Cerusæ drach.  
xxiij. Cadmiæ ustæ, & lotæ, stibij usti & loti, thuris,  
singul. drach.x. squamæ æris drach.v. opij drach.ij.  
myrrhæ tantundem. gummi drach. xij. aqua pluuiali  
exceptis, utere ex ouo.

Collyrium ex cornu cer-  
uino, ad ulcera, & pustulas, quod cicatrices exterit.

Cornu ceruini usti, & loti, thuris, plumbi usti, sing.  
drach. iij. squamæ æris lotæ, drach. ij. opij, drach. j.  
gummi drach. iij. excipe ex aqua pluuiā.

Colly-  
riū diarhodon, ad fluxiones atq; dolores oculorum  
congruens. Rosarum drach. C. croci drach. j. opij,  
myrrhæ, sing. drach. viij. gummi drach. L. uino odo-  
rato excipito, utitorq; ex ouo. Ego uerò pro folijs ro-  
sarum, tantundem earundē florum inieci, feliciterq;  
succesit.

Lynceus, ad affectiones callosas, exa-  
cuens uisum. Cadmiæ, æris usti & loti, ammoni-  
aci thymiamatis, sing. drach. xij. myrrhæ drach. xvj. la-  
pidis hæmatitæ, drach. vj. opij tantundem. aloes, fel-  
lis taurini, chalbani, sing. drach. iij. æruginis drach. j.  
opopanacis drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. gum-  
mi, drach. vj. Aqua omnia pluuiali excipito.

Melinum Lucij præceptoris, ad scabros & corrosos  
angulos, intēsos pruritus, oculos humectos, omnēq;  
hebetudinem uisus, cicatrices etiā & callos exterens.

Cerusæ, croci, singul. drach. xxiiij. ammoniaci thy-  
miamatis, salis ammoniaci, nardi Indicæ, opij, myr-  
rhæ, omphacij. sing. drach. vj. gummi, drach. xxiiij. Ex-  
cipiantur aquæ pluuiali.

Quæ Archigenes ad oculos affectos scripserit.

**I**N Fluxionibus oculorum primo conuenit cibi  
atq; potionis paritas, aque potus, ac maximè rei  
uenere, abstinētia. Subducatur aluus & facies asil-

Aerianū phar-  
macū affectio-  
nibus oculorū  
accomodatū,

Oculorū affe-  
ctibus remedia  
ab Archigene  
scripta.



duè primm multa frigida, dein oxycrato abluatur. Fugiant odores acres, & pulueres, fumumq; & tum Solis, tū lucernarum splendorem Si augeſcat fluxio, dolorq; accedat, conſert etiam phlebotomia. Circa frontem porrò & tempora conueniunt medicamenta astringentia. At ſuper oculos lana pura oui candido madefacta imponatur: aut oui aſſi luteū: aut melilotum in paſſo coctum. Omnia enim ex astringentium genere in principijs conferunt. Ad plagas

Oculorum plagis quæ opitulentur.

illatas oculis facit columbinus ſanguis inſtillatus, & præſertim is qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculū inſtillatum, ac præterea lana exceptum, & ſupernè impoſitum. Prodeſt etiam melilotum coctum cum uino, impoſitumq;. Ad tumores ex plaga in oculis ortos ualde conuenit fomentum per mollem ſpongiam aceto diluto madentem. Ad palpebrarum deſluuia, æruginis tritæ partem unā, ammoniaci thym amatis tantundē, trita imposito. Ad inutiles atq; pungentes palpebrarum pilos. Vbi auulſi fuerint, illinito ſanguinem cimicum, & non renaſcentur: aut chamæleonem albā & tritam, cui uiridiū ranarum ſanguis ſit miſtus, inungito. Offuſcationem omnem, incipientemq; ſuffuſionem ſanat fel omne, cū mar-

rubij ſucco ac melle Attico. Ad

pterygia, chalcanthi, et ſalis ammoniaci æquales partes:

gummi dimidiū, cum

aceto in collyria

formato, illi-

nitoq;.

Galenī



# GALENI PERGA MENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVN-

dum Loca Liber Quintus.

De suggillatione, quā Græci hypopion nominant.



**Y**POPION ex genere effusionū Hypepion,  
Suggillatio  
quid sit.  
existit, estq; affectio cutis ipsi oculo  
subdita, ubi contusis uenis quæ in ea  
sunt, sanguis per fissuras effundit: qui  
quidem nisi discutiaturo cito, interdum  
progressu temporis liuescit & denigra-

tur. Quare merito ad eius curationem statim festinant  
Medici. Cæterum quum tunica uenarum, ex quibus Suggillationis  
curatio.  
sanguis exilit, rumpatur, parum quiddam ex astringenti-  
bus ad discutientia admiscant, Vbi uerò ad propriam  
naturam redierint uenulæ, tunc discussorijs solis uti ad-  
modum opportunum uidetur: ex quibus tamen imbe-  
cilliora quidem, in primis sunt adhibenda: fortiora ue-  
rò, inueteratis & denigratis conueniunt. Ego igitur Nili  
collyrio diarhodon, in oculariorum coticula ex aqua tri-  
to, partem suggillatam illino, sertulæ campanæ ac fœni  
græci decocto prius pro fomento usus: quo ipso deco-  
cto, postea etiam collyriū dissoluo: ac dein etiam ex so-  
lius fœnigræci decocto. Quod si quæpiam affectionis  
reliquiæ restitēt, in fœnigræci decocto collyria ex myr-  
ra dissoluo, illinoq; Vbi uerò affectus his remedijs nō  
cedit, collyrium ex sandice est cōmodum.

Archigenis pharmaca ad suggillata.

**S**ummè facit ad recentia & liuida suggillata, spon- Suggillatis  
pharmaca ab  
Archigene pro-  
dita.  
gia muria intincta, & assidue impolita, sublataq;  
postquam, fomentum ex aqua calida prodest. Cata-  
plasmate autē utere faba fresa contrita, absynthio, hyssopo,  
origano, raphani cortice, uua passa exacinata, uno-  
quoq; per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Minimè ta-

Tomus IIII.

AAa2



men rectè mihi uidetur præcipere, ut indifferenter uno aut alio utamur. Aqua quippe acrimonia omnis exper-  
tissima est. Mel autem ulceribus mordax, cutem haud-  
quaquã offendit: acetum uerò utrisq; mordax existit.

Lomentum fa-  
baceum.

Aliud. Aut fabam fresam cōmansam, cum melle im-  
ponito. Etenim fabæ lomentum, etiam citra manduca-  
tionem cum melle subactum, liuida discutit. Ex mandu-  
catione autem, summè discussorium efficitur, nimirum  
uiribus à salua assumptis.

Aut cerussæ & lithargy-  
ri partes æquas cum melle terito, atq; admista faba fre-  
sa, ad cerati formam reducito, utitorq;.

Aut hordea-  
ceam farinam cum aceto mulso coctam imponito.

Aut thus & thapsiam æquis portionibus cum rosaceo  
cerato.

Hæc Archigenes. Dictum autem à nobis  
est, qd ex discussorijs medicamentis in principio præstā-  
tiora sunt, quæ modicā astringendi uim possident: qua-  
lia sunt rosæ, melilotum, & crocus. Apollonius autem  
ad inueterata suggillata, ari radicem rasam, melleq; sub-  
actam, impositamq; cōmendat. At Crito bryoniæ ra-  
dicem tritam cum melle, aut rosaceo cerato exceptam,  
inter remedia suggillatorum recenset.

Sugillatis me-  
dicamē ab He-  
ra scriptum.

Medicamē  
Heræ conscriptum ad suggillata. Succi cicutæ, obolos  
ij. croci drach. ij. myrrhæ, acaciæ, sing. drach. j. opij. dra-  
ch. ij. succi thapsig, gummi tragacanthæ, sing. drach. j. cū  
aqua cogito. Tribus enim horis (ut inquit Heras) sug-  
gillata dispungit. Ego uerò nucem per ætatem iam  
oleaginosam effectam expertus sum aliquando ad cru-  
entatos facientem.

#### De Aegilope.

Aegilopis de-  
scriptio & cu-  
ratio.

**I**Nter nasi os & magnum oculi angulum, paruum  
quoddam exiguo abscessui p̄simile tuberculum na-  
scitur: quod sanè sepe in ipsum angulū rumpitur, egreq;  
curationē admittit, nisi maturè illi occurratur. Igitur me-  
deri ipsi oportet medicamentis quæ absq; mordacitate  
discutiant. Quippe coafficitur ab acris oculis, ac sic



Inflammatiō particulæ augetur. Heræ ad ægilopas. Maluæ folia cum sale & melle trita imponito. Alica etiam in aceto cocta, incipienti ægilopi opitulatur. Archigenis remedia ad ægilopas. Aegilopas eruo cum melle integimus, aut cinere uiticis cum aceto subacto. Probè facit & thus cum recenti colūbino stercore, impositum. In nōdum foratis, staphidem syluestrē, & ammoniacum thymiana cum melle, ueluti spleniū, imponito: aut alumen scisile cum terebinthina. Si morbus his remedijs non cedat, diuiso angulo, osseq; nudato, cauterium admoue: sic siquidem decedūt squamulæ, atq; ipsum malum curatur.

De Varis.

**T**umor paruus & durus in faciei cute oboritur, Varus Latinis, Græcis Ionthos dictus, à crasso concretus succo, ostendensq; meritò sui ipsius curationem futuram per emollientia, et discussoria pharmaca.

Vari descriptio & curatio

De ficosis tumoribus.

**V**Na quædam hæc affectio est ex ijs quæ in mento enascuntur, differens à varis in eo qd non solum crassus sit qui hos tumores excitat humor, sed serosa etiam tenuitate participet, ob quam exulcerantur cito, si non, ut decet, curentur: & ob id magis exiccantibus pharmacis q̃uari opus habent.

Ficosus tumor a uaro quo modo differat, & qualia medica mēta postulet.

De lichenosis in mento tumoribus.

**E**thec affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum tenuibusq; & acribus succis cum crassis mixtis: quapropter facilè etiam in psoam ac lepram transit: indigetq; etiam ipsa pharmacis fortiter exiccantibus. Vbi uerò in psoam aut lepram tranfierit, ultra hoc qd resiccantibus indiget, etiā repurgantia & exterforia desiderat.

Lichenes a q̃b' gignantur humoribus & q̃lia medicamēta desyderent.

De menti eruptionibus.

**H**oc eruptionum, siue exanthematum nomen, quidam in cōmuni usurpant de affectionibus ulce-

A A a ij



Exanthemata  
resiccantib<sup>9</sup> me-  
dicamentis in-  
digent.

rosis & asperis in mento sua sponte oborientibus.  
Indiget uerò & hæc ipsa affectio resiccantibus medi-  
camentis.

De furunculis.

Dothienes.

Furunculorum  
species.

**F**urunculi, Dothienes Græcis uocati, ex similibus  
humoribus, ueluti uari, gignuntur, per uniuersum  
corpus duplices existentes: nonnulli quidem, Varosi,  
duri, & egrè concoctiles; aliqui uerò inflāmati: in qui-  
bus aliquando febres consistunt, & tumor excrescit in  
magnitudinē, & in pus transmutat. Vnde curatio ipso-  
rum ut plurimum eadem quæ inflāmatōnū existit.

Critonis ad Varos remedia.

Varis remedia  
scripta a Cri-  
tone.

**M**ellis Attici, et acerrimi aceti, sing. cyathum unū  
misceto, ipsisq; uaros illinito, cū digito p̄fricādo.  
Vel amaras amygdalas aceto intritas, faciei illine.

Aut alumen scissile probè leuigatum terebinthina ex-  
cipito, imponitoq;.

Ad Varos callosos. Saponis  
Gallici drach. iij. Ammoniāci thymiamatis, drach. j.  
thuris drach. j. aqua dissoluito, & cerati spissitudinem  
facito, eoq; illinito, & post horæ interstitium calida ab-  
luere iubeto.

Elephantiasis  
incipienti me-  
dicamen egre-  
gium.

Ad affectiōes eminētiores, ac prin-  
cipium elephātiāsis. Gummi albi, spumæ nitri, thuris,  
sulfuris uiui, sing. æquales partes aceto dilutas ac pro-  
bè tritas, in pastillos redige, eosq; in umbra exicca: usu  
uerò expetēte, aceto dilutos illine: atq; ubi resiccati fue-  
rint, subscripta compositione deterge. Saponis Galli-  
ci lib. j. ammoniāci thymiamatis, tantundē. thuris, ma-  
stiches, spumæ nitri, sing. vnc. iij. Saponem & ammo-  
niacum in fictile uas coniecta, & aquæ sextarijs duo-  
bus affusis, coquito: atq; ubi dissoluta fuerint, arida cō-  
rusa atq; cribrata adijcito: deinde in mortariū transfu-  
sa, & probè conquassata, in uase uitreo reponito. Vsu  
uerò postulante, faciem ex eo smegmate inquinato, &  
post modicum temporis larga aqua molliter perfrican-  
do abluito. Eiusdem ad ficosas menti papularum



eruptiones. Spumæ argenti, misyos crudi, & aquas par-  
tes tritas insperge. Aliud. Atramenti sutori, sul-

Papulis in mē-  
to erūpētibus  
medicamenta  
congruentia.

furis uiui, singul. drach. ij. æruginis drach. j. nitri rubri  
drach. ij. trita insperge. Andronis pharmacum

ad idem accommodatum. Chalcanthi, myrrhæ, sing.  
drach. ij. thuris, aluminis scissi, sing. drach. iij. malico-  
ri, gallarū, aristoiocliæ, sing. drach. viij. vino austero  
exceptis utitor. Critonis remedia ad lichenas.

Lichenū remē-  
dia scripta a  
Critone.

Tritici grana multa imposito in incudē: deinde lami-  
nam æris candētem tritico superposito: & resolutum  
ab eo liquorem, calidum adhuc, auferto, illinitoq;

Aut portulacæ succum assidue illinito. Quod si intete-  
rati sint lichenes, capparis folia trita cum aceto im-  
posito. Aut corticem radicis hortensis ruuicis, simili-  
ter ex aceto tritam. Pastilli Lichenici. Glutinis

fabrilis, chamæleonis, sing. drach. iij. sulfuris uiui, thu-  
ris, sing. drach. ij. aceri, heminx dimidium. Glutinum  
aceto dissoluitur: dein aridis affunditur. Vsus tēpore,  
quantum satis est, aceto diluo, calidumq; impono.

Humida ad impetiginosos affectus. Misyos peregrini,  
thuris, myrrhæ, aluminis scissi, sing. drach. viij. a-  
loes, sulfuris uiui, utriusq; drach. iij. Passio excipito, ad  
spissitudinem strigmenti, & bis aut ter in die perfri-  
ctis illine. Emplastrum Lichenicum. Cera, pi-

Impetigini cō-  
gruentia reme-  
dia.

cis coctæ, terebinthinæ, sulfuris uiui, sing. libræ dimi-  
dium: liquida cōmittito aridis. Excoriatorium li-

Lichenas ex-  
corians.

chenum. Squamæ æris, drach. vj. auripigmenti, san-  
darachæ, utriusq; drach. iij. cris usti, ueratti albi, sing.  
sesquidrachmam. uentrium cantharidum, tantundem.  
Singula per se terito: dein simul mista, cedria excipito,  
& ad strigmenti spissitudinem reducta, pyxide æris  
cyprij reposito. Cæterum ante q̃ excoriatoria im-  
ponantur, circumstitas & uicinas licheni partes pharma-  
co aliquo inflammationem arcēte in splenio excepto,  
integere ac tueri oportet. Post excoriatoriorū usum

AAaa ij



emplastra uiridia & alba sunt imponenda. Emplastrum uiride Pamphili ad lichenas. Ceræ libram. æruginis rasæ, quadrantem. resinæ phrycæ, lib. ij. olei cyathos. iij. aceti acerrimi quod sit satis. Conficito ut decet. Viride Herophili. Æruginis drach. ij. manna drach. iij. adipis uitulini drach. xij. chalbani drach. iij. cere drach. lxxx. resinæ drach. xx. aceti quod sit satis.

**Lichenas exco-  
riatos sanantia  
medicamenta.**

Emplastrum album, quo Magnus circulator est usus ad excoxiatos lichenas. Lithargyri, ceræ Tyrrenicæ, sing. libram. j. olei sextarium. j. cerussæ lib. j. aque sextarium. j. conficito. Aliud. Lithargyri, cerussæ, plumbaginis lotæ, sing. drach. xxv. cere, terebinthinæ sing. drach. xvj. olei heminam. j. aquæ tantundem. conficito.

Compositio Menecratis squamas decidere faciens, & corpora attenuans. Picis brutiæ pellucidæ, siccæ, & electæ, drach. ij. S. resinæ pinus pellucidæ, lib. j. & quadrantem, ceræ ponticæ tantundem. chalbani quadrantem. aceti heminam unam. Conficito diligenter.

Heraclidæ Tarentini ad capitis & menti sicosos tumores. Elaterij salisq; pares portiones confundito utitorq;.

De dentium affectibus.

**Dentes dolere  
& pulsare.**

**E** Quidem in meipso manifestè aliquando percepî, non dolentem modò, sed etiam pulsanem dentem: quemadmodum carnosæ partes inflammatione uexatæ consueuerunt. Quare mirabar sanè, qd in dente oriiri inflammatio posset. Atqui quum etiam alio tempore dentem dolerem, perspicuè sensi, non ipsius dentis, sed gingiuarum inflammatarum, eum dolorem existere: ita ut etiam citra coarctationem dolerent, ob uicinitatem tamen durorum dentium illis inaueretur dolor. Vtriusq; itaq; doloris sensum expertus, alium quidem in gingiua, alium in ipsius dentis substantia esse, clarè scio. At uerò, & quòd neruus quidem ad radicem dentis substratus aliquando etiam doleat, im-



ponat autem nobis, ut credamus ipsum dentem dolere, consentaneum rationi est. Etenim quod dente exempto remaneat adhuc exigua quædam portio doloris, id ob nervi inflammationem contingit: quum nimirum tunc dolor nervi leuior tantum reddatur, eo quod non amplius ab osse, cui cohærebat, tendatur: & quod iam liberius perspiret, fruaturque medicamentis quæ illi adhibentur. Neque enim per contactum, neque per distributionem possibile fuerit inflammato nervo mederi, utrinque à denti locellis coarctato, & ab anteriori parte ab ipso dente. \* Iam uerò quum liuidi tota substantia sua interdum reddantur nervi, nihil mirum sit, si phlegmone simile quid patiantur. Cui rei hinc maior accedet fides, quod tum nutriantur, tum augeantur per totum ferè ipsius uitæ curriculum: id quod euidenter sapuere in his dentibus liquet, qui sunt exemptis oppositi: utpote qui semper augescunt. Siquidem quantum augentur dentes, tantum in ciborum læuigatione atteruntur. Quum igitur illis absque nutrimento augeri non liceat, utique duabus affectionibus, & his contrariis, obnoxii erunt, inopiæ scilicet & redundantiaæ alimenti, quod ipsis suppeditatur. Inopia ergo, aridiores & tabidiores, atque ob id tenuiores eos efficit: redundantia uerò, cõsimilem in eis excitare affectionem potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone: ac proinde curandum est, ut redundantia euacuetur, partim discutiendo, partim eam repellendo. At tenuitatis dentium ob alimenti inopiam, nullum remedium est: quum tunc necessariò laxentur, moueanturque: nempe compage ipsorum laxiori reddita, ob tenuitatem non modò dentium, sed locellorum etiam eos amplectentium. Hæc itaque affectio senibus accidit citius aut serius, ueluti etiam magis aut minus. Quæ uerò phlegmonem refert, magis iuuenes corripit. Auxiliari tamen etiam oportet senibus, auxilio gingiuis adhibito. Eas autem astringen-

Dentes interdum non nihil simile inflammationi perpeti.

Dentes augeri et nutiri, quod liquet ex his qui sunt exemptis oppositi.

Dentes duabus sunt obnoxii affectionibus.

Dentium tenuitatem ob alimenti inopiã esse incurabilem.



tibus medicamentis robustiores, & magis circa dentem astrictas facere conuenit: tanquam ipsæ ad stabilitatem & firmitudinem dentium, aliquid etiam conducant. Porro forantur dentes ab humorum acrim & erodentium influxu, quemadmodum etiam cutis citra externam causam solet exulcerari. Verum cutis exulceratur assidue & multis: ossa autem rarius, quod ob duriem ægrius quam cutis ipsa patiantur. Igitur corporum erosorum medela, erit resiccatio uitii influentis humoris: qui si paucus fuerit, per localia exiccantiaque auxilia absumentur. Si uero multus, uniuersi capitis prouidentia est habenda: quod quidem si ob uniuersum corpus affectum sit, huic etiam est prospiciendum. Etenim erosos ob mollitudinem dentes, duriores impatibilioresque per austera & acerbata medicamenta reddendi sunt. At liuidos redditos, per siccantia curare oportet, ut qui ex uitiosorum humorum influxu id patiantur: unde similem cum foratis curationem desyderant.

## De gingiuarum medela.

Gingiuas inflamas oleum lentiscinum per sanat.

**G**ingiuis ex inflammatione dolentibus optimum pharmacum est oleum lentiscinum recens, calfactumque in duplici uase, atque ore retentum. Repellit enim citra molestiam, discutitque absque mordacitate, cuius rei inflammatis precipue est usus.

Dentium doloribus medicamina ab Archigene prodita.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit. **D**olentes dentes colluant aceto calido cum galla. Aut pinguibus tedis in aceto feruefactis. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepelactis. Aut hyoscyami cum aceto. Aut agrestis cucumeris radice, uel marrubio, singulis cum aceto, pipere, & nitro. Aut pulegii decocto. Mirifice facit dens caninus ustus & tritus, deinde cum aceto coctus & ore retentus. Aut scillam, aut radicem hyoscyami in aceto coctam colluito. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocynthidis medulla similiter con-



quito, liquoremq; ex eis longo tēporis spatio in ore teneto. Hæc Archigenes. Porro solanum, stupefaciendo sensum duntaxat, auxiliatur dentium doloribus.

Ad foratos atq; dolentes dentes remedia ex Archigene. Sory Aegyptium resina terebinthina exceptum obline, indeq; intra dentis cauernulam.

Foratos atq;  
dolentiū den-  
tium remedia

Aut senectam anguis dentibus apprimito, & exci-  
dent. Aut uermes terrenos tostos cauernulæ præ-  
mundatæ inspergito. Aut piper, uel roris marini  
semen, opio exceptum, in cauernulam inde. Aut in  
aurem denti uicinam oleum sesaminum, in quo uer-  
mes terrestres concocti fuerint, instilla. Ipso aut do-  
lente dente hyoscyamū contērant. Erosi etiam  
atq; dolentibus dentibus, candens admoueto caute-  
rium. Præstat ad eliciendam pituitā, staphidem  
agrestem per se, & cum pulegio manderē.

Fomenta ad dētiū dolores extrinsecus sunt ex sa-  
le & milio, simul & torrefactis, & coniectis in saccu-  
los. Dolenti autem denti affricetur origani ramulus,  
oleo feruido intrinctus. Aut opopānacem & peu-  
cedani succum unita, linteolo illigato, & intra oleum  
feruefacta, denti dolenti apprimito. Aut bene conte-  
cto, & hiare iusso, hyoscyami semina in suffimentum  
adhibe.

Ad eximendos absq; dolore dentes. Dentibus exi-  
Pyrethrum acerrimo aceto ad dies quadraginta mēdis citra do-  
condito, terito, & reponito. Vsu uerò exigente, reli-  
quis cera obturatis, dolentem ipso pharmaco integri-  
to. Deinde hora interposita, digitis extrahito, aut scal-  
pello exigit. Dentes educunt fortiter tithymalli suc-  
cus, & fori, cum chalbano imposita. Apollonius  
autem radicis betæ succū per se iubet instillari in na-  
res: ad soluendum dentium dolorem. Eiusdem, Dentium facto  
si remedium.

ne erosi dentes uacillent, ne uel tactorem edant, reme-  
dium. Veratrum nigrum erui magnitudine melle  
cocto exceptum, cauernis inde. Eiusdem ad den-



Dentifricium  
optimum.

tes denigratos optimum dentifricium. Alabastrite  
usti, drach. viij. pumicis usti, drach. iij. salis torrefa-  
cti, drach. iij. tritis utitor. Ab horum usu collutione  
utendum est, ex uino odorato, in quo ad multū tem-  
pus iris sicca fuit macerata.

Dentes confir-  
mans remediū.

Asclepiadis reme-  
dium ad dentes motos. Cornu cerui usti, drach. viij.  
Rhois rubri, drach. iij. omphacij drach. ij. balaustrij,  
drach. iij. corticis pinus, myrrhæ, sing. drach. j. tritis  
utitor. Collutio eiusdem ad molarium dolores.  
Radices smyrnæ cum aceto mulso coquito, & exco-  
latum liquorem ore tenendum dato. Ad erosos  
dentes præseruatium. Zingiber cum aceto mul-  
so coquito, ac probè terito, indeq; in cauernam indi-  
to, forisq; dentem ex eo integito. Aut hederæ la-  
chrymam chalbano misceto: aut tithymalli, uel ficus  
syluestris succo dissoluito, ac utitor.

De mobilibus & prominentibus dentibus.

Dentes promi-  
nētes exten-  
di ratio,

**V**bi dentes absq; ictu præcedente mouentur, ue-  
risimile est, neruos radicibus eorum adnatos,  
præ nimia humiditate laxatos esse: ob idq; siccantibus  
medicamentis eis esse opus. Quum autem emoti den-  
tes prominentiores sint reliquis, præcipuè ubi ex pla-  
ga mouentur: sanè semper optimum iudicaui fore, si  
sic affecti, in tantum attererentur lima, quantum su-  
per reliquos prominent: idq; ne oppositos sibi offen-  
derent, in loquendo, mandendo'ue: quod consilium  
semper mihi satis feliciter cecidit. Oportet autem gin-  
guis linteolum molle usq; ad radices dentium cir-  
cundare: dein digitis sinistræ manus leniter ample-  
cti, simulq; tutè, & citra compressionem, ne concutia-  
tur cui limulam adhibemus, chirurgiam ipsam aggre-  
di: eamq; non una uice absoluere, sed pluribus. Im-  
perandum etiam est ægro, ut nec loquat, nec durum  
aliquem cibum accipiat: utatur autem alimento suc-  
co prisanæ, & sorbitione ex alica, & pane madido.



atq; alijs id genus mollibus. Ad firmandos dentes, ex Archigene. Myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorū partes tritas admove. Postea asininum lac colluant calidum, aut acetum, aut uinum, in quo malicorium & galla sint cocta.

Ad dentium autem stuporem portulacam manducent. De dēitione puellorum, eiusdem.

Dentienti infantulo, si doluerit, canino lacte gingiuas obline. Aut si leporino cerebello gingiuas eius ille ueris, cito dentes prouenient. Mulcet gingiuas dolentes acetum cui hyoscyami radix incocta fuerit.

Quod si enascens dens ægrè crumpat, & compūgat gingiuam, cyperum ex butyro & unguento susino iuxta exortum illinito.

Præseruatiua dentium ab Archigene prodita. Alumine scisso & modica myrrha confricato, nec erodētur unquam. Aut iridem Illyricam mandito.

Compositio Andromachi eadem hora dentium dolorem sedans. Piperis, pyrethri, succi tithymalli, chalbani, sing. drach. j. chalbano excepta in cauernam indito.

Alia. Seminis hyoscyami, opi, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, sing. drach. j. chalbani drach. ij. tritis ex uino utitor.

Collutio ad motos dentes, Critonis, Lentiscum, myrtum, gallam, in uino cocta colluenda præbeto.

Eiusdem ad corrosos dentes. Capparidis radicem cum acri aceto ad dimidias coquito, & colluito tepidum.

Dentifricium ad gingiuas madore laxatas, putrescentes, & cruentatas, concussos dentes, ozanas, parulidas, dolores, & omnia oris ulcera. Perdicij recentis drach. x. mellis, aluminis scissi, iridis Illyricæ, sing. drach. iiij. piperis albi drach. viij. nigri, drach. ij. pumicis, pyrethri, hyssopi, pulegij, feminis apij, sing. drach. ij. myrrhæ, menthæ siccæ, herbæ sideritidis, singul. drach. iiij. salis fossilis drach. iiij. Perdicium, sideritidem, mel, & salerni, mista urito: alumen uerò per

Dentium stupori portulaca auxiliatur.

Dentitioni puellorum congruentia medicamentum.

Dentes præseruantia contra erosionem.

Dentifricium ad omnia gingiarum & oris ulcera faciens.



Dentifricium  
insigne.

se ustum uino extinguito: dein omnibus simul contu-  
sis utitor. Smegma dentes reddens candidos,  
eosq; ab erosione defendens, oriq; bonum odorem  
concilians. Nitri, testæ sepiæ, myrrhe, sing. vnc. j. tri-  
tis utitor. Aliud ad idem. Aluminis scissi sexun-  
cem, mastiches, vnc. j. comæ rosarum, quadrantem  
iridis trientem. Tritis utere, indeq; aquam tepidam  
colluendam præbe.

G A L E N I P E R G A  
M E N I, D E C O M P O S I T I O  
N E P H A R M A C O R U M S E C U N  
dum locos, Liber. VI.



Inuentione ra-  
tionalium auxi-  
liorū præstare  
illū, quæ soli ex  
perientia inni-  
tuitur.

Inflammationis  
causa, & cura-  
tio.

VANVIS PLVRIMVM  
interest, ex uiua ne aliquis uoce, an  
ex libris discat, non tamen paruum  
commodum studiosis ex commenta-  
rijs accedit: ob idq; ad hosce conscri-  
bendos me accinxi: quum rationa-  
lis auxiliorum inuentio præstet illi, quæ soli experien-  
tiæ innititur. Igitur in stomaticis pharmacis, de quibus  
agere in præsentī commentario est animus, primus  
medendi scopus est communis omnium partium in-  
flammatarum: secundus autē, proprius illius cui me-  
demur. Porro inflammationes, ex influxu calidi san-  
guinis fiunt, qui repellendus est, nisi uereamur ipsum  
ad partem aliquam principem recursurum, atq; illic  
grauiores aliquem morbum excitaturum. Utimur  
igitur uenæ sectione, & purgatione & clysteribus, et  
inedia, ubi totum corpus plethoricum, aut cacochy-  
mum extiterit: Si uerò neutrum sit horū, statim pro-  
peramus ad curationem per localia remedia. Impos-  
sibile autem est, pharmaco rite uti eum, qui uim ip-



sius non cognorit, secundum quam auxiliatur. Porro medicaminum repellentium genus, quibus utimur in principijs inflammationum, in materia refrigerantium consistit; quorum sanè ea quæ astringendi natura prædita sunt, efficaciorum vim habent, ad ocys repellendum influxum. Inest quippe ipsis statim etiam facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur. Communis itaq; scopus in oris inflammationibus est, prohibendi eos dū incipiunt; secundus autem, ab ipsa particula sumitur: quum sciamus longè rariorem atq; molliorem esse oris tunicam, cute qua uniuersum integitur corpus. Taceo tunicam oris, medicamentorū insuauitatem percipere: posseq; medicamenta ori indita defluere in uentriculum & pulmones: quorum neutrum cuti reliquæ adest. Quare fortibus medicamentis, cuiusmodi chalcanthos existit, quæq; uenenosam facultatem sortiunt, uti ad oris affectiones non licet, nisi magna urgeat necessitas. Ergo succus mororum solus, recensq; à fructu ipso expressus, ad incipientes oris inflammationes est melior illo, qui, ut asseruari diutius possit, ex melle coquitur; quanquam ad sequentia inflammationis tempora, utilior est qui ex melle est coctus. Nam quemadmodum in principio utilia sunt pharmaca repellentia id quod influit: sic post principium usq; ad finem, pharmaco opus est ex utrisq; misto, repellente uidelicet facultate, & discutiente, prædito: ac primo quidem tempore, astringens precellere oportet; ad finem uerò discutiens; atq; interposito tempore æquales utrorunq; partes esse conuenit. Quando uerò ueluti induratum quippiam ex ipsa inflammatione relinquitur, penitus non conuenit astringens ad discussorium miscere, \* si prius uniuersum corpus fuerit uacuatum. Similiter neq; in principio bonum est discussoria miscere astringentibus.

Astringentium  
facultas.

Oris affectio-  
nibus cur exhi-  
benda non sint  
fortia, nec ue-  
nenosa medica-  
menta

Oris inflama-  
tionibus quæ  
epitulent me-  
dicamenta.

Digerentibus so-  
lis utendum ef-  
se ubi durities  
aliqua ex oris  
inflammatione  
relinquitur: cæ-  
terū prius cor-  
pore uniuerso  
uacuato.



Croci facultas.  
Myrrhæ facultas.

Dia moro medicamen.

Letalia omnia  
non esse deleteria.

Oris inflammationi concoctæ  
quæ congruât.

Rubi cremor.  
Stomatici ex  
succo nucû uiridium, ad oris  
inflammationes  
conuenientissimâ, cõpositio.  
Nucum succo  
uiridium adest  
astringitio penetrans.

Merito autem qui pharmacum diamoron cõposuit, parum ex croco & myrrha ei commiscuit, q̃ communionem habeant facultatem concoctoriam inflammationum: priuatim uerò, crocus quidē astringat: myrrha autem calfaciat in tantum, ut sufficienter discutiat, tenuium partium etiam substantiam possidens, qua facile in altum subire possit, uiresq; aliorum medicamentorum deducere. Soleo autem ipse in principio ad pharmacum dia moron miscere rhois succum, aut omphacium, aut florem rosarum, aut ipsas rosas siccas, necnō balaustium, cytinis, malicorium aridum, gallam omphacitin, pini, thurisq; corticem, hypocistidem, lentisci succum, ac breuiter astringentia omnia, præter ea quæ corrumpentem possident facultatem, quæ & deleteria dicitur, & letalium species quedam existit: quippe cum non omne letale, necessariò etiā deleterium, hoc est uenenosum, existat. At ubi inflammatio iam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse tantum crocum & myrrham, ut ipsa inflammatio coquatur. Quæ ubi concocta fuerit, addere aliqd ex discussioris licet, cuiusmodi sunt nitri spuma, nitrum Berenicarium, sulfur uiuum, sapa, origano interdum incocto, aut hyssopo, aut pulegio, aut thymbra, aut thymo, aut calamintha hortēsi & agresti. At uerò Erasistratus, quum mororū succus illi ad manum non esset, rubi cremore usus, se ipsum curauit. Ego autem pharmacū ex succo nucum uiridium confeci, facultate ad oris inflammationes cæteris omnibus stomaticis plurimum antecellens. Cuius compositio est huiusmodi. Succum externi nucum uiridium corticis cum mellis iusta portione coquo, donec ex utroq; mellis crassitudo cõsistat. Hinc autem liquet qualis sit eorum corticum succus, quantaq; astringendi uis, q̃ ne per fortissima q̃dem exterioria, nigredo elui possit ab eorū manibus, qui uiri-



des nuces decorticāt. Atq̃ nisi in profundū manuum illa facultas descenderet, non certē agrē eluibilis esset. Quum autem descendat, indicat planē substantiam succi, tenuium partium esse. At rationi est consonum astringēdi uim esse maximē ex usu, ubi in eius modi contineatur substantia: ineptam autem existere, quæ crassarum partium substantiæ est coniuncta. Optimum itaq̃ ac simul suauem esse nucum succum mihi persuadens, eum in quatuor partes diuido: & ad primam statim aliquid ex astringentibus misceo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiam sulfuris & nitri non nihil. Quartam uerò solam synceram seruo, ob dulcorem futurā utilem pueris, mulieribusq̃, & uiris effœminatis. Est autē quod ex succo rubi constat, fortius eo quod ex moris conficitur: quemadmodum hoc eo, quod ex musto parat: omnibus tamen præstat quod ex succo fit nucum. Porro in pharmacis quæ deglutiuntur, maximē coniectare oportet naturam eorum qui ipsa sument. Nam quod cum molestia aut fastidiosē accipitur, os uentriculi euerit. In stomaticis autem medicamentis, eiusmodi synceritatem interdum contemnere licet. Si q̃s igitur medium aliquod medicamen cōficere omnibus aptum uelit, ut exempli gratia quod constat ex succo mororum, ad quinque libras succi, unam mellis adiiciat: croci autem & myrrhæ, utriusq̃ drach. j. S. Vini item austeri, heminam unam: omphacij, drach. j. Quod si non adsit, pro ipso rhois succū iniicies: & si uolueris par pondus utriusq̃ imponere, nihil peccaueris. At Hera drachmam unam scissilis aluminis addit. Quod uerò ad coquendi modum spectat, ego sanē censeo succum ipsum solum esse per se præcoquendum usq̃ ad crassitudinem strigmentitiam: dein uerò adiiciendū mel: atq̃ ubi iam cacabum ab igne uelis auferre, reliqua imponenda esse. Etenim ut spuma argenti, & plum-

Astringentē tenui substantia iunctā, esse maxime ex usu ad repeliendas inflammationes.

Stomatici ex succo nucum quadruplex cōpositio.

Stomaticū ex succo nucū, cæteris uniuersis præstare.

Stomatici diamoron cōpositio apta omnibus.



Aromaticorū  
complurū ui-  
res, per cocturā  
exolui.

Oris induratis  
inflammationi  
hus qualia sint  
apta medica-  
menta.

Oris uigentes  
inflammationes  
quibus sint co-  
quendae medi-  
camentis.

Punicorū malo-  
rū species tris,  
austerorū, dul-  
ciū & acidorū.

Stomaticū ex  
punicorum suc-  
co.

Stomaticū ex  
nucibus deuo-  
rā dum nō esse

bago, aliaq; multa metallica, per cocturam meliora euadunt, sic uis complurium aromaticorum exoluitur. Cæterum ad induratas inflammationes, quū iam præterierit uigor, nec amplius influat quicquam, prædicto pharmaco discussoria miscere oportet, cuiusmodi sunt spuma nitri, nitrum, petræ Asiæ flos, sulfurq; uiuum. Ac sufficit sanè nitri vnciam. S. sulfuris vncias duas, si addideris. Quodd si nihil horum sit præsto, in sapa aut mulsā, origanum seruefacito, ipsa mq; stomatico pharmaco adijcito, & gargarizare iubeto.

Nihil autem refert, etiam si hyssopum coniicias pro origano, aut pulegium, aut thymum, aut thymbra, aut calaminthem, aut hedyosmum. In uigore autem inflammationum, collutionibus & gargarismis concoquere inflammationem oportet, pinguium caricarum decocto, lentiscinoq; oleo tepesfacto in duplici uase. Quin & ipsum stomaticum pharmacum in uigoribus gargarizare cōuenit mulsæ dilutiori permistum, aut calidæ sapæ, aut etiam aquæ calenti.

At meum ex succo nucum medicamentum, aliorū omnium est ualidissimum, utilissimumq;. Quum autē tres sint Punicorum malorum species, austerorū nēpe, dulcium, & acidorū, equas singulorum partes, unā cū corticibus soleo ipse etiā contundere, expressumq; succum cum melle coquere, ac sic conficere medicamentum non solum stomaticū, sed ad multa alia utile. Contunditur etiam cum illis & rubi fructus: cuius succus similiter præparatus succo mororū, melius illo pharmacum redditur, sed minus ualidū eo, quod ex nucum succo paratur. Quin & malorū cotoneorum, & pirorū syluestrium, ac mespilorū succus, similiter præparatus, stomaticum pharmacū redditur, aptumq; etiam ut deuoretur: quum hoc quod ex nucibus constat, deuorare non liceat. Verū quod ex punicis constat pharmacum, aptum est exoluto & cibos fastidienti uentriculo deficit



culo: deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Inno-  
 cum est etiam rubi mororum succus uoratus, ueluti  
 et ipsorum mororum: sed succus rubi mororum habet  
 quid quod stomachum roborat: quod ipsum, mororū  
 cremor non habet. Iam uerò succus nucum plurimo  
 melle opus habet: & post eum, rubi mororum: modi-  
 co autem, malorum, & punicorum, & punicorum syl-  
 uestrium. Medius inter hos est mespilorum succus.  
 Ex cornis etiam, brabyliisq; & prunis, stomatica pre-  
 parantur. Cæterum si crassus esse uideatur succus, sta-  
 tim mel admiscere oportet: sin liquidior, pre-coquatur.  
 Suscipit autem pirorum atq; malorum succus parem  
 mensuram mellis. Succus uerò eorum quæ nimis acer-  
 ba sunt, ueluti est corni fructus, aliquando duplum, ali-  
 quando triplum mellis desyderat. Porro si atramentū  
 sutorium admistum sit, non admodum deglutire opor-  
 tet confectum pharmacum, præter q̃ si iuxta stoma-  
 chum, aut aluum, ulcerosam affectionē fieri uereamur.  
 Quin & si in ipso ore maligna ulcera fiant, præstant ex  
 atramento sutorio medicamenta. Sufficit autem drach-  
 ma ad prædictam compositionem admista, in qua unā  
 mellis libram coniūci dicebamus. Iam uerò quū rhus  
 sit duplex (alter enim obsonijs inspergitur, stomacho  
 cōmodus: altero coriorum tinctorum utuntur) uterq; sa-  
 nè musto incoctus, stomaticum efficitur medicamen.  
 Mustum etiam solum, citra mellis misturam in mellis  
 compagem redactum, bonum sit pharmacum in prin-  
 cipijs, augmentis, atq; uigoribus. Ad declinationem  
 autem præstiterit, si in ipso diem integram tedas pin-  
 gues p̃maceraueris. Quod si preciosius efficere phar-  
 macum uis, inijcies etiam casia corticem, aut nardum  
 Indicam, aut malabathri folium: singulorum nempe  
 unam drachmam. Ad induratas autem inflammatio-  
 nes, coniūciuntur quæ generosius discutere possint, tu-  
 sa uidelicet, & cribrata, idq; ubi olla ab igne est exem-

Rubi mororū  
 succus es ven-  
 triculi roborat  
 id quod succo  
 mororum non  
 inest.  
 Succorum qui  
 nā plus, & qui  
 minus requirāt  
 mellis.

Calcanthō qñ  
 stomaticis mi-  
 scere expediat  
 medicamentis.

Rhus duplex.

Musto qñ &  
 qualiter prepa-  
 rato utendum  
 in oris inflāz-  
 tionibus.



Discutientia  
pharmaca que  
nam sunt.

Stomatiki ex  
multo compo-  
sitio.

Inflammationi  
incipienti, au-  
striora, vigēti,  
moderatiōra,  
inclinanti, ma-  
gis digerētia  
conueniunt.  
Astringētia pa-  
ratu facilia:  
Digerētia me-  
diocriter.

Digerētia va-  
lenter.

pta. Ac talia sanè sunt costus, amomum, macer, cyre-  
naicus succus, Medicusq; Pauperibus tamē pro sum-  
ptuosis discussoijs pharmacis, aut dictamnū, aut aco-  
ron, aut meon, aut pyrethrum, aut cardamomum, aut  
sinapī iniiciendum censeo, pari pōdere: ita ut ad trium  
drachmarum pondus, eorum mistorum moles perue-  
niat, ad prædictā symmetriā, in qua mellis libra habe-  
batur. Verūm pro cōstitutionis affectuū proportionē  
augeri ac minui pharmacorum uehementiam oportet.  
Ergo pharmacum conficientes ex multo, ad decē mu-  
sti heminas, tres iniiciemus heminas rhois coriariorū,  
aut eius qui obsonijs inspergitur. Si uerò utrūq; iniicia-  
mus, utriusq; una & dimidia iniiceinda est. Iuxta pro-  
portionem etiam, ex discussoijs, quodcunq; tandē in  
promptu habeamus. Quòd si unum tantū suppetat  
nobis astringēdi uim habēs, quod in principio iniicia-  
mus, aut unicum discussorium, quod iuxta finem: ex il-  
lo totum pondus explebimus, quod ex omnibus alio-  
qui fuisset conflandum. In uniuersum autem, austerio-  
ra quidem, in principijs, & uehementibus influxioni-  
bus congruunt: moderatiōra in uigoribus: ut magis  
discussoria in declinationibus. Porrò ex astringētibus  
facilia paratu sunt, rosæ, baccę myrti, myrtus, lētiscus,  
rubus, canirubus, galla omphacitis, fructus Ægytię spi-  
næ, omnia aluminis genera, unus & alter rhus, glau-  
cium, omphacium, cytini, & balauftia. Ex discutienti-  
bus moderatè, facilè parantur, caricarum fufurumq;  
decoctum: aut mulsæ, in qua origanum, aut hyssopum,  
aut thymus, aut calamintha, aut pulegiū, aut hedyos-  
mum concocta sint: quæ si diutius coquantur, fortiora  
reddūtur: amplius autem & nitri spuma, aut ipsum ni-  
trum ustum. Fortius uerò his est sulfur uiuum. Rectè  
autem Andromachus medicamini ex succo mororum  
confecto addidit glycyrrhizam, ut exasperata leniret,  
asperitatemq; astringentium mitiorem redderet.



Stomaticū Andromachi ex musto, quo utor. Gallas, xxx. Rhois coriarij sext. ij. musti sext. vj. Gallas confractas per diem & noctem in musto macerato: dein coquito, donec ex toto quarta supersit portio: quam per linteolum colatam, expressamq; in olla ad mellis crassitudinē spissato: dein trita addito, aluminis scissi, croci, myrrhæ, sing. drach. j. permista reponito, tandemq; eis utor. Iam uerò, quod ex dulci confectum est musto, magis mitigatorium et moderatum erit, sed minus efficax: id autem quod ex acerbis fit uuis, uehementius quidem astringit, leniendi uim tamen non habet: ex medio uino paratum, mediam facultatem sortitur.

Stomaticū Andromachi ex musto.

Stomaticum ex Besasa anginis congruens, ab Andromacho scriptum. Sem anisi, apij, ammi, floris iunci odorati rot. aluminis scissi, iridis Illyricæ, besasa (hoc est seminis rutæ syluestris) cinnamomi, myrrhæ troglodyticæ, aristolochiæ longæ, calicæ, rosarum siccarū, crocomagmatis, sing. vnc. j. croci, cineris hirundinum tenellarum, utriusq; quadrantem. croci sesquiunciam. nardi Indicæ, amomi, utriusq; vnc. S. gallas. viij. tritis cum melle utor.

Stomaticū ex Besasa Andromachi,

Stomaticum Asclepiadis. Hirudinū syluestrium ustarū cineris, drach. iij. croci, nardi Indicæ, utriusq; drach. j. melle excipito.

Aliud Andromachi. ad columellam laxatam, Aluminis liquidi lib. j. florum rosarum, lib. S. succi hypocyfidos quadrantem. Alumen in melle coquito: dein sicca inspergito: utorq;.

Columellæ laxate remediū.

Aliud eiusdem ad omnia uitia oris. Crocomagmatis drach. ij. iridis drach. iij. sandarachæ drach. S. terebinthinæ, drach. ij. Lycij Indici, drach. j. uux passæ drach. viij. aloes, omphacij, singul. drach. j. nucum pinearum tostarum, drach. viij. succi glycyrrhizæ, aluminis scissi, balauftij, sing. drach. j. floris rosarum drach. ij. mellis hem. ij. S. conficito.

Stomaticū ad uitia ora oris.

Stomaticum Asclepiadis. Succi hypocyfidos drach. ij. balauftij, lycij, acaciæ, sing. drach. j. excipito oliuæ im

Stomaticum Asclepiadis.



maturæ succo, & postea melle subactis unitor.

Si uerò eger stomatica id genus fastidiat, in moderatis quidem inflammationibus sufficiet succi soli fructuū iam dictorum, ut rubi, & mororum, punicorumq; malorum, & cotoneorum. Quin & succus nucum ubi cū solo melle paratur, gustui suavis existit: itemq; mustū ex uuis acerbioribus pressum, si rhus in id coniiciatur, optimum pharmacum redditur. Ad eas uerò inflammationes quæ multa astrictione indigent, austerorum punicorum, aut cotoneorū, aut utrorūq; succus, mellī admixtus, sæpe mihi fuit satis. Singulis autem horum succorum licet omphacium adijcere. Vehementissimū medicamen reddetur, si punica integra tundas unā cū corticibus, indeq; succum exprimas, atq; hoc magis si acerbæ fuerint. Acerbissimum etiam fiet, si ad punicorum austerorum ita tusorum succum, omphacium superaddatur cum moderato melle. Præstantius adhuc reddes pharmacum, si tota contusa punica mala, passo cocta excolaueris. Ne uerò ualde exasperet, glycyrrhizæ succum admiscens, conficies optimum pharmacū.

Acerbissima  
stomatica con-  
ficiendi ratio.

Induratis inflā-  
matiōibus ap-  
ta stomatica.

Glycyrrhizā  
stomaticis ad-  
dita, ipsa me-  
liora reddit.

Putredo obo-  
ritur cito, in ca-  
lidis & humi-  
dis partibus.

Si quid uerò induratū appareat, his succis qui medias facultates fortiuntur, inijcies aliquid, dum coquuntur, ex pulegio, aut thymo, aut origano, hyssopo, mintha, aut calamintha: dein colabis, & habebis optimum medicamen. Quod si calidius efficere uelis, piper addes. Omnibus tamen si glycyrrhizæ succus addatur, melius pharmacum efficietur.

#### De crustis.

**I**N calidis & humidis corporis partibus, qualis est os, ex quacunque tandem causa fuerit exulceratum, cito putredo oboritur. Ad cuius ulcera fortissimis sæpe uti cogimur medicamentis. Atqui fortissima sunt, quæ escharam instar catuterij excitant. In externis igitur corporis partibus, ubi parti curandæ crusta fuerit inducta, à fortibus supersedemus pharmacis, transgre-



dientes ad deterforia, quæ escharas tollunt. In his uerò quæ in ore excitatæ sunt, escharis, tutius mihi uidetur esse admiscere ad exteriora pharmaca, alia quædã fortiora, & quæ per se admora, crustas etiam inurerent.

Melli itaq; maxima extergendi ui prædito, crustifica medicamenta immiscemus: quemadmodum ad sordida quæ in corporis cuticula oriuntur, miscere illi leuiter extergentia solemus, ut thus, eruum, iridem, aristolochiam, & alia id genus. Porro Andromachus, ad oris crustas, ex nucibus pineis, amylo, alumine scisso, flore rosarum, croco, & melle, composuit optimum stomaticum. Critonis ad oris crustas medicamentum.

Misyos torrefacti, drach. iij. mellis optimi cyathos sex. misceto & utitor. Idem etiam præstat chalcitis assata cum melle. Archigenis ad crustas oris remedia.

Cõmodissimum est stercus canum, aliorum osibus, ex melle illitum: quod etiam in angina auxiliatur. Aut rhus Syriacus ex melle. Aut hirundinum ustarum & stercoreis humani par modus cum melle illitus. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda dato.

Ego uerò medicamẽ ex rhoe damno, q̃ astringẽtis sit facultatis, quæ minimẽ crustis conuenit. At hepar lupinum eupatorio mistum, ad hepaticas etiam hibitur affectiones. Sorani stomaticũ ad crustas, foetẽtesq; gingiuas & humore pregnantas. Misyos usti, drach. viij. iridis Illyricę, drach. iij. croci drach. j. Trita in pyxide lignea reponito, & tum per se, tũ ex melle utitor.

Aliud nomine Anthera. Iridis Illyricę, sandarachę, cyperi, sing. drach. iij. aluminis scissi, croci, crocomagmatis, sing. drach. ij. tritis & mistis utitor.

Stomaticum Heraclidis Tarentini ad uehementes putredines oris atq; reliqui corporis. Chalcitidis partem. j. calcis uiuæ tantundem. auripigmenti partem dimidiam: tritis & mixtis utitor. Aliud. Florum rosarum, drach. iij. aluminis scissi, gallę, sing. drach. ij.

BBbb iij

Oris pustulis extirpatis, miscenda exterioris esse uehementissima pharmaca, & quæ per se, admota, excitare possent escharas.

Oris crustis de lędis remedia uaria.

Crustis nõ cõuenire astringẽtia.

Hepar lupinũ confert hepaticis. Stomaticum Sorani.

Anthera.



Cauterio uten-  
dum in putrila-  
ginosis oris vl-  
ceribus, ubi re-  
liqua ī cassum  
administrant.

myrrhæ drach. j. trita melli misceto, utitorq̃s. Qui-  
dam sale macerato in aceto, resiccatoq̃s, utunt. Si hæc  
remedia putredo ipsa respuat, utendū cauterio est: po-  
stea uerò colluendum ulcus p̃dictis, imponendaq̃; an-  
thera, donec crusta abscedant.

#### De columella.

Columella,  
Gargarcon  
Cion.  
Columa.  
Staphyle.  
Columellæ in-  
flammatæ cu-  
ratio.

**C** Aruncula illa quæ ad extremum oris dependens  
cernitur, à ueteribus quidem gargarcon, & cion,  
hoc est gargulio et columna: à neotericis autem cionis,  
hoc est columella, uocatur: cuius sanè affectionē quan-  
dā, staphylen, hoc est uuam, dicimus. Raro tamē affe-  
ctio hæc circa columellam contingit: licet ea sæpe in-  
flammeur. Et sanè quemadmodum in alijs omnibus,  
in quibus ex humorum influxu contingit morbus, sic  
etiam hîc prima auxilia debēt fluxionem ipsam repel-  
lere: quare astringentis sint facultatis oportet: uerū  
si quidem influxus sit moderatus, moderatè astringen-  
tis, quam priuatim austeram uocant: si uerò uehemen-  
tior, acerbæ. Ambæ quippe facultates astringunt,

Acerbæ & au-  
stere facultates  
ut differant.  
Collutiōes mo-  
deratæ ex qui-  
bus fiant.  
Collutiōes val-  
de astringētes.

sed debilius austeræ: uehementius acerbæ. Porrò mo-  
deratæ collutiones sūnt ex palmularum, rosarum, pā-  
pinorum uitis, rubi, canirubi, aspalathi, cyperi, cytino-  
rum, siliquarum, radicum mori, hypocisthidis, malo-  
rum austerorum, pirorū acerborum, ac sorborum de-  
cocto. His sortiora sunt myrti, & baccarum eius de-  
coctū, & ex acerbis contoneis malis, et uirgultorum te-  
nerorū ilicis, arbuti, smilacis, phagi, & ipsarum glan-  
dium: mespilorum item, & cornorum, & fructus me-  
mæcili. Generosissimum autem est decoctum galla-  
rum, & rhois culinarij, & coriarij, fructusq̃; myricæ, et  
Ægyptiæ spinæ. Ex his singula tū per se, tum etiā mix-  
tū cocta ex aqua, gargarissare oportet. Mirum enim  
q̃ mixturæ ipsorum utiliores sæpe sūnt ipso simplici  
usu. Quin & arida etiam columellæ insperguntur. Iam  
uerò moderatè astringunt etiam lapis Ageratus, aloë,

Miscellæ me-  
dicaminū ali-  
qñ esse utilio-  
res simplicium  
usu.



cyperus, flos iunci odorati, radixq; nardi Indicæ, Exi-  
mie astringūt omnia aluminis genera: scissum uerò in-  
ter ea tenuiorum est partium, & ob id utilius. At atra-  
mentum sutorium uehementem astringendi uim possi-  
det: non est tamen expers calfactoriæ: ob idq; putri-  
ginosis ulceribus conuenit. Cæterum gurgulionem  
exasperat, etiam si iam scirrhum contraxerit. Corrum-  
puntur autem succi omnino, si absq; melle reponantur:  
aut resiccantur si plurimum fuerint cocti. Nonnulli  
tantam ariditatem asciscunt, ut conteri queant. Tales  
sunt hypocisthidis, uuæ acerbæ, glycyrrhizæ, & cen-  
taurij succus. Ridiculum autem est quærere, inter duo  
eiusdem generis pharmaca, utrum sit ipsorum præstan-  
tius. Omnia siquidem medicamenta respectu ad aliqd  
tum utilia, tum noxia dicuntur. Quocirca si pronuncia-  
ueris pharmaca nihil esse sola per se, rectè dixeris: nihil  
enim sunt, nisi nacta fuerint utentem rectè. Si uero con-  
trà, pharmaca Deorum esse manus fatearis, similiter re-  
ctè dices. Iuuant quippe maximè, si is qui eis utitur, in-  
rationali methodo fuerit exercitatus, atq; natura pru-  
dens. Porro mistura pharmacorum eiusdem generis,  
mediorum pharmacorum usus fit gratia: ob idq; semp  
duo contraria medicamenta in unoquoq; affectu uos  
habere operæpretium duco: quæ quidem permiscendo,  
multis pharmacis abundabit. Quum autè rarò quis  
affectionem inueniat, quæ (exëpli gratia) solis discusso-  
rijs, aut repulso-rijs indigeat, cogimur etià sæpe diuer-  
si generis medicamenta miscere: quemadmodum ubi  
cum repellentibus aut anodynis discussoria confundi-  
mus: ut si gurgulione inflammato, ad alumen iridem  
misceamus illyricam, aut farinam eruinam, aut thus,  
aut myrrham. Etenim quum discussoria sint mul-  
ta, est semper à mitioribus auspicandum: quandoqui-  
dem inflammata exasperantur ab acribus. Quæ  
Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.

BBbb iiii

Aluminis om-  
nia genera exi-  
mie astringunt:  
Chalcanthi fa-  
cultas.

Medicamenta  
omnia respe-  
ctu ad aliquid  
tum utilia tum  
noxia dici.  
Pharmaca ni-  
hil sunt sola  
per se.  
Pharmaca esse  
deorū manus.

Discussorijs  
mitioribus cur-  
fit in principiis  
uendū ubi di-  
gerere est op<sup>o</sup>.



Gurgulioni in-  
flāmato reme-  
dia secundum  
Archigenem.

Gurgulionis  
affectū curatio  
secundum Hip-  
pocratem.

Gurgulionis  
inflammati cu-  
ratio secundum  
Archigenem.

Tonsillarū in-  
flammaratū cu-  
ratio secundum  
Archigenem.

Vua laxata, succū cyrenaicū dissolutū illine: aut gallam tritam cum sale: aut ipsum sal dissolutum; aut lycij radicem tritam: aut omphaciū cum melle. Si fortius medicamentum uis, Atramenti sutorij, squame æris, aluminis scissi, misyos, myrrhæ, gallæ, æquas partes tritas, ac uino exceptas illine. In principio tamen, sale nō est priuatim utendum, sicuti nec cyrenaica lachryma: sed ubi columellæ inflammatio indurata iam fuerit. De gurgulionis aut inflammatione sic Hippocrates disserit. Gurguliones cum periculo excinduntur, uruntur, ac resiccantur, quādiu rubri fuerint & magni: quo tempore alijs artibus graciles sunt reddendi. Quum uerò totum id quod appellāt uam, abscesserit, extremum autem gurgulionis maius, liuidumq; redditum fuerit: superior uerò pars tenuior, tunc sanè intrepidè curationi admoliendæ sunt manus.

Quæ scripserit Archigenes ad uigentem inflammationem gurgulionis & tonsillarum.

**S**I uerò in uigorem affectio peruenerit, subducatur aluus, aut calidam lotionem furfurum gargarisset, aut ptisanæ succum, aut passum tepidum, aut radicis dulcis decoctum cum passo, & hyssopo, aut ficus uino incoctas, aut succum ptisanæ, in quo uuæ sint passæ incoctæ. Magnopere iuuātur, si amygdalinum oleum in aures infundens, forinsecus spōgij expressis leniter foueris. Quin & omelysis ex cruda hordeacea farina imponenda: aut ex farina seminis lini aut fœnigræci.

Quodd si iam prope ad suppurationem accedere tonsillæ uideantur, coadiuuare assiduè per ficuum decoctū oportet, p̄p̄modumq; incessanter id gargarisma exhibere, similiterq; aquam niulsam calidam. At si nihil tale apparuerit, augescat autem malum ita, ut ægri uis transglutire possint, ac suffocationis principium sit nobis suspectum, aluus forti clystere, aut glande subducenda est, & secunda cubiti uena, cucurbitæq; cū sca-



rificatione collo ac mento affigenda. Fomentis etiam & cataplasmatibus robustioribus est frequentius utendum, gargarismisq; assiduis. Quod si ne his quidē remediis mitescat morbus, sed augeat indies, uenæ sub lingua secentur, aut iuxta angulos oculorum, atq; illa quæ in fronte consistit. Illinatur autem assiduè fel tauri, & elaterium cū melle: aut sal cum oleo ueteri, mel leq; & aceto: aut cētaurea cum melle: aut absynthium cum nitro & melle.

Heræ medicamen ad collumellam laxatam. Gallæ omphacitidis, aluminis scissi, salis ammoniaci, sing. pares portiones conterito, inspergitoq;.

Vel Ageratum lapidem derafum in pollinem similiter columellæ imponito.

Porro Heraclides Tarētinus rectē sanē post usum medicaminum exacerbantiū, iubet colluamus fauces lentium decocto, ad tollendam uehementem illam astringentium aspredinem.

Ab Asclepiade prodita. Rosarum siccarum sextarium. j. nardi Celticæ unā cū radicibus, & adhærente terra, fasciculum. j. nidi hirundinum syluestrium aridi, drach. iij. myrhæ drach. viij. gallas omphacitidas numero. xv. contusa & trita digitis apprime. Est enim hoc mistæ potētiae pharmacum.

Aliud. Piperis albi, myrrhæ, sing. drach. j. aluminis scissi drach. ij. gallæ omphacitidis tantūdem. trita admove. Hoc tamen utendum non est in gurgulione uehementer rubente.

Aliud eiusdem facultatis, quo & nos sumus usi. Lapidis agerati, Asix petreæ, terræ samix, sing. drach. iij. aluminis scissi, croci torrefacti, gallarum omphacitidum, singul. drach. ij. tritis utitor.

Critonis medicamentum digerens. Ossium palmarum, rucū tenerarum immaturarum, siccarum, ntrarunq; drach. iij. Vrito atq; in puluillum terito, utitorq; arido admoto.

Aliud Sorani, maximè mitigatorium, ac proinde conuenientissimum ad uigentes inflammationes. Glycyrrhizam contundito, &

Venæ sub lingua, uel iuxta angulos oculorum, inflammatis tenillīs, quā incidenda.

Columellæ laxatæ medicamen Heræ.

Faucibus inflammatis remedia ab Asclepiade scripta.



mel & aquam pari mensura affundito: dein coquito, & liquorem ipsum gargarizandum præbeto.

De pharmacis ad ulcera oris

aphthas appellatas.

Aphthæ sunt  
oris ulcera, præ-  
cipue inuaden-  
tia infantes.  
Aphtharū cura  
tie per mode-  
rate astringen-  
tia.

Aphthis uaria  
remedia a ua-  
riis descripta.

**V**lcerationes in superficie oris obortas, aphthas appellant, habentes quippiam igneæ caliditatis. Fiunt autem plurimum pueris lactentibus, quum aut uitiosum fuerit lac nutricis, aut non probè ipsum concoxerit infans. Curantur facillè, utpotè quæ uel à moderate astringentibus compescantur. Quandoq; tamen diuturnæ fiunt, ægreq; solubiles, & progressu temporis nonnihil putrilaginosum acquirunt: atq; hæ sanè fortiora medicamenta postulant.

Andromachī medicamen ad aphthas malignas. Aluminis scissi, usti, drach. ij. fructus ericæ, drach. j. oleo excipito, & per digitum locis apprimito. Eiusdem ad aphthas leuiiores. Lycium Indicum uino tritum circumlitum, & ericæ fructus tritus, aut rosæ siccæ cum melle, auxiliatur.

At Crito, adipem suillum, & mel, simul liquefacta, commendat: ut collutionem etiam ex asinino lacte: manducationemq; portulacæ intinctæ melle: quæ oia & simplicissima sunt, & pueris maximè idonea.

Quæ scripserit Apollonius ad aphthas.

**A**d aphthas albas, chalcitidem oleo tritam penna illinito. Postquam uerò puræ factæ fuerint, myricæ fructum tritum, aut aqua mulsæ, aut uino dilutum, illinito, maximè infantibus. Ad nigras aphthas, uuam passam exacinatam, & anisum, trita cum melle illinito. Vel atramento sutorio trito cum melle utitor. Vel æruginis uermiculatæ, obolos. iij. in uini quarta heminæ parte gargarizandos præbe. Vel muriam oliuarum & acetum pari mensura mista, colluenda dato. Mandenda sunt etiam oliuæ muria conditæ. Hec Apollonius. Etenim oliuæ sic asseruata, discutiunt atq; uehementer astringunt.

Oliuæ muria  
conditæ discu-  
tiunt & uehe-  
menter astringunt.



Quæ Archigenes ad aphthas scripserit.

**A**D aphthas faciūt collutiōes ex decocto foliorum oleæ, aut myrti albæ. Facit & amurca, & marrubij succus, aut lētis decoctū. Aut fæx uini dulcis cum melle illita. Sūmè facit ad depascētes, fæniculi radicis ustæ cinis. Porro ex colore ipso facilè licebit colligere qui nam humores ipsas aphthas pduxerint. Rubicundiores siquidem, sanguinem præcellere indicant: flauiores, amaram bilem: albescētes, pituitosum humorem: quemadmodum nigrescentes, melancholicum succum. Qui autem hæc rite discreuerit, noueritq; facultates singulorum medicamentorum simplicium, is unicuiq; aphthæ speciei, proprium sciet administrare remedium. Expendet autē simul ipsas naturas corporum. Fortioribus quippe corporibus fortiora medicamenta adhibenda sunt: debilioribus imbecilliora. Ego porro infantibus qui adhuc à nutricibus alūtur, lentem cum modico pane, & medulla cerui, aut uituli exhibeo. Admisceo etiam cibus nonnihil ex astringentibus fructibus. Quādoq; etiam de lactuca, seride, solano, & portulaca coniicio aliquid, si aphtha sit inflammata. Quòd si cibum assumere nequeant, nutricē eius modi uictu alo, utq; concoquat rectè, prospicio. Veruntamen etiam infantes illino, si quidem subrubras uidero aphthas, in principio quidem, ijs quæ moderatissimè astringunt, & frigefaciūt: deinde uerò, eis quæ citra mordacitatē discutiunt. Si uerò sufflauas uidero, iisdem utor, sed magis refrigerātibus. At si pituitosiores, astringentibus: ut si nigrescentes, discussioris generosioribus. Cæterum in maioribus pueris, eiusdem generis facultatibus pharmacorum utor, auctis tantum ipsorum uiribus: quemadmodum etiam in perfectis & duris corporibus, singulis relatis facultatibus fortissimis utor. Suffecit autem mihi in his per omnia mihi usus cum uino astringente, quod tum intendit, tum

Aphtharū causas ex colore dignoscendi ratio.

Fortiora corpora ualidioribus egent medicamentis: ut imbecilliora mitioribus.

Aphtharū quæ infestant infantes, curatio.



remittit uim suam, prout magis aut minus uinum fuerit astringens: & prout crassius aut liquidius efficitur pharmacum ex misyos ac uini mistura. Quòd si fORDIDA appareat aphtha, misy cum uino mulso tero. lis uerò qui fortiora q̃ misy, medicamenta postulant, ærugo similiter dissoluta, est utilis. Commodum est etiam pharmacum ad hanc rem, chalcitis oleo trita. Atq; hæc quidem efficaciora. Moderata uerò, & maximè ad incipientes affectus, omphacium cum uino, & ænomete: similiter etiam rhus. In pueris sufficit rosarū flos, & ipsæ etiam rosæ siccæ. In summa uerò, moderatæ aphthæ, maximè in corpibus teneris, moderatis phar macis opus habet: fortes uerò, & maximè in duris corporibus, curantur à ualidioribus. Fortia pharmaca intelligo, tum quæ astringunt uehementer: tū quæ etiam mordicant: sicuti moderata, quæ prorsus sunt mordacitatis expertia, nonnihilq; astringunt. Porro oleū per se, infestissimū est aphthæ affectui: ueluti etiā chalcitis: quandoquidem alterum quidem humectat, & sordes gignit: mordet autem uehemēter chalcitis.

Aphthæ moderate moderata medicamenta desyderant: ut maligniores, fortiora.

Aphthis fit optimum medicamen ex chalcithide & oleo moderate commixtis. Sarcoticū optimum fit ex cerato & ærugine.

Verū moderata mistura ipsorum, optimum pharmacum efficit. Nā quemadmodum ex cerato & ærugine incarnās effici pharmacum solet, tametsi ambo per se sint contraria carnigignende: eadem ratione ex oleo & chalcithide aptum medicamentum conficitur.



## GALENI PERGAMENI,

DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM, SE-

cundum partes, Liber. VII.

De affectionibus contingentibus circa  
respirationis organa.

ASPERAE ARTERIAE Pharmacoma, mos est appellare arteriaca. Vocant enim arteriam asperam, uiam illam quæ ducit à larynge ad pulmones, ex chartilaginosis corpusculis, bronchis dictis, cõflatam: unde etiam

Arteriaca pharmacoma quæ dicuntur.

Aspera arteria ex quibus consistet particulis,

tota arteria, interdum dicitur bronchos. Vestit autem ipsam intrinsecus quædam crassa mēbrana, quam ob crassitudinem nonnulli tunicam nominant. Scripserunt porrò ueteres multa & diuersa medicamenta ad affectus organorum respirationis: ad uocem quæ tum interceptam, tum raucam. Etenim ubi instrumenta uocis ab humiditate uehementius atque tenacius impacta, fuerint imbuta, uox intercipitur: quum uerò moderatius humecta sunt, oboritur raucedo. Organa uocis quum dico, intellige arteriam, & laryngem, & pharyngem, siue epiglottida. Qui igitur ex uehementi clamore uocem amplius oblæsam habet, iis similis quædam affectio contingit in illa tunica asperæ arteriæ interna, ei quæ manibus, cruribusque, & musculis, ubi plurimum laborarunt. Cæterum curationis genus euariat. Siquidem crura & manus confricare per oleum licet: quum per cutem in adiacētes musculos penetrare ipsius possit facultas. Iuxta asperam uerò arteriam chartilagines post cutē sitæ, prohibent in subiectam pelliculā transitum facultatis unguentorum mollientium. Itaque auxiliorum materia congruentium respirationis organis,

Vox quādo intercipitur.

Raucedo quādo gignatur.

Vocis organa quæ.



Respiratiōis or-  
ganis male af-  
fectis remedia  
unde petenda  
sint.

Tunica eadem  
uestiri gulam,  
pharyngem, la-  
ryngem, & in-  
terna asperę ar-  
terię.

hypoglottides  
ex quibus con-  
sistunt.

Hypoglottidi-  
bus quomodo  
sit utendum.

Extergētia ad  
uocis puritatē  
facientia, quę  
sint.

Voci aut impe-  
ditę, aut rauę,  
ob inflāmatas  
affectiones cir-  
ca laryngē, aut  
asperam arte-  
riam obortas,  
qualis uicē &  
medicinę ra-  
tio conueniat.

quum ab alijs petenda est, tum etiam à balneis dul-  
cium aquarū, cibis q; & lenibus, & laxantibus. Si qua  
uerò aspredo sentiatur, cibis utēdum est, \* qui diutius  
hæreant partibus quę cum loco affectio commercium  
habent. Est enim una, eademq; sibi continua & cohæ-  
rens tunica, quę pharyngem, laryngem, gulā, & in-  
terna ipsius asperę arterię uestit, obducitq;. Quare ci-  
bi congruentes tunc erunt, qui ex lacte, amylo, alica,  
ouis, & libis dulciarijs constant. Si uerò per hæc non  
curetur affectio ipsa, inuēta sunt à medicis pharmaca  
sub lingua tenenda, ob idq; hypoglottides appellata:  
quę eadem facultate cum arteriacis uocatis prædita,  
ex uino Theræo, gummi, tragacantha, & glycyrrhiza  
constantur: quę laxigant quidem, reprimuntq; om-  
nes asperitates: quicquid uerò reliqui est, ex inflamma-  
tione, concoquunt, & cito persanant. Qui autem phar-  
macum linguę subdet, patiens sit laboris oportet, ut  
ipsum paulatim liquefcens, in laryngem excipiat, re-  
nitens interim tussī, si qua excitari uideatur. Impossi-  
bile tamen est, ut hi claram uocem elidant, citra usum  
pharmacorum absq; acrimonia extergentium: qualia  
sunt faba fresa elixa, ptisana, ac semē lini torrefactum.  
His magis detergūt resina terebinthina, thusq;, ac de-  
spumatū mel, & amygdalę amarę: quęadmodum  
istis rursus fortiora sunt farina erui, semen homini, ra-  
dix iridis, panacisq;. Cæterum his omnibus uina mol-  
lia, & passum Creticum, & Theræum, & Scybelites,  
& sapa, & decoctum caricarum, conueniūt. Est autem  
ab affectionis principio, usq; ad finem eiusdem, paula-  
tim progrediendum à leuissimis tum cibis, tum me-  
dicamentis, ad ea quę discutiant detergātq; uehemen-  
tius. Igitur primi ordinis sunt tragacantha, gummi, sa-  
mius alter, amyllum, sorbitio ex alica & trago, lac, pa-  
nes dulciarij, oua sorbilia, sesama, & nuces pineę,  
quas strobilos uocant. Ab his autem deinceps est bu



tyrum, & glycyrrhizæ decoctum: id quod præstiterit ad sapam ex musto, uel ad Cretitum passum miscere, rursus q; coquere. Hæc itaq; in affectionibus inflammatis circa arteriam atq; laryngem ortis comoda in principio sunt: donec moderata inflammatio fiat: ac præ omnibus à uini potu hoc tempore abstinendum est. Quum uerò moderatior facta inflammatio fuerit, uinum dulce Theræum, aut Scybelite bibere licet: quo tempore etiã butyrum est aptum, et sorbitio ex amygdalis, necnon ex lacte & melle diutius coctis, amyloq; iniecto, aut filigine. Qua sanè uictus ratione inflammatio quidem ipsa sedatur: relinquitur tamē humiditas multa, ob quam impossibile est claram uocem proferri. Quare transire tunc conuenit ab his eduliis, ad omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam elixam, & prisanam, & brassicam, & porrum probè coctum. Similiter etiam pharmacorū usus idoneus est, quo tempore inflammatio aut aspredo præcellunt, eorum quæ detineantur sub lingua: post hæc magis detergentia & resiccantia exhibemus: idq; gradatim facimus, donec ad ea quæ acridinis non nihil sortiuntur, perueniamus. Deinceps igitur ex arteriacis quæ à ueteribus prodita sunt, eligens præstantiora, huic methodo adiciam: quæ quidem nec discernere, nec ijs probè uti poterit, qui in commentariis simplicium medicamentorum accuratè non fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho scriptis.

**T** Huris, myrrhæ, croci, sing. drach. j. scillæ, drach. ij. passi Cretici, sextar. iij. Scilla in passo coquitur, donec inspissetur passum: dein scilla abiecta, insperguntur reliqua: sitq; electon, hoc est delingibile pharmacum. Alia arteriaca confectio. Aloes sextantem: croci vnc. j. mastiches tantundem. Conficito. Soluit enim aluum, concoquitq; (croci ratione) ea, quæ iū gratia exhibetur. Alia leniens exasperata, conco-

Arteriaca, hoc est ad affectus organorum uocis & respirationis cōgruentia, pharmaca Andromachi.



quensq; & extergens. Thuris, succi glycyrrhizæ, sing.  
vnc. j. tragacanthæ, drach. vj. nardi, drach. j. myrrhæ,  
amomi, croci, sing. drach. iij. mellis Attici quod sit fa-  
ris. Conficito.

Tabidis arte-  
riacū optimū.

Alia arteriaca, optima ad tabidos,  
& omnes inueteratos pulmonis & thoracis affectus.  
Cinamomi, thuris, utriusq; vnc. j. succi glycyrrhizæ,  
myrrhæ, tragacanthæ, nardi Indicæ, amomi, singul.  
drach. iij. croci drach. j. Melle Attico excipito.

Hæmopteicis  
arteriaca con-  
fectio.

Alia ad arteriam affectam, ulcera pulmonis, puris &  
sanguinis reiectiones, fluxionesq; in thoracem, & ad  
ea quæ ægre educi possunt, uehementer efficax. Re-  
sinæ terebinthinæ, croci Cilicij, thuris, myrrhæ troglo-  
dyticæ, cinnamomi, amomi, nucis pinæ, glycyrrhizæ  
absq; medulla, asteris samij, chalbanij, costi, singul.  
drach. iij. nardi Syriacæ, drach. ij. S. cassiæ nigræ,  
drach. ij. tragacanthæ, palmularum Syriacarum car-  
nis, sing. drach. iij. Mellis Attici heminas. iij. Confici-  
ro. Hypoglottides, hoc est orbiculi sub lingua te-  
nendi, ad aspredines gutturis, interceptam uocem, &  
sanguinem reiectantes. Tragacanthæ drach. vj. gum-  
mi drach. v. thuris, drach. j. obol. j. myrrhæ drach. j.  
obol. ij. croci tantundem: succi glycyrrhizæ, drach. j.  
obol. iij. aut rad. drach. ij. S. piperis albi, grana. xxv.  
palmularum pinguium carnis, drach. iij. Tragacan-  
tham passo maceratam & tritam reliquis tritis com-  
mittito, singitoq; catapotia magnitudine fabæ.

Hydropi recē-  
ti optimū me-  
dicamen.

Arteriace delingibilis, ad tabescētes, purulentos, adq;  
hydropas incipientes, & tusses inueteratas congruens.  
Datur per diem & noctem cochlearij mensura. Succij  
scillæ, sext. iij. passi Cretici, sext. iij. Vini Falerni sext.  
vii. Mellis Attici sext. iij. myrrhæ trientem. croci, thu-  
ris, utriusq; sextantē. aristolochiæ oblongæ, minam. j.  
S. glycyrrhizæ, minam unam. radicis eryngij, sextan-  
tem. Cassiæ, nardi Celticæ, sing. vnc. j. xylobalfami,  
bessam. Lignosa illa confusa in uino macerato per  
triduum



triduum, dein ad lētum ignem ad tertias coquito, atq; ita exprimito, & retrimentis abiectis, passum, mel, & scillæ succum coniungo, & ad mellis crassitudinē coquito. Crocum uerò, thus, & myrrham, cum uino terito, atq; ubi optimè habuerit pharmacū, addito: postq; uerò fuerint modicè fusa, ab igne tollito, & reponito ad usum.

Alia arteriaca media medijs congruens arteriæ affectibus. Croci, uuc passæ exacinate, utriusq; drach. j. amygd. dul. drach. viij. myrrhæ, obol. iiij. tragacanthæ, drach. iiij. piperis albi ob. iiij. melle cocto excipiantur.

Critonis Arteriaca, ad uocem interceptam. Ficum & eryngium probè coquito, & ad decoctum ipsorum gummi addito, ut melle durior confectio fiat: exhibetoq; ad noctem.

Alia eiusdem, faciens ad affectus arteriæ, & ulcera tum auriū, tum etiā pudendi. Thuris, ob. iiij. myrrhæ drach. ij. passi cyathos. iiij.

Passum ad mellis spissitudinē coquito: dein myrrham & thus cum passo semicocto ablato, misceto. Facit etiam ad dysentericos & cœliacos. Rectissimè autem fecerit, qui artericas concoquentes atq; lenientes, in duplici uase coxerit, nempe uasculum quod coquendum pharmacum cōtinet, in aliud plenū aquæ feruentis imponens.

Confectio Critonis ex capitibus papaueris, diacodyō dicta, ad affectus organorum respirationis conducens. Capita papaueris agrestis octingenta. aquæ sextarios. lxxx. Coquito ad tertias, hoc est donec flaccida appareāt: atq; expressis addito mellis, lib. x. Si uerò uariā efficere uis, adde croci, myrrhæ, succi hypocisthidis, sing. drach. xij. thuris drach. vj. acaciæ drach. xij. Optima tamen est simplicissima.

De usu confectionis ex papaueris capitibus.

**V**Sus eius est in ijs qui somno opus habēt: quibus etiam ex opio confecta sæpe exhibere cogimur. Opus habēt maximè huiusmodi pharmacis ijs, quibus

Voci interceptæ arteriaca Critonis.

Viceribus auriū, pudendiq; medicamentū.

Coquenda esse arteriaca lenientia in duplici uase, & quomodo. Diacodyō Critonis.

Diacodyō, hoc est ex capitibus papaueris, confectū medicamentū, quibus conueniat.



tenuis fluxus à capite ad asperam arteriā destillat, non permittens dormire ob consequentem tussim. In talibus ego etiā ex sapa, hoc est hepsenate, siue musto cocto, quod etiam siraon uocant, pharmaci compositionem parare soleo. Quin & per passum aut Therēum Creticū melius est q̄ per mel cocturā fieri, ubi fluxus ualde tenuis extiterit. Mel siquidem fugiendū tunc est, quum tenues fluxiones augeat, facultate tenuandi pre-  
ditum. Admiscetur etiam huiusmodi pharmaco glycyrrhiza, ita ut simul cum ipso coquatur. Si uerò in pulmone consistat copia humoris delapsi à capite, confectio ex melle est præstantior. Datur commodior mensura duorum cochleariorum satis magnorum copia. Augebis autem & minues hanc copiam, respiciēs ad magnitudinem corporis cui exhibiturus es, necnon ætatem, anni tempus, atq; regionē. In omnibus enim his frigidioribus minimum dabis: calidioribus amplius. Arteriacæ ab Asclepiade scriptæ. Brassicæ succum melle coctum lingendum exhibe. Alia. Cremoris eryngij, in aqua cocti, heminas. ij. Cremoris caricarum similiter coctarum, tantūdem. His adde gummi subtilis simè dissoluti, drach. viij. coquito diligenter ad arteriacæ spissitudinem, & inde cubitum iturris ad cyathi mensuram lingendum dato. Alia. Chalbanī drach. vj. piperis drach. j. nitri tantūdē. mellis Attici cyathos. vj. Chalbanum & mel coquito, defataq; adijcito ceteris, utitorq;. Alia insignis. Croci, myrrhæ, succi glycyrrhizæ, thuris, calicæ, sing. drach. j. piperis grana. xxij. passi Cretici sext. iij. mellis Attici, cyathos. vj. utere. Hypoglossis Dioscoridæ. Croci, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, sing. drach. j. nuces pineas repurgatas, contusasq;, numero. lx. amygdalas mundas totidem. Excipiantur melle decocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua tenenda. Alia Mithridatis. Myrrhæ, croci, utriusq;

Mellis usum fugiendum esse, ubi tenuis fluxus a capite ad asperam arteriā destillat, recipiendū autem crassus. Diacodyō medicamine utendi modus.

Arteriacæ medicamenta ab Asclepiade relictia.

Hypoglossis, hoc est medicamē sub lingua tenendū Dioscoridæ.



drach. iij. nardi Indicæ, terebinthing, utriusq; drach. ij. thuris, cassie, cinnamomi, sing. drach. j. passi Cretici heminas. iij. Passum & terebinthinam ad perfectam compagem coquito, & cum siccis committito: indeq; ad nucis pontice magnitudinem sub lingua tenendum dato.

Hypoglottis  
Mitridatis.

Alia mirifice faciens ad affectiones thoracis. Farina fabaceæ tostæ, hem. j. iridis Illyricæ, quadrantem. nucum pinerarum tostorum, sextantem. pulegij aridi contusi, sesquidrachmam. seminis urticæ, drach. j. piperis, vnc. S. Mellis boni, sext. ij. Farinam cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini etiam tusi, tosti, & cribrati heminam unam in promptu habeto, cum ceterisq; adijcito.

Hypoglottides  
varia, multi-  
pulus.

Alia ad tussum & spiritus prolationem, ualde probè expurgans. Hyssopi, pulegij, utriusq; sextantem. iridis, sem. sinapis, nasturtij, anisi, piperis, sing. vnc. j. tusa & cribrata melle cocto excipito. Datur cochlearis boni mensura.

Confectio ex marrubio Platonis. Myrrhæ, styracis, opij, succi marrubij, chalbani, croci, equalis partes. Vtere melle cocto exceptis. Pharmacom Harmonia dictum ad destillationes, insuperabilemque defluxum conducens. Styracis, castorij, piperis, cardamomi, sing. drach. iij. opij, myrrhæ, sem. hyoscyami albi, sing. drach. iij. passo excepta in catapotia reducito, datoque; cicoris magnitudine ad somnum.

Marrubio con-  
stans medica-  
mentum.

Harmonia di-  
ctum medicame-  
ntum, defluxui ad  
pedes conferes.

Medicamen Andromachi, Ambrosia dictum, ad phthisicos & febres repetentes per circuitus. Nardi, croci, myrrhe, costi, cassie, cinnamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorij, chalbani, terebinthinæ, styracis, succi papaueris, seminis hyoscyami, sing. drach. j. tragacathæ, drach. vj. anisi, sem. lini. sing. drach. j. mellis quod sit satis. vini Phaleri heminam. Tragacantham uino sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle committito. Datur febrientibus sesquidrachma ex aqua mulsa: febre carentibus vncia dimidia cum melle & aceti cochleario uno, et uini Phaleri cyathis duo.

Ambrosia An-  
dromachi.

Febribus repe-  
tentibus per cir-  
cuitus Ambro-  
sia Androma-  
chi confert.



bus. Aliud ad omnem tusſim. Anifi drach. ij. coſti, obolos. iij. myrrhæ, caſtorij, chal bani, piperis albi, ſem. hyoſcyami, opij, ſucci glycyrrhi zæ, ſing. drach. j. paſſo excipito, redigitoq; in catapotia, ciceris magnitu dine. Aliud ad omnem tusſim, & fluxionem, & ab ſceſſus internos. Sagapeni, gentianæ, myrrhæ, opopa naciſ, piperis albi, ſing. drach. ij. baccarū lauri mund. drach. iij. trita, & aqua excepta, exhibeto ad Græcæ ma gnitudinem fabæ: iſchiadicis tamen paulo plus, ex uini diluti cyathis tribus.

## De reiectione ſanguinis.

Tuſſi omnige næ medicamē optimum.

Hæmoptico rum curatio.

Obtutatio ua ſorum a qui bus fiat.

Glutinatiorū uaforum a quibus fiat.

Renutritio ero ſorū, a quibus fiat.

Distributionis rōne miferi aſtringentibus medicamenta cōtraria diſpo ſitioni hæmo ptoicæ.

**I**N reiectione ſanguinis primum periculū eſt, ne imoderata eius uacuatio fiat. Vbi uerò ſuppreſſus eſt, curatio eius quidem, quæ ex reſeratione oſculi ali cuius uafiſ contigit, per obturationem fit oſculi dila tati: eius uerò quæ ex uafiſ ruptura, per conglutinatior nem eiufdem: quemadmodum eius quæ ex eroſione, p eroſorum renutritionem. Obtutatur igitur oſculum re ſeratum, per aſtringentia: cōglutinetur autem ruptum, per eadem, & quæcunq; iſſis in compoſitione miſcen tur, citra mordacitatem reſiccātia, & glutinoſum quid dam habentia, uelut eſt Lemnia terra, & Samius aſter. Renutritur corroſa per cibos boni ſucci, & pharma ca carnem gignētia. Igitur iuxta primam rationem, ex talibus pharma ca componuntur congruentia ad curan dam ſanguinis eiectionem: iuxta ſecundam uerò, in iſſis qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge re iectant ſanguinem, miſcentur predictis congruenti mē ſura calida & tenuium partium medicamenta, quæ in feſtiſſima ſunt tribus illis affectionibus dictis: miſcen tur inquam gratia distributionis, ut uidelicet aſtringen tibus medicamentis præparent, ac ueluti ſternant uiā. At quum ex locis circa ſtomachum, aut aluum, aut ali quod inteſtinum, ſanguis educitur, huiuſmodi pharma corum miſtura non eſt opus: infeſtiſſimum tamen hiſ



MED. SEC. LOCA. LIB. VII. 405

est id genus pharmacorum, q̄ in tantum refrigerat, ut affectum stupefaciat: quāuis & hæc misceantur medicamētis ad sanguinis reiectiones congruentibus: quū altiore somnum cōcilient, & cōmodissima sint ijs q̄ tusli lancinantur, sistētia nimirum sanguinem qui ad uas affectum deferitur: atq; hoc per suam frigiditatem. Atq; hi sanè sunt compositionis scopi.

Quæ An. dromacho ad sanguinis reiectionem scripta sunt.

Acaciæ drach. iij. rosarum siccarum, balauſtij, singul. drach. viij. gummi, drach. ij. tragacanthæ, drach. j. cum aqua pastillos facito, quorum singuli pendeant drach. mam unā. Dato ex aqua pluuiæ: habet enim uim astringendi.

Aliud sistens sanguinē. Croci Cilicij, myrrhæ, iridis, nardi Indicæ, thuris, acaciæ, sing. vnc. j. succi papaueris, costi, piperis, sing. vnc. S. rosarum siccarum trientem. Melle excipito. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

Aliud. Succi hypocisthidos, balauſtij, acaciæ, gallæ, cytinorum, sing. drach. xij. succi papaueris, drach. vj. croci tantūdem. Redigito in triobolares pastillos.

Aliud egregium Balauſtij, acaciæ, opij, myrrhæ, sing. drach. ij. tragacanthæ, succi hypocisthidos, florum rosarum, seminis hyoscyami, sing. drach. iij. thuris drach. iij. excipito succo polygoni.

Aliud ad hemoptoicos & dysentericos. Floris rosarū, opij, acaciæ, gummi, balauſtij, hypocisthidos, sing. quadrantem, gallæ vnc. j. seminis plantaginis, eiusdemq; succi, utriusq; sextantem. Lycij Indici, succi rosarum, utriusq; vnc. j. redigito in pastillos drachmales.

Quæ Asclepiades ad sanguis reiectiones scripserit. Radicis polygonij manipulum: rad. symphyti tantūdem. rhois rubri, acetabulum. aquæ sextarios. iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathum unum dato, cum gummi tenuissimè triti & dissoluti drachma una.

Aliud. Mororum rubrorum nondum maturorum lib. xvj. aquæ pluuiæ sextarios. xvj. coquito ad tertias

Stupefacientis  
medicamenta  
qua rōne phar-  
macis cōgruē-  
tibus ad san-  
guinis reiecta-  
tiōes, misceant  
Hæmoptoicis  
remedia ab An-  
dromacho scri-  
pta.  
Sanguinis reie-  
ctioni reme-  
dia.

Dysentericæ re-  
medium.

Hæmoptoicis  
remedia ab As-  
clepiade scri-  
pta.

CCcc iij



& expressum liquorem reponito. Idem licebit facere etiam de corni fructu. Aliud. Balaustrij, terræ Samiæ, corticis thuris, gummi; singulorum æquale pondus. Trita & cribrata exhibe cochlearis mensura in aquæ frigidæ cyatho uno. Aliud. Succo hypocisthidos, succi acaciæ, succi rhois syriaci, balaustrij, opij, gummi, sing. drach. iij. Vini myrtius, quod satis est.

*Pastillum ex succino confectio quos habent trochiscos de charabe appellant.*

Conficito, & unitor. Pastillus ex succino, hæmoptoicis, diuturnæ & recentius, phthificis, sanguinem reiicientibus, purulentis, cœliacis, dysentericis, et inflatis conferens. Psyllij mundi, drach. xl v. indis Illyricæ, mastiches, ramentorum succini, croci, sing. drach. xxx. opij, drach. xv. Psyllium in aquam calidam coniectum macerari finito. Vbi uero suo glutine & mucilagine ipsam aquam infecerit, liquorem exprimito, & cum eo pharmacum in pastillos cogito. Ex quibus obolos. iij. ad somnum dato. Sint autem aquæ sextarij terni.

*Pastillus ex corallio.*

Pastillus ex corallio. Corallij, terræ Samiæ, utriusque drach. viij. Balaustriorum, amyli, terræ Lemniæ, sing. drach. iij. sem hyoscyami albi, opij, hypocisthidis, sing. drach. ij. Excipe succo arnoglossæ, cogeque in pastillos, & exhibe.

*Anodyna Andromachi, ad affectus organorum respiratoris, aliasque internas dispositiones, congruentia.*

Confectiones sedantes dolorem, tabescentibus & sanguinem reiicientibus, interiorumque affectibus, comoda, ab Andromacho scriptæ. Radicis panacis, seminis dauci, castorii, sem. hyoscyami, opij, sing. drach. iij. Mellis quod sit satis. Dantur oboli quatuor, cum aquæ cyathis tribus. Alia sedans dolorem, ualens ad tormina, & dysenterias. Sem. apij, drach. ij. anisi drach. j. piperis albi, tantundem. myrrhæ castorii, utriusque obolos. iij. opij, croci, sing. obolos. iij. gentianæ drach. ij. Pastillos triobolares conficito, uarieque unitor. Alia iucunda appellata. Iridis Illyricæ, succini, croci, mastiches Chiæ, sing. drach. xxx. psyllij, drach. xl v. succi papaueris drach. xv. cum aqua pluuia



pastillos, quorum singuli pendeant drach. j. S. confici-  
ro, & exhibeto. Psyllium tñ per diem ac noctē aqua  
pluuiali macerato: dein coquito, & exprimō, cremo-  
remq; cum aliis miscero. Alia dolorem sedās, ad

omnes internos affectus & sanguinis reiectiones, un-  
decunq; erumpant. Facit & ad nephriticos & hepati-  
cos. Hanc ne prius dederis, q̄ mercedem accipias.

Cinnamomi, castie, utriusq; drach. ii. myrrhæ, piperis  
utriusq; chalbani, sing. drach. j. opii drach. ij. Trita cū  
melle pauco, in catapotia redigito, partim magnitudi-  
ne fabæ, partim quantitate araci. Dato iuxta cuiusq; ui-  
res cum aqua, aut pro iudicio tuo. Alia ad eadē,

Mysterium dicta. Croci, costi, castorii, asari, sem. hyo-  
scyami, opii, styracis, sing. drach. j. Excipito melle uti-  
torq;.

Anodyna ad easdem affectiones ab Ascle-  
piade scripta. Seminis cucumeris hortensis decortica-  
ti, drach. viij. amyli, drach. iij. sem. lini, sem. papa. alb.  
utriusq; drach. ij. Tusa & cribrata excipe tragacanthæ  
cremore, & i drachmales pastillos redige. Dant oboli.  
iij. nō febriētibus qdē, ex uino: febriētibus uerō, ex suc-  
co rhois. Faciūt ad fluxiōes thoracis. Cōfectio Pan-

chrestus dicta, hoc est multi usus, ad tussim antiquam,  
purulētos, orthopnoicos, tabescētes, ad oēsq; inflatiōes.  
Pellit secūdas & menses, medeturq; uesicæ affectibus.  
Terebinthinæ, drach. viij. styracis drach. vj. myrrhæ,  
drach. v. croci, iridis, chalbani, sing. drach. iij. Seminis  
hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti,  
opopanacis, singul. drach. ij. piperis, spumæ nitri, utri-  
usq; drach. j. passo excipito. Antidotus Aristarchi

admiranda, conferens ad affectiones prædictas, reni-  
tensq; uenenis, exterminansq; febres repeītes per cir-  
cuitus, una hora ante exacerbationem exhibita. Cinna-  
momi, costi, chalbani, castorii, succi papaueris p peris  
nigri & longi, styracis, sing. vnc. j. mellis sextariū unū.  
Arida teruntur & cribrantur. Chalbanum coquitur cū

CCcc iiij

Anodyna ad  
internos affe-  
ctus ab Ascle-  
piade scripta.

Panchrestos  
Asclepiadis,  
multi usus ad  
uarios interno-  
rum affectus.

Antidotus Ari-  
starchi admi-  
randa.



melle: excolatis uerò reliqua adduntur, reponunturq; in uitream pyxidem, argenteam'ue. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum aquæ mulsæ cyathis duobus, instillatis digito guttis aceti nouem.

## De orthopncea.

*Asthmatici cur  
sic dicantur.*

*Orthopnoici  
cur sic dicant.*

*Orthopnæ  
causa.  
Purulenti.*

*Peripneumo-  
nici.*

*Respirationis  
organorum an-  
gustia quæ effi-  
cere possint.*

*Potum esse de-  
bere modicum  
iis quibus or-  
gana respirati-  
onis ab aliquo  
tumore angus-  
tantur, contra  
multum illis, q-  
bus bronchia  
a crassis & ui-  
scidis succis ob-  
struantur.*

**Q**ui citra febrem dense respirant, ob symptoma id dicuntur Asthmatici, hoc est anhelosi. Eosdem etiam ob symptoma aliud orthopnoicos appellant, quod thorace recto spirare cogantur, metu suffocationis. Minus est autem quod hi inspirant, quam pro usu respirationis, etiam thorax ipsis plurimum dilateat. Ex quo manifestum fit, internam capacitatem coarctatam ipsis esse preter naturam, id quod ægri etiam haud obscuro sensu perceptant. Fit etenim & purulentis locorum coarctatio, ob collectum inter thoracem & pulmones humorem. Fit etiam peripneumonici, ob pulmonis inflammationem. Restant autem adhuc affectiones duæ quæ angustiam locorum faciunt in uis per quas aer inspiratur: quum aut humorum crassorum & uiscidorum multitudo pulmonis bronchiis fuerit impacta: aut tumor abscessui similis in ipso constiterit. Cæterum curatio ambarum affectionum aliquid commune habet: aliquid priuatum, & alteri tantum proprium. Commune quidem utrisque est, ut absumatur redundantia humoris affectiones gignentis: proprium, affectioni quidem uiscidorum humorum, ut per attenuantia & exiergentia pharmaca dissipentur: ei uerò quæ propter tumorem accidit, ut per attenuantia & exiccantia eadem communi sumptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in profundo abscessibus communis existit. Vini itaque potus ambarum competit. Omnis autem potus modicus sit in iis qui alicubi abscessum habent: multus contra, in illis, quibus uiscidis & crassis succis sunt obturata bronchia. Quippe pharmaca eiusmodi repurgantia humores, rufes necessario excitant: non uerò facile per sputum reijcitur, quod expurgatum est, nimirum ob crassitudinem.



Quapropter humectatione multa opus habet quo effe-  
ratur facile.

Quæ scripserit Asclepiades ad dys-  
pnoicos. Scillæ crudæ succum exprimito, eiq; parem  
Attici mellis mensuram addito, & ad prunas admo-  
tas coquito. Dato inde & ante & post cibum mystri  
mensuram.

Aliud. Origani drach. viij. comæ thy-  
mi, iridis Illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi  
torrefacti, sing. tantundem. Cribrata melle cocto ex-  
cipito. Dato rucis ponticæ magnitudinem.

Aliud.  
Vuæ passæ rhodiæ, exacinatæ, acetabulum. fœnigræ-  
ci loti tantundem. aquæ pluuiæ sextarium. j. Coquito  
donec dissoluantur, & liquorem excolatum reponito.

Ex hoc præbeto assiduè, & iuxta singulas irritationes,  
cyathi mensuram calfactam.

Aliud. Anisi, sulfuris  
uiui, utriusq; quadrantem. ammoniaci thymiamatis,  
castorij, melanthij, sing. drach. iij. aqua diluta in cata-  
potia cogito, unumq; in aceti mulsi cyathis tribus pro-  
pinato.

Hæc omnia sunt ab Asclepiade scripta illis, qui  
bus pulmonis bronchia crassæ & uiscidis humoribus  
sunt referta. At uerò abscessus qui attenuatibus & re-  
siccantibus opus habent, maximè gaudēt aromatum  
facultatibus, quæ & tenuium partium sunt, & resicca-  
toriæ, præter hoc quod calfaciunt.

Porrò ijs qui pro-  
priè orthopnoici & asthmatici nominantur, pharma-  
ca conueniunt secantia citra calfactionem: ob idq; iu-  
uantur maximè ab scillitico aceto: necnon ab scilla, &

ab aceto mulso eodemq; scillitico. Quemadmodum  
autem in hac affectione uehementer cauendum est, ne  
calfaciamus, propterea qd uiscidi & crassi succi nō mo-  
dò non iuuantur, sed offenduntur etiam usu calfacien-  
tium: eodem modo quæ ualde refrigerant sunt omni-  
no uitanda.

Quæ pharmaca scripserit ad eiusmo-  
di affectiones Andromachus.

Ad dyspnœam,  
Sulfuris uiui drach. j. Sem. rutæ syluestris, tantundem:  
aristolochiæ, absynthij, ammoniaci thymiamatis, ab

Dyspnœæ re-  
media ab As-  
clepiade scri-  
pta.

Scillinum ace-  
tum orthopnoi-  
cis asthmati-  
cisq; maxime  
opitulatur.

Dyspnœæ re-  
media Andro-  
machi.



410 GAL. PERG. DE COM.

rotoni, sing. drach. iij. trita cum aceto in catapotia fabarum instar redigito. Dato mane tria, & uesp̄i totidem.

Aliud. Ammoniaci thymiamatis, abrotoni, singu. drach. ij. sulfuris uiui, drach. j. formato cum aqua pastillos, & cum aquæ mulsæ cyathis tribus præbeto.

Aliud. Scillæ, sulfuris uiui, bituminis, sing. partē unam. Dantur obol. iij. in aceto mulso.

GALENI PERGA-  
MENI, DE COMPOSITIO-  
NE MEDICAMENTORVM SE-  
cundum partes, Liber. VIII.

De pharmacis congruentibus ori uentriculi.

Instrumenta duo nobis fuisse data a natura, necessaria ad uitæ actiones, experientiā nempe, & rōnem: quorum semper ad perfectā disciplinam alterum indiget altero.



ORRO' DIFFICILLIMUM est, ad ueritatem eos reuocare, qui sese alicui sectę seruiliter addixerunt. At qui prudentes sunt, ueritatis q̄ ardenti desyderio tenētur, ij (ut spero) custodient ea quæ à natura nobis ueluti iudicandi instrumenta con-

Inflamationes oris uentriculi et hepatis, cum relaxatibus miscellam astringentium pharmacorum desyderant.

cessa sunt, ad actionum uitæ cognitionem, Experientiam nempe & Rationem: quorum semper alterum, ad perfectam disciplinam, altero indiget. Etenim falsæ opiniones animos hominum præoccupantes, non solum surdos, sed adeò etiam cæcos efficiunt, ut uidere nequeant, quæ ab alijs conspicuè cernuntur. Proinde fit, ut complures Empirici, nec pauci etiam ex ijs qui sese Methodicos iactant, per pharmaca relaxantia curantes inflammationes oris uentriculi & hepatis (quæ miscellam astringentium desyderant) ægros omneis ad unum occidant, atq; in exitum adigant. Quippe nisi facultatem quæ firmitudinem addat, in illarū par-



tium affectibus ad relaxantia permisceas, uita in discrimen uocatur. Igitur astringentia omnia quæ ad illarum partium affectus, partim emplastris atq; ceratis mista adhibentur extrinsecus: partim intus uorantur: impresentiarum ea ipse indicabo, auspicatus ab ijs quæ conueniunt inflammationibus: quæ maximè in ipsis ægri periclitentur. CERATVM ergo quo assidue utor, ex aloë, mastiche, cera pontica, & unguento nardino constat. Cæterum ad unciam unam mensuralem nardino olei, hyenæ quidem. viij. æstate autem. vij. cera partes induuntur. Liquatis igitur in duplici uase, refrigeratisq; & derafis, addes aloës & mastiches, reductorum in pollinem, utriusq; drachmam. j. & quandoq; plus: sic tamen ut ad sesquidrachmam non progrediaris. Quod si ampliori opus sit astrictione, nimirum tanta imbecillitate existente, ut uentriculus retinere cibos non possit, addes drachmam unam omphacij: id quod primo iniici debet in cerati præparatione. Similiter licebit absynthij succum miscere: quandoq; etiam ambo: sicuti & tertium hypocisthidis: & quartum cenanthes. Quin & rhois succum non raro admiscui. Cerati tamen augenda est copia, iuxta proportionem numeri aliorum pharmacorum. At inueteratis atq; induratis inflammationibus, magis uaria conueniunt pharmaca, & quæ ex aromatis quippiam habeant, non nihilq; etiam emollientium atq; digerentium sortiantur: cuiusmodi est quod ex meliloto conficitur, congruës omnibus iuxta præcordia inflammatis. Porro os uentriculi, nonnulli hodie communiter stomachum nominant: quam partem olim frequentius cardiam, hoc est cor, appellabant: unde uox cardialgia est deducta, quæ minimè quidem cordis, sed oris uentriculi dolorem & mordicationem significat. Fiunt quippe in ipso tunc morsus, tum inexplibilis fames, ut interdum etiam nauseosæ dispositiones: in quibus omnibus communis qui-

Ceratum Galeni ad inflammationes oris uentriculi & hepatis maxime congruum.

Os uentriculi, quod olim cor nocebant, nonnulli hodie stomachum uocant. Cardialgia significat morsum oris uentriculi.



412 GAL. PERG. DE COM.

Affectus inter-  
ni ut cognoscatur  
opus est cō-  
iecturis.

Intemperantię  
particularę sūt  
octo, quas per  
contrarias qua-  
litates reduce-  
re ad medicri-  
tatem oportet.

dam astringentium pharmacorum usus inuentus est : admista autem sunt plerisque ipsorum calfacientia simul & resiccantia. Verum affectus in profundo sitos, ut cognoscamus, maximis utamur cōiecturis est opus: ob idq; utilissima Medicę artis pars est, quę cognitio- nem ipsorum indicat. Quum igitur octo sint in singulis partibus intemperantię corporis: atq; hæ omnes aut secundum solas nudas qualitates gignantur: aut accedente alicuius humoris complexu: certè earum singulę per contrarias qualitates sunt reducendę ad mediocritatem. Quia uerò plurimę intemperaturę hominibus ex redūdantia humorum, magis q̃ ex inopia fiunt, pharmaca resiccantia plerosq; magis iuuant. Quum autem resiccantia ipsa, partim quidem astringant, cogendo astringendoq; substantiam eorum quę contingunt: partim uerò discutiant, & in hoc substantiam eorum dissoluant: ob hoc ipsum sanè plures sunt qui astringentibus indigent. Verum si humida intemperies coeat cum frigiditate, læduntur qui per sola astringentia curantur, quę frigidę facultatis existunt. Quare meritò plurima pharmaca per experientiā inuenta, ex miscellanea materia constituuntur, astringente uidelicet atq; calfaciente: quorum omnium differentiam cognosces, si simplicium pharmacorum facultates memoria tenueris.

Confectiones stomachicę Andromachi.

Stomachicę cō-  
fectiones An-  
dromachi.

Hierę picę ua-  
rię compositio-  
nes.

Aloes lotę &  
illotę facultas.

**H**iera ad stomachicos. Floris iunci odorati, xylo- balsami, mastiches, croci, nardi Indicę, asari, cinnamomi, sing. drach. vj. aloes lotę, drach. C. Simul trita repone, præbeq; ieiunis cochlearia. ij. Sunt tamen qui ad aloes drach. C. singulorum aliorum, octo drachmas adijciant. Non desunt qui absq; flore iunci odorati conficiant. Porro ad uentris subductionem illota aloes est aptior: elota autem multum de medicamentosa ui amittit: quam etiam febricitantibus dare aliq;



possit, si febris sit ualde mitis. Infestissima autem est aloe, uel lota, ijs qui citra uitiosos succos in temperie affliguntur calida & sicca. Proximam ab his cladē percipiunt, qui siccam intemperiem habent, uel frigiditatem etiam implicitam: & in uniuersum, qui ex sola qualitate particulam aliquā affectam ac lāsam possident. Etenim intemperantiæ in humoribus consistentes, pharmacis ipsas euacuantibus egent; quæ uerò absq; his infestant, penitus commigrant in tabem, ob pharmacum huius ex aloe constantis exhibitionem. At ubi uitiosa humiditas perrigat uentriculi tunicas, hiera ex aloe est utilis. Omnino autē sic affectus plus aut minus adfunt nausæ quædam symptomata. Iam uerò purgatio quam aloe molitur, imbecillior est, q̄ ut uniuersum corpus purgare queat. Additur illi mastiche, ut uires eius refringat, uentriculo existens etiam grata, & odorata. Cinnamomum uerò, quum ob easdem causas, tum etiam ut partium suarum tenuitate aperire uentris meatus possit, extergereq; atq; attenuare si quid uiscosum aut crassum in humoribus insit. Crassos quippe succos ob purgatorię facultatis imbecillitatē aloe trahere non potest. Quapropter biliosarum uentris dispositionum optimum pharmacum est. Adhæc cinnamomū uim obtinet alteratricem uitiosorum humorum, in id quod naturæ modo respondet. Scire itaq; licet, eas dispositiones quæ à prauis succis circa uentrē stomachumq; oboriuntur, maximè per medicamenta ex aloe iuari; mirum autem in modum lædi, ab edulij, potionibus, & pharmacis astringentibus. Contra uerò, ubi humores non qualitate sed copia os uentriculi affligerint, utilissimus astringētium est usus, nimirum languida tunc existente ipsa particula affecta, instar laxatorum articulorum, quorum etiam per astringentia affectio corrigitur. Porro polychresta, siue multi usus medicamenta apparantur, quum unum habere uiginti

Aloe eā infestissima in, qui citra uitiosos succos in temperie affliguntur calida & sicca.

Aloes uis, laborantes intemperie citra redundantiā humorum, deducit in tabem.

Hiera p̄tra quibus utilis.

Hiera ex aloe est infirmior, q̄ ut totū corpus purgare possit.

Mastiche uentriculo grata. Cinnamomi facultas.

Aloe biliosarum dispositionum uentris optimū est medicamē.

Astringentia esculentia potulentiaq; maxime lædunt dispositiones uentriculi à prauis succis obortas: iuuunt autē eas, quæ a multis, non prauis trahunt ortum.



Polychresta,  
hoc ē multi ul<sup>9</sup>  
medicamento,  
relinqui, ab iis  
quæ ad singu-  
las affectiones  
parantur.  
Hiera Antipa-  
tri faciens ad  
stomachicos.  
Stomachica  
Galli,

Ventriculi tu-  
nicis humores  
crassi altius im-  
bibiri, qualia  
medicamenta  
desyderent.

Ventriculi fri-  
gidam affectio-  
nem significat,  
prorsus nihil si-  
tire.

Stomachica  
ab Asclepiade  
scripta.

Confectio ex  
fructib<sup>9</sup> Ascle-  
piadis, subuer-  
sioni ventricu-  
li, coeliacis &  
dysentericis fa-  
ciens.

affectionibus cōgruum malumus, q̄ tot numero alia:  
quā tamen ad singulas affectiones unum aliquod de-  
stinatum eo quod ad plures paratum est, melius exi-  
stat.

Ad stomatichos hiera Anupatri. Aloes ele-  
ctæ, drach. iij. mastiches, drach. ij. asari drach. iij. rosa-  
rum siccarum, iunci odorati, mei, phu, cassiæ, sing. se-  
munciam. Trisis utitor:

Stomachica Galli, affe-  
ctionibus quæ calferi & siccare postulant, utilis.

Corticis radice feniculi, lib. S. aceti acris, sextarium  
unum. S. aloes quadrantem. Mellis Attici, lib. j. Ra-  
dices lotas ad triduum aceto macerato: deinde coqui-  
to, atq; ubi coctæ fuerint expressas proscito, & affuso  
ad acetum melle, simul coquito. Dein aloen inspergi-  
to, & cochlearia. iij. cum aqua dato. Etenim ubi per  
profundum ventriculi, hoc est altius, copiosa, sed non  
prava, fuerit defixa humiditas crassa simul & niscida,  
opus est mistura pharmaci attenuatorij, perrosuiq;  
quale est tum acetum, tum oxymeli. Si uerò nec talis  
sit humiditas, nec altius imbibita, sola ad curationem  
astringētia suffecerint. Est autem sufficiens signū fri-  
gidæ affectionis uētriculi, si æger se nō sitire p̄cipiat.

Asclepiadis stomachica, ad roborandum uen-  
triculum, exprimendasq; illius aduen-  
titias humiditates congruentia.

**A**D stomachi subuersiones. Nucleorum mali pu-  
nici tusorum succi, sextarios. iij. succi mentæ, se-  
xtar. j. mellis Attici tātundē. Coquito in fictili uase,  
assiduè agitando, & ubi densata fuerint, ab igne ab-  
lata reponito: porrigitoq; mystum unum, aut. ij. an-  
te cibum. Confectio ex fructibus, ad stomachi  
subuersionem, coeliacos, & dysentericos faciens. Ma-  
la cotonea numero. x. sorba numero. L. mespila toti-  
dem. Rhois rubri sextarium unū. Aquæ congios. viij.  
fructus tusos & in aquā coniectos, diligenter coqui-  
to: & ubi dissoluti fuerint, liquorē exprimito, ac rur-



sus coquito. Quum uero tertia pars liquoris superfue-  
rit, addito mellis Attici, lib. iij. & ad prunas assidue  
agitando coquito, ac spissata reponito.

Catapota ad subuersionem uentriculi. Rosarum recentium  
defectis unguibus, drach. viij. sem. papaueris albi,  
drach. iij. sem. hyoscyami, drach. ij. aloes, obolos. iij.  
asari tantundem. Cum aqua diluta in pilulas redigi-  
to, præbetoq; ciceris magnitudinem.

Ad ardo-  
rem stomachi catapotium restinguens sitim. Seminis  
satiui cucumeris drach. viij. sem. portulacæ tantundem.  
tragacanthæ, drach. iij. Tragacantham ouorum cru-  
dorum recentium candido dissolutam, probe tritis re-  
liquis addito, & ex eis mistis fingito catapotia, quo-  
rum assicatorum in umbra, sub lingua unum tenen-  
dum dato. Hæc Asclepiades. In uniuersum autem fu-  
gienda ea pharmaca sunt in uentriculi affectibus, quæ  
chalcanthon, mandragoram uel, aut alia id genus re-  
cipiunt.

Ad uoluulosas stomachi subuersiones  
pastillus Amazonum ab Asclepiade scriptus. Semi-  
nis apij, & anisi, utriusq; drach. vj. absinthij drach.  
iij. piperis, myrrhæ, opij, castorij, sing. drach. ij. cinna-  
momi drach. vj. cum aqua pastillos fingito, & sum-  
mum drachmam unam dato, stomachicis cum pro-  
tropi diluti cyathis. iij. cholericis & uomētib; cibum,  
cum frigida: cœliacis & dysentericis cum baccarum  
myrti decocto: spleneticis, cum hydromelitos cyathis  
tribus. Ego uero quod myrrha aliquid medicamen-  
tosum cōtineat, sine illa maioris securitatis gratia hoc  
pharmacum præparare consueui, piperis quātitatem  
adaugens.

Porrò per eiusmodi uoluulosas dispo-  
sitiones, aliquando stercus per uomitum redditur: ubi  
uidelicet particulæ affectæ, à ferolis medicatisq; hu-  
moribus affliguntur magnopere. Quod si etiam im-  
becilliores sint, geminatur malum. Erit itaq; in ijs cu-  
rationis scopus, ut ad affectas partes odorata, admo-

Catapota ad  
subuersionē uē-  
triculi.

Catapota ad  
ardorem uen-  
triculi cōferen-  
tia, si sub lingua  
teneantur.

Ventriculo af-  
fecto fugienda  
eē ea pharma-  
ca, quæ chalcā-  
thon, mandra-  
goramue reci-  
piunt.

Pastilli Ama-  
zonum, ad uol-  
uulosas uentri-  
culi dispositio-  
nes.

Myrrhæ usum  
nō esse admo-  
dum tutum.

Voluulosas uē-  
tris dispositio-  
nes esse podo-  
rata curandas.



Graueolentia  
subuertunt sto-  
machum.  
Absynthii fa-  
cultas.

Cinamomi fa-  
cultas.

Cassia licet ut  
pro cinnamo-  
mo.

Pharmacum  
unū multis af-  
fectibus opti-  
mum, reperiri  
non posse.  
Conuulsio fit  
ob repletionē  
simul & inani-  
tionem.  
Singultus a q-  
bus fiat causis.

Singultui quæ  
medeantur.

ueamus, cuiusmodi sunt anisum, apium, daucus, cu-  
minum, & seseli. Nam quemadmodum graueolentia  
omnia stomachum subuere solent, sic odorata cor-  
roborare. At absynthium miscetur in prescripto phar-  
maco, q̄ habeat uim extergendi, repurgandi, & subdu-  
cendi uitiosos stomachi humores: quodq; cōstringat,  
& denset, roburq; affectæ particlæ addat. Cinnamo-  
mum autem foetidis omnibus, putrilaginosiq; humo-  
ribus aduersatur. Cæterum si cinnamomum nō ad-  
sit, licebit cassiam pro illo assumere. Alia Stoma-  
chica Asclepiadis compositio, utilis ardorem sentien-  
tibus, & ad intensos singultus, & stomachi uoluulo-  
sas dispositiones. Costi, spicæ nardi, chrysobalano-  
rum, rosarum uiridiū, mastiches, sing. drach. iij. aloes,  
asari, utriusq; drach. ij. opij, drach. j. succo psyllij exci-  
pito, atq; ad pastillorum formam reducito: obolosq;  
tres exhibeto. Dictum mihi tamen iam est, impos-  
sibile esse ut inueniamus phatmacum, ad affectiones  
multas optimum: multoq; præstantius esse, quod sin-  
gulis earum destinatur. Porro Hippocrates fieri con-  
uulsionem prodidit ex repletionē simul & euacuatio-  
ne: quemadmodum etiam singultum. Quanquam  
hic aliquando excitari citra plenitudinem aut inani-  
tionem solet, ubi uenter ab acribus, serosis, me-  
dicamētosisq; humoribus mordicatur: quos ubi quis  
uomitu eiecerit, singultu subito liberat. Multi etiam,  
deuorato pharmaco dia trion pepereon, si uinum insu-  
per bibant, omnino singultiunt. Similiter ex cibo in-  
mordacem qualitatem corrupto, nonnulli singultiunt,  
confestimq; à uomitu liberantur: ut alij ex rigore oris  
uentriculi, corripuntur singultu. Verum pueros ma-  
ximè singultire contingit, tum ob alimenti corruptio-  
nem in uentre: tum ob partis frigiditatem. In uniuersum  
autem, uomitus est sufficiens medela eorum, qui  
ob copiam, aut mordicationem singultiunt: ut calidi-  
tas, eorum



tas, eorum qui ob frigiditatem. Ex medicamentis que pharmacum illud constituunt, opium, rosæ, & psyllij succus refrigerant. Spica nardi & chrysobalanus, digerunt & corroborant. Asarum, per urinas deducit uiriosos succos. Aloe prauos humores purgat. Crocus concoquit & partes corroborat. Costus calfacit abunde, astringitq; mediocriter. Stupefacientibus miscetur calfacientia, ut eorum malignitatem corrigant, eisq; sint instar uehiculi. Quippe uiuentium corpora mortificationi simile quid perpetiuntur ab eorū medicaminum usu, quæ ex opio, hyoscyamo, & mandragora constant: ita ut infestantes causas non sentiant. Quate multi qui talibus assidue utuntur, particulas ad immedicabilem frigiditatem perducunt.

Descripsit etiam Asclepiades Hieræ compositionem, in hoc ab Andromacho disfidens, q̄ ille q̄dem aloes drac. C. ac reliquorum sing. indiderit drac. vj. hic autem octo drachmas scripserit: floremq; iunci odorati omiserit, quem alijs miscuit Andromachus: quodq; nō xylobalsamo (ut Andromachus) sed pro illo sit carpobalsamo usus. Confert autem huiusce modi pharmacū ijs qui ob uiriosos humores, & precipuè biliosos, tardè concoquunt. Siquidem quibus bilis altius tunicas uentriculi infestat, n̄ præstantius pharmacum non inuenient. Cuius moderata exhibitio ad quatuor usq; drachmas extenditur. Similiter auxiliatur uiscerum iam concoctis inflammationibus. Rectè autem hoc pharmacum tardè cōcoquentibus, aut bilē uomentibus propingitur ex aquæ cyathis quaternis: ut ex aqua mulsa, ad uiscerum incli- nantes inflamationes: ac deniq; ex uino mulso, dum aut urinas ciere, aut promouere menses est animus. Aduerte autem nos appellare drachmam, quod Romani uocant denarium. Stomachicum dictum

Aster inexpugnabile, ab Asclepiade prodictū, sedans

Tomus. IIII.

DD d d

Crocus concoquit, & partes corroborat.

Stupefacientibus misceri calfacientia ut eorum malignitatem corrigant, eorumq; uires deducant.

Hiera quibus conueniat.

Hieræ moderata exhibitio ad quatuor drachmas extenditur.

Drachma & denarius Romanus est idē. Stomachicum Asclepiadis dictum Aster inexpugnabile



dolorem, inducens somnum, ac uarios affectus fanans. Myrrhæ, styracis, nardi Indicæ, casia fistulæ, terræ Lemniæ, corticis mandragoræ, piperis, singul. drach. iij. Croci, succi papaueris, sing. drach. vj. seminis dauci Cretici, anisi, fœselis, seminis apij, sing. drachmas. viij. Myrrha, styrax, & opiū, uino dissoluntur odorato, & teruntur: arida uerò cribrata miscentur, subigunturq; atq; in pastillos coguntur, quorum singuli drachmam dimidiam pendeant.

Quæ scripserit Archigenes ad affectus uentriculi.

Ventriculi affectibus congruentia medicamentis ab Archigene prodita.

**V**Bi ructus acidus editur, coriandrum cochlearij mensura edendum ante reliquum cibum dato: insuperq; merum bibendum. Ad exolutum uentriculum absq; febris, mentæ ramulum contritum bibendum dato. Aut ænanthen similiter tritā cum nardo Indica bibendam dato. Aut marrubij succum cum melle: & ubi paululum quieuerint, uinum cū polenta exhibeto. Aut Chia mastiches cochlearium ex aqua frigida dato. Aut glaciē ieiunis quotidie porrigito. Dolores oris uentriculi lenit, ac maximè ijs quibus tristitia aut desperatio accedunt, lac asininum, aut muliebre, aut bubulum, silicibus incoctis, potatum. Si unā cum humectatione uentriculi etiam inflammatio adsit, ænanthen cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato rosaceo, parum resinæ ustæ habente, imponito. Quibus autem ob atram bilem, quam gignūt, stomachus inflatione tentatur, spongas aceto acerrimo calido imbutas ad stomachum ipsum imponito. Quod si tensio adhuc perseueret, alumen liquidum cum atramento sutorio trito, melle exceptum imponas. Aut hæc & aloë pari portione mista, & myrteo cerato excepta. Aut armentariæ bouis stercus aridum uino incoctum. Aut polij fasciculum coquito, & bibendū dato. Aut calaminthæ decoctū per noctem sub dio expositum,



modico melle & piperis drachma admittis, porrigito.

Soluit autem dolores cuminum apiumq; tosta, si modica portione, cum aqua bibantur.

Aut aloes obolos.ij cum uino mulso, aut uino, aut aqua, bibendos dato.

Aut abrotoni & thymi, utriusq; obolos duos, ex uino prebe bibendos.

Ligaturas in super extremorum fortiter adhibe, & circa ipsum sto

machnum cucurbitulis & fomētis uarijs utere. Quod

si uehemens sit distentio, etiā uenæ sectio efficax erit

auxilium, & alui solutio per glandem supposititiā.

Porrō eos qui ex ingenti fame linquuntur animo

reuocabimus odoramentis aceti aut pulegij, aut malis, aut piris.

Excitantur etiam ad carnem suillam assatam, & ad omnia quæ multum alunt, præsertim ea

quæ nidorosum odorem exhibent. Instaurabis autem ipsos n̄s quæ confertim uires reficere possunt: cu

iūsmodi sunt oua sorbilia, bulbi, cochleæ.

At singultientibus rutam cum uino dato, aut nitrum in

aqua mulsa, aut opium, aut castoriū, aut abrotonum, aut aristolochiam.

Medicamen ex cydoniorum succo, sanans mediocres oris uentriculi affectus.

Succi cydoniorum malorū, Sextarios.ij, Mellis Attici, tantundem. aceti sesquiseptarium: uel sextarium

unum. Zingiberis quadrantem. piperis albi, vnc.j.

Arida insperges, ubi malorum succus cum melle & aceto coctus ad mellis crassitudinem fuerit.

Quæ pharmaca Asclepiades scripserit ad affectus oris uentriculi.

**E**Mplastrum ad subuersiones oris uentriculi, doloresq; atq; etiam inflammationes.

Oenanthes, drach.vj. croci, myrrhæ, floris rosarum, meliloti, mastiches, aloes, corticis mandragoræ, singul. drach.iiij.

Carnis palmularum, quadrantem. Omnia cerato ex rosaceo confecto excipito, admoueroq;.

Aliud Nicerati, coeliacis, dysentericisq; admodum genero

DDdd ij

Cucurbitulas  
ad mouēdas es-  
se dolenti uen-  
triculo inuenit  
Archigenes.

Deliquium ani-  
mi patientes ex  
fame insigni,  
quemodo sint  
reuocandi.

Singultientibus  
quæ opitulen-  
tur.

Dia cydonio-  
rum medicamen.

Oris uentriculi  
affectib⁹ phar-  
maca ab Ascle-  
piade scripta.



sum. Oenāthes vuc. ij. rosarum siccarum, mastiches, aloes, gallarum omphacitidum, aluminis rotūdi, acacia, sing. vnc. j. ceræ lib. j. picis brutiæ quadrantem olei myrtei, lib. j. Arida committito liquidis.

Aliud ad eadem insigne. Oenanthes, omphacij, galleg omphacitidis, aluminis scissi, acacia, cyrinorum mali punici, balauſtij, mastiches, sing. vnc. j. Vinī myrtitis, quantum satis est his subigendis. Carnis phœnicoba lanorum, sexuncem, exceptis lentiscino cerato utitor.

*Stomachica  
medicamenta  
debent habere  
astringentia uim  
præpollentem,  
Hepatica me-  
dicamenta mi-  
ſta eſſe debent  
ex astringenti-  
bus & relaxan-  
tibus.*

*Malagma diſ-  
ſoluens hepatis  
lienisq; duri-  
ties.*

*Nili crocerum.*

*Malagma Hie-  
raticon ex me-  
liloto, uiscerum  
doloribus ac-  
commodatum.*

*Malagma po-  
lyarchion.*

Etenim in his, q̄ sint stomachica, meritò astringentia uis dominatur. At in medicamentis hepaticis relaxantia misceri astringentibus debent: quemadmodum sit in his quæ iam subdam, etiam ab Asclepiade prodita.

Malagma Nilo inscriptum, faciens ad præcordiorum dolores, dissoluensq; omnē duritiem, spleneticis atq; hepaticis maximè salutare. Ceræ, ammoniaci thymiamatis, olei cyprini, sing. lib. j. croci semunciam, aceti quod sit satis. Ammoniacum dissoluito: deinde arida adiungito.

Aliud Nili crocerum prædictis affectionibus accommodatum, faciens etiam ad erysipelata.

Ammoniaci thymiamatis, ceræ, rosacei, sing. lib. j. croci, vnc. j. aceti quod sit satis. Conficito.

Malagma ex meliloto, Hieraticon dictum, ad uiscerum dolores accommodatum.

Nardi Celticæ, cyperi, myrrhæ, sing. drach. x. cardamomi drach. viij. meliloti drach. xl. croci, amomi, utriusq; drach. viij. cypheos sacrificulorum, drac. xvj. ammoniaci thymiamatis, drach. xl. resinæ terebinthinæ, drach. viij. ceræ minam unam. olei Cyprini, drac. cxx. Vinī odorati Italici, heminam. j. præpara, & utere.

Malagma Polyarchiō, peripneumonicis, stomachicis, lienosis, hydropicisq; maximè ex usu, faciens etiam ad affectiones circa uescicam aut uterum, ad omnemq; neruorum per consensum affectionem. Cere, terebinthing, bdellij, ammoniaci thymiamatis, carda-



momī, cyperi, sing. minam unam. meliloti, a momī, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinamomī, sing. drach. xxv. olei cyprini heminam. j. Vini Italici quod sit satis. Conficito & utitor. Malagma An dromachi ex meliloto. Nardi Celticæ, cyperi, iridis Illyricæ, myrrhæ, sing. drach. viij. croci drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis drach. L. terebinthinæ tantundem. ceræ drach. C. Cyprini hemina dimidium. Aceti quod sit satis.

De hepatis affectibus & facultatibus.

**P**Leriq; Idiotæ quemadmodū stomachicas, sic hepaticas affectiones, uocant complures dispositiones iecinoris, tametsi maximè inter se contrarias: hoc est sub eodem genere plurimum inter se distantes. Non peccauerit autem quispiā dicens, propemodum omnia contraria eidem esse generi subdita. Cæterū contrariorum notio contingit, ubi plurimum inter se distant. Atqui plurimum in quoq; genere utrinq; distant à medijs extrema. Porro ipsius imbecillitatis iecinoris licebit nobis unicā assignare dispōnem, ceu causam: nēpe intemperie: quæ quidem quum in octo intēperātias distribuatur, rursus non malè dixerō, intemperiem ipsam non unā, sed octo dispositiones existere. Adhæc iuxta aliam sectionem duæ intemperie rum differentiæ fiunt: ac iuxta aliam tres: dum uidelicet aut secundum qualitates tantū alterantur partes affectæ: aut accedente etiā humorum affluxu, qui aut spatia tantū occupent in particulis affectis contenta: aut etiam substantiam ipsarum imbuant. Igitur circa uentrem & intestina quidem, una in singulis cavitates est, quæ possit uitiosam humiditatem suscipere: circa hepar autem, tot numero sunt, quot habentur arteriæ & uenæ. Etenim quum hæ omnes oscula angusta possideant, qua parte huius uisceris sima, cum gibbis coeūt, obstructions ab illis uitiosis suc-

Malagma An dromachi ex meliloto.

Contraria esse quæ sub eodē genere plurimum inter se disident. Extrema plurimū utrinq; distant a medijs in quoq; genere. Hepatis imbecillitatis intemperies est causa. Intēperies est octuplex.

Hepatis obstructions fieri quæ parte eius sima cū gibbis coeunt.

DDdd iij



cis aliquando oboriuntur, breui in frigidis intemperaturis: ut temporis progressu in calidis: ad quas tandem obturationes putrefactio cōsequitur. Quum autem hoc uiscus tot facultates sortiatur, quot actionum species, contingit sæpe unam ipsarum præcipuè laxandi, sæpe duas & tres, atq; omnes quatuor simul. Est itaq; actio ipsius una quidem, ad se cibū & alimentum attrahere: altera uerò, ambire, cōtinereq; donec alterās ipsum, suis ipsius illud partem efficiat. Atq; hæc sanè dicitur alteratrix facultas, inter alias principalissima existens, & cui ferè primæ debentur partes.

*Hepatis facultates.*

*Alteratrix facultas hepatis est inter alias principalissima.*

*Facultates quatuor naturales inesse cunctis, q̄ diu uiuunt, corporis partibus.*

*Hepatis lāguide ab intestinis trahentis symptomata.*

*Mutationē ciborum per cruditates in peregrinam qualitatem, esse aliarum omnium deterrimam.*

*Hepate imperfecte mutante chylum in sanguinem, qualia excrementa excreantur.*

Quæ uerò iuxta hanc alterationem remanent excrementa, ea per excretricem facultatem exterminantur. Ostensum autem est has quatuor facultates, uniuersis, quādiu uiuunt, inesse corporis partibus. Vocatur autem alteratio ipsa, donec alimentum parti que nutritur assimiletur, concoctio. Vbi uerò iam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex uentre & intestinis alimentum trahere non potest, liquida per sedem, & nondum exquisitè excocta excernuntur: simulq; cruda, si etiam cum hoc uiscere nentriculus imbecillus existat. Si uerò traxerit quidem alimentum hepar ex uentre simul & intestinis: in sanguinem autem ipsum nequeat conuertere, ob facultatis languorem: quemadmodum in uentre multiformis corruptio contingit, eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepar. Est enim peior transmutatio in peregrinam qualitatem, iuxta cruditatem facta: moderatior uerò, in qua alimentum diu propriam naturam retinet, nullam dum alterationem indeptum. Atqui & tertia præter has, species frustratæ concoctionis existit, ubi semiconcoctum alimentum relinquitur. Ac per hanc sanè dispositionem, quæ ab hepate dericiuntur, referunt prorsus aquam, in qua uictimæ recens maceratae carnes ablutæ fuerint. Au-



cto autem affectu, nihil tale amplius excernitur, sed multiformes aliæ qualitates, consistētēq; expurgantur, ueluti à uentre dum cruditate laborat. Calida igitur intēperies si uiscus affligat, colliquationes accidunt, primum quidem, humorum: dein carnis ipsius hepatis: deīciturq; bilis crassa, graueolens, atq; admodum colorata, quemadmodum contingit in pestilentibus febribus. Si uerò frigida intemperies præpoleat, neq; assidue excretionēs, neq; multæ fiunt: durat tamen affectus diutius, & per aliquos dies profuit ipsis uenter confertim magis: neq; fœtor excrementorum similis est ijs quæ ex calore sunt liquefacta: neq; color aut consistentia similis: uerum minus graueolentia ab his excernuntur, speciem putrefacti sanguinis, non colliquatæ carnis, habentia. Aliquando uerò id quod deīcitur, nigrum sanguinem refert: diligenter tamen cōsyderanti, nec sanguis niger est, nec grumus, sed ueluti limus quidam sanguinis crassus, qui propè ad atram bilem accedat: in summa, plures, ægrēq; iudicabiles colores circa huiusmodi affectionem cernuntur in alui excrementis.

SCOPVS igitur curationis in huiuscemodi affectibus, communis quidem sit iuxta contrarietatem intemperantiæ: peculiaris autem unicuiq; per cuiusq; contrarietatem. In uniuersum autem, affectio hepatica peculiariter appellata, ueluti etiam coeliaca, stomachicaq; citra tumoris præter naturam circa ipsas partes ortum, contingit. Si quidem quum citra manifestum aliquod in uiscere malum, in actionibus proprijs languescit hepar, tunc ægrum uocāt hepaticum.

Quæ pharmaca ad hepaticos ab Andromacho sint conscripta.

**A**ntidotus cyphoides, ad hepaticos et omnia thoracis uitia. Vuæ passæ carnis, drach. xxv. croci drach. j. calami drach. ij. S. bdellij, tantundem, cassiæ

DDdd iiiij

Hepatis intemperie calidam quæ sequantur symptomata.

Hepatis frigida intemperie signa & symptomata.

Hepatis intemperantias, per contrarias sanandas esse. Hepatici proprie dicuntur, quibus citra malum insigne, hepar in functionibus proprijs languescit.

Hepaticis remedia cōgruentia ab Andromacho scripta.



sesquidrachmam. cinnamomi obolos. iij. spicæ nardi  
 drach. iij. floris iunci odorati, drach. ij. S. myrrhæ, tere-  
 binthinæ, sing. drach. iij. rametorum aspalathi, drac. ij.  
 mellis drach. xvj. uini quod sit satis. Conficito. Et  
 enim cinnamomum omnes putrilaginosas, uirulen-  
 tasq; corrigit facultates: quæadmodum cassia, & post  
 hanc omne aromatum genus. Crocus astringens &  
 cõcoctorium pharmacum, etiam putrefactiones cor-  
 rigit. Vua passa astringit quidem quantum requirit af-  
 fectum uiscus: habetq; uim aliquam concoquendi cru-  
 dos humores, & coercendi maligna, existens etiam  
 secundum totam substantiam iecori familiaris.  
 Quippe ad intemperantias uiscerum ea pharmaca op-  
 tima sunt, quæ præter quàm quòd intemperiem cor-  
 rigunt, etiam alimentum largiuntur.  
 Quo nomine uinum conuenientissimum est, citra in-  
 flammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut intē-  
 periem calidam, laborantibus. Nam & nutrit, & con-  
 coquit, & roborat, & putrefactioni aduersatur, & si in-  
 temperies ab humiditate & frigiditate profisciscatur,  
 eam citra omnem molestiam, atq; tutò, per sanat. Ea-  
 dem est & mellis facultas, præter q̃: quòd non conden-  
 sat substantiã contacti corporis: sed pro hoc uim exter-  
 gendi, & aperiendi, & puros reddendi meatus, uri-  
 namq; ciendi, nō parua sanè auxilia, possidet. At bdel-  
 lium sufficienter emollit, concoquitq; necnon mode-  
 ratè discutit. Consimilem fermè uim terebinthina for-  
 titur, supra hoc quòd angustos meatus extergit, expur-  
 gatq; quibus auxiliis uiscus curandum indiget. Siqui-  
 dem obstructio meatuum solet putrefactiones effice-  
 re. Nōnulli autem huiuscemodi pharmacis opium, aut  
 hyoscyamum, aut aliud quippiam refrigerantium mi-  
 scendo, ad calidas intemperies utilia medicamēta effi-  
 ciunt: quanq̃ ex hepaticis pharmacis nullū esse, debet  
 uehementer refrigerans. Alia ad hepaticos &

Putrefactiones  
que corrigan.

Vua passa fa-  
cultates.

Viscerū intem-  
perantiis ea ef-  
se optia phar-  
maca, quæ nō  
modo intēpe-  
riem corrigūt,  
sed etiam ali-  
mētum largiun-  
tur.

Vini facultas.

Mellis facul-  
tas.

Bdellium,

Terebinthinæ  
uires.

Hepaticū phar-  
macū nullum  
esse debet ue-  
hementer refri-  
gerans.



MED. SEC. LOCA LIB. VIII. 425

Ictericos. Amygdalarum amararum, drach. ij. anisi, absynthii, cumini, seminis apii, sing. drach. j. cornu cerui, obolos. iij. Trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eisq; unū mane ac uesperī, cum uino mulso dato.

Hepatica Athanasia, ad nephriticos & ictericos, copiose sudorem promouens. Croci, drach. ij. nardi tantundem. cinnamomi, cassiæ myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. j. Melle Attico excipito: datur fabæ Ægyptiæ magnitudine: febricitantibus ex aqua mulsa.

Potio ad hepaticos, spleneticos, nephriticos, hydropicos, stomachicosq; Auxiliatur etiā molestiis ex partu, & cōuulsis. Prodest & cōualescentibus: nec non ad humores uitiosos, ictericos, tusientes, pleuriticos, nec non ad letalia uenena, & ferarum ictus. Nardi Indicæ, costi, utriusq; drach. ij. cassiæ, croci, utriusq; drach. j. piperis albi, obol. v. seminis apii, drach. j. obolos. iij. iridis Illyricæ, tantundem. acori drach. j. obol. j. opobalsami, drach. j. succi ari masculi, drach. iij. uuæ passæ exacinate, drach. vj. Terito cum passo: aut melle excipito: ac drachmam unam cum uino dulci dato, aut cum aquæ mulsæ cyathis. iij. Nullum tamen horū medicamentorū calidis intēperaturis cōuenit, sed aut humidis, aut frigidis, aut ex utrisq; compositis.

Confectiones hepaticæ ab Asclepiade proditæ. Succo cichorii cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus, & mellis Attici cochleari uno, porrigito.

Aut filicis, aut feridis succi cyathum unū cum aquæ mulsæ cyathis tribus dato. Porro cichorium & feris ex genere cibariorum existunt. Facultas autem ipsorū subfrigida & subamara est, moderateq; astringēs: quarum qualitarum ratione, calidis hepatis intemperatiis summè conueniunt. Nam ultra hoc q̄ moderate refrigant, uisceri firmitudinem addunt. Sed nec frigidas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absq; astrictione aut amaritute

Ictericis optimū medicamē

Athanasia hepatica, nephriticis ictericisq; conueniens, copiose sudorē promouens.

Potio hydropi, aliisq; interaneorum affectionibus summe utilis.

Hepaticæ compositiones ab Asclepiade scriptæ.

Cichorium. Scribitur.



dine possident, facere solēt. Iam, ob miscellam mellis, humores per urinas eliciunt. Quare si siccata & tusa quis potioni inspergat, itidem iuuant. Ad uisceris autē expurgationem, apertionemq; meatuum, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, filix optimum pharmacum est, amaram qualitatem habēs prædominantem.

Hepaticum catapotion.

Catapotion hepatices. Radicis chamæpityos, drach. viij. rad. cichorii, drach. iiij. contunde, & excipe melle cocto, præbeq; nucis ponticæ magnitudinem: & aquæ calidæ cyathos. iiij. insuper bibendos dato.

Hepaticus pastillus.

Pastillus hepaticus. Anisi, sem. apii, asari, amygd. amar. mund. absynthii, sing. drach. iiij. macerata ex aqua in pastillos redigito: exhibetoq; drachmā. j. cum uini diluti cyathis. iiij. febrientibus tamen cum hydromelite. Eclegma hepaticum Paulini: auxiliatur confestim. Chamæpityos siccæ, lib. j. myrhæ, vnc. j. passi protropi, sextarios. iiij. Chamæpityn & uinum dulce coquito ad tertias. Postea liquorem exprimito, eiq; mellis Attici libram dimidiā adicito, ac rursus coquito. Dein uerò myrrham addito assidue agitando: quæ ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mystum propinato.

Hepaticum eclegma.

Adhuc cochlearum trium carnem probè tritam, & cum tribus uini nigri cyathis calfactam porrigito. Hec enim iuxta totam substantiam sunt efficacia: non secundum unam aut alteram qualitatem. Similiter & lupini hepatis drachma una læuigata cum uino aliquo dulci, exhibitaq; manifestè hepaticis auxiliatur.

Hepar lupi auxiliatur hepaticis.

Diureticum medicamen.

Confectio ciens urinas. Facit ad induratas hepatis affectiones, ad spleneticos, & ægrè se à morbo recuperantes: nec non ad hydropicos. In uniuersum, probum colorē conciliat. Croci, nardi, casfiæ, sing. drach. ij. costi, floris iunci odorati, cinnamomi, myrrhæ stactæ, sing. drac. j. mellis cocti, drach. xxvj. datur fabæ Ægypticæ magnitudine, cum uini mulsi cyathis. iiij. Alia, eadem



commoda præstans, ad aliasq; internas affectiones, citra tussum, conducens. Rad. gentiane, chamæpityos, marrubii, seminis petroselini, fellis ursi, sinapis, sem. cucumeris, scolopendrii, panacis, rubrici sinopice, rubig, seminis brassicæ, aristolochie longæ, piperis albi, spice nardi, costi, sem. eruce, eryngii, baccarum iuniperi, sem. fraxini, chamædryos, dictamni Cretici, seminis cestri, sem. dauci, sing. vnc. j. mellis Attici quod sit satis. Conficito. Datur nucis pontice magnitudo, ex passi Cretici cyathis duobus.

Hæc Asclepiades ad indurata viscera. Miscenda tamen in hisce affectibus sunt cum discutientibus etiam mollientia pharmaca, quæ præparentur indurata corpora, aptaq; prædictis medicamentis excipiendis efficiant. Siquidem citra præmollitionem diffunduntur quodammodo ea ipsa corpora, & euestigio manifestam imminutionem habent: sed quod reliquum ex affectu est, ubi exiccatum improbè fuerit, immedicabile permanet. Ceterum quum hepatis corpus sit consistentia humidum, moderatis emollientibus eget.

Quæ Archigenes scripserit ad hepaticos.

Unguenti nardini cochlearia. iij. quotidie bibenda dato, & maximè in induratis. Aut aristolochie obolos. iij. ex aqua quidem, febrientibus; febre autem carentibus, ex uino porrigito. Aut sel ursinum in uase leniter feruefacito, & in sole assiccatum, atq; ex eo hepaticis cochleare unum dato.

In magna duritia abrotoni succum quæ crassissimum da bibendum. Aut acori obolum unum: panacis tantundem, propinato ex aqua.

Aut spice nardi decoctum assidue exhibeto. Cataplasma hepaticum sit ex malis cotoneis cum farina hordeacea, & fœnogreco concoctis. Aut ex semine lini trito cum polenta uino incocta. Aut ex capparis radice in aceto mulso percocta. Aut ex farina hordeacea cum ficibus. Aut ex palmularum carne tusa,

mistaq; pari rosacei cerati portione. Malaguna

Discutientibus medicamentis quæ ad indurata viscera propinantur, cum miscenda emollientia.

Hepatis corpus moderatis emollientibus eget.

Hepatica medicamenta ab Archigene scripta.

Hepatica cataplasinata ex quibus conficitur.



Hepatica ma-  
lagmata.

Andromachi ad hepaticos. Ammoniaci thymiamatis drach. cxliiij. bdellii drach. xxiiij. aceti heminas. iij. Cyprini heminam. j. Conficito. Malagma Apolophanis. Cere drach. lxxx. ammoniaci thymiamatis, tantundem. Terebinthine drach. xl. manne thuris, tantundem. Cum irino contundito.

**G A L E N I P E R G A**  
**M E N I D E C O M P O S I T I O N E**  
**M E D I C A M E N T O R U M S E C U N**  
**dum Loca, Liber Nonus.**

De Ictericis.

Ictericæ per  
morberum iu-  
dicationes or-  
ta, curatio.



Ictericia ex ob-  
structione orta  
absq; febre per-  
manet, quod  
non contingit  
illis quæ ab in-  
flammatione du-  
cit originem.

IVNT etiam icterici, ratione optime iudicationis in febribus, prouente nimirum ad cutem bilioso humore: ac facile sanè hi curantur balneis porabilium aquarum, & olei discussorii affricu, omniumq; rarefacientium cutem: quale est anethinum oleum, chamæmelinum, atq; cicinum. Post hæc etiam unguenta faciunt, gleucinum, & comaginum: dein irinum atq; amaracinum. Verùm alias confectiones priuatim ictericas appellatas, ne putes ad huiusmodi ictericos conuenire, sed ad eos, qui uasorum iuxta hepar obstructione laborant: necnon ad illos qui ex inflammatione icterici fiunt. Cæterùm qui in regium morbum ex obstructione inciderunt, absq; febre permanet. Qui uerò ex inflammatione, omnino febricitant. Quæcunq; igitur admodum medicamentosa existunt, iidemq; facultate calida, febrientes magnopere lædunt. Talia sunt gentiana, struthion, helenium, costus, aristolochia, polium, centaurea. Conueniunt autem ictericis ex inflamma



to hepate, quæcunq; sanant inflammationes: quemad-  
modum etiam iis qui ex obturatione, omnia quæ stre-  
nuè extergent, etiam si medicamentosam substantiã,  
calidamq; facultatem sortiantur. Si uerò obstructio si-  
mul & inflammatio coeant, laxantibus simulq; exter-  
gentibus opus erit.

Ad ictericos absq; febre, me-  
dicamen Andromachi. In colocynthidis calicem ui-  
num fundito, calfacitoq; & bibendum dato. Subducit  
enim aluum.

Aliud. Adianti obolos. iij. nardi obo-  
los. ij. absynthii drach. j. myrrhe obolos. iii. Passo ex-  
cipito, instarq; auellane nucis ex aquæ cyathis duobus  
porrigito.

Asclepiadis remedia ad Ictericos. Ci-  
chorii succi cyathos. vi. Febrientibus per se dato: febre  
uerò carentibus, cum uini cyathis tribus.

Aliud.  
Anchuse tenuis simè tritæ cochlearia. ij. cum aqua po-  
tabili exhibe.

Aliud Nicerati urinam ciens. Cice-  
rum siccorum sextarium. j. roris marini, manipulum.  
aquæ sextarios. vi. fœniculi manipulum. j. rad. aspara-  
gorum palustrium, manipulum. j. Decoctum ex cola-  
tum porrigito assiduè, febrientibus quidem, simplici-  
ter: febre autem carētib; ex uino diluto.

Aliud.  
Asari, absynthii, utriusq; drach. viii. seminis anisi, fœ-  
niculi, apii, amygdalarum amararum repurgatarum,  
sing. drach. iij. Aqua subigito, atq; pastillos formato:  
ex quibus drachmam. j. cum uini mulsi cyathis tribus  
non febrientibus exhibeto.

Errhinon trahens bi-  
lem per nares. Nasturtii & roris marini uiridium suc-  
cum, aut elaterium cum lacte muliebri tritum, infun-  
dito naribus, atq; attrahere iubeto.

Archigenis  
remedia ad ictericos. Chelidoniæ herbæ succum cū  
uino aut aqua mulsa propina. Vel adianti, uel rubiæ  
radicis obolos. iij. cum aqua mulsa exhibe.

Aut fel-  
lis ursini cyathum bibendum dato. Aut stercoris ca-  
nini albi sextantem, cum mellis quadrāte ad triduum  
bibendum dato.

Aut adianti, & mentæ, & rubig

Ictericis quæ  
medicamenta  
conueniant.

Ictericorum re-  
media varia, a  
diuersis con-  
scripta.

Errhinon tra-  
hens bilem per  
nares.



parem mensuram in aqua seruefacito, & heminā inde bibendam exhibeto, diutius ad solem insolato, sitienti; & anheloso, quo post acceptum potum exudet. Quippe statim transmutat colorem.

De splenis affectibus.

*Partes singulas familiare sibi alimentum trahere.*

*Lienem ali a sanguinis sedimento.*

*Lien cur induretur facile.*

*Lieni affectio qualia conueniant medicamenta.*

*Liene trahente languide, sæculetus sanguis per uniuersum corpus digeritur.*

*Lieni cur amara, quibus astringentia sint mista medicamenta conueniant.*

**Q**Uum autem omnes corporis partes familiare sibi sibiipsis ex uenis humorem trahant, lien certè id quod ueluti fœx sanguinis est, ex qua gignitur atra bilis, ad sui alimoniam asciscit: unde hoc uiscus minimo negotio contrahere sibi scirrhum est natum, sanguine nimirum in uenis ipsius obturato, et ob crassitudinem nec excerni, nec discuti facile potente. Attenuantibus igitur opus habet pharmacis, citra manifestam caliditatem, ne impactus in ipso succus impingatur uehementius. Quo uerò actiones ipsius cōseruentur, ex austeris aliquid eis admiscetur: quale etiam astringentium genus existit. Porro quum uniuersæ particulæ, propriæ incolumitatis gratia, certas quasdam facultates possideant, attractricem uidelicet familiarium, ac tum alienorum expultricem, tum assimilatricem eorū quæ sibi attraxerunt, aliquibus ipsarum insuper inest, ut ex accidenti sint uniuerso corpori ex usu. Ex horum itaq; est genere lien, qui ex hepate ad se ueluti limum sanguinis trahit, quæadmodum fellis uesica bilem: atq; renes urinam. Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinem ad se attrahere sit minimè potens, per uniuersum corpus uitiosus humor dispergitur. Ob id itaq; naturale ipsius firmitudinem custodire oportet, quo conueniēs sibi alimentum alliciat, per quam actionē uniuerso corpori ad humorum bonitatem conducit, & excrementa genita in ipso demittere in uentrem potest, ut unā cū excrementis alui excernantur. Igitur hac ratione ipsi ualde amara medicamenta exhibemus: quibus miscemus etiam ex austeris nonnulla; sicuti & alia quædam, ceu materiam congruentem ad unguentorum & cataplas-



MED. SECT. LOCA. LIB. IX. 431

matum cōpositionem; cuiusmodi sunt cera, resina, pix,  
& bitumen. Nam primaria ratione acetū & oxymeli,  
uisceri cōmoda existūt, utpote secare et attenuare cras-  
sos humores ualentia, circa calfactionem. Deinceps  
itaq; eorum pharmacorum mentionem faciam, quę lie-  
ni indurato auxiliantur.

Pharmaca potabilia ab  
Andromacho ad spleneticos cōscripta. Porio Antipa-  
tri. Carnis myrobalani, drach. iiii. scolopēdre, drach. vi.  
cort. rad. cap. costi, sing. drach. iiii. chamēdryos, drach.  
vi. polii drach. ii. rad. cotyledonis, drach. ij. corymbo-  
rum hederæ nigræ, grana. xxv. ammoniaci thymiamatis,  
drach. iiii. sem. hyperici drach. ij. chalbani tantū dē.  
sem. periclymeni drach. j. aut rad. drach. iiii. cardamo-  
mi nigri sesquidrach. succi scillæ, drach. xvi. Dantur  
oboli duo in aceto mulso.

Aliud stomachicum,  
splenicumq; Myrthæ, nardi Indicę, cort. rad. cap-  
paris, radicis panacis, rad. peucedani, dictamni, cort.  
rad. periclymeni, sing. drach. iiii. costi, drach. v. polii  
drach. ij. rubiæ drach. iiii. S. ammoniaci thymiamatis,  
drach. iiii. S. iridis tantūdem. Excipito aceto mulso, da-  
toq; obolos duos cum oxymelite.

Pharmaca po-  
tabilia ab Asclepiade ad splenem conscripta. Cyno-  
glossi manipulum cum uini cyathis. iiii. terito, & expres-  
sum liquorem ante cibum bibendū dato. Colligere ta-  
men oportet herbam sinistra manu ante solis exortum.

Aliud. Trixaginis manipulū cum uini sextario uno  
coquito, & expressum liquorē reponito: atq; ex eo cya-  
thos. ij. ante cibum dato. Catapotium splenicū.

Myricæ fructum tusum & cribratum chalbano exci-  
pe, in catapotiaq; redige, quæ exhibebis pro uiribus.

Pastillus splenicus. Fructus ericæ drach. iiii. pi-  
peris albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis,  
sing. drach. ij. arida tunduntur & cribrantur. Ammo-  
niacum dissoluitur aceto scillitico, & aridis additum in  
pastillos cogitur, quorum singuli pendeāt drachmam.

Lieni congru-  
entia pharma-  
ca, Androma-  
cho scripta.

Lieni pharma-  
ca ab Asclepia-  
de scripta.



Daturq; drach. j. ex oxymelitis cyathis. iii.

**Lieni epithe-  
mata, cataplas-  
mataq; ab As-  
clepiade scri-  
pta.**

Epithemata & emplastrata eiusdem Asclepiadae. Fo-  
liorum tenerimorum sabuci arboris, lib. iii. aloes, lib. j.  
cum aceto subigito, & linteolo infarcta admoueto.

Vel. Cerae, resinae pinus, & frictae, sing. lib. ij. arsenici,  
aluminis scissi, calcis uiuae, sing. sextantem. acetj, olei,  
utriusq; cyathos. viii. conficito & admoueto.

Malagma Antiochidis, ad spleneticos, hydropicos, is-  
chiadicos, arthriticosq; conueniens. Cere lib. iii. resi-  
nae terebinthinæ, tantundem. retrementorum ab expressa  
myrobalano reliquorum, spumæ nitri, floris lapidis  
Asij, ammoniaci thymiamatis, sing. lib. j. olei Cypri-  
ni, lib. iii. Aceti quod sit satis ad ammoniacum dissolu-  
dum.

Malagma aurei coloris. Auripigmenti,  
unc. j. aluminis scissi, calcis uiuae, sing. sextantem. Ce-  
rae, resinae frictae, & pinus, sing. lib. ij. myrrhe sextantem.  
Arida increta, leuigataq; per affusionem acetj cyathos

**Lieni pharma-  
ca optima ab  
Archigene scri-  
pta.**

rum. viii. liquidis excipiuntur. Pharmaca ad sple-  
neticos ab Archigene scripta. Potus sit aqua quæ fer-  
rum candens extinxerit: sola quidem, febrientibus: ui-  
no autem immista, iis qui febre carent.

Aut corti-  
cis radicis periclymeni, & seminis eius, quantum tri-  
bus digitis apprehendi possit, in uino albo meraco ca-  
lido, ieiunis curriculo xl. dierum bibendum dato.

Aut uulpis hepar siccum ex oxymelite propinato.

**Lienosis eadē  
cataplasmata  
opitulari, quæ  
hepaticis.**

Aut folia capparis arida & trita exhibeto. Cataplas-  
mata autem eadem splenicis quæ hepaticis. ad moue-  
bis: ampliusq; cinerem ex ferraria officina cum aceto.

Aut nasturtium & scenum græcum, & calcem uiuā,  
& nitrum, cum melle emollita imponito.

**Lieni, si malū  
sit pertinax, cu-  
cubitulas effi-  
gendas esse, cū  
scarificatu.**

Aut fe-  
cem acris acetj, aut capparis radicem cum aceto impo-  
nito.

Perseuerante malo cucurbitas cum scarifica-  
tione affigito. Aut uenā retro sinistram aurem seca-  
to, & detracto sanguine confricato affectum lienē.

Remedia ad hydropem ab Asclepiade scripta.

Malagma



**M** Alagma Ipoterium, resorbens humiditates ab alto, simulq; duritias discutiens. Cerae, picis aridae, utriusq; lib. 1. liquidi, sulfuris uiui, mannae, nitri rubri, sing. lib. j. resinae frictae, lib. iij. olei ueteris, heminam. j. Arida liquidis permisceto.

Malagma ex baccis lauri ad eadem. Cerae, resinae pinus, picis brutae, baccarum lauri siccarum, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini subacti, sing. lib. j.

Hydropicis co-  
guita malag-  
mata ab Ascle-  
piade scripta.

Liquefabilia liquentur, & frigesacta misceantur aridis reductis in tenuissimum pollinem.

**E**mplastrum tōsoris, ad splenicos & hydropicos, quo etiam ischiadicos liberauit. Picis aridae lib. iij. cerae, resinae pinus, ammoniaci thymiamatis, nitri rubri, baccarum lauri aridarum, sing. lib. ij. adipis taurini lib. j. iridos lib. ij. canchryos, vnc. xvij. farinae fœnigreci, pol-  
linis, radicis chamæleonis nigrae, tenuissimè tritae, singul. sextarium unum. cumini tenuissimè triti, sesqui-  
sextarium. passi sextar. j. Conficito & utitor.

**C**leophanti cataplasma ad hydropicos. Cerae, resinae, spumae nitri, sing. drach. C. chalbani, propolis, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. S. cyprini, cyathos. ij. acetum tantundem. Conficito cataplasma.

**A**rchigenis remedia ad hydropicos. Stercus bouis armentariae tritum, coctumq; in posca, inspersaq; sulfuris uiui quarta portione, redigito in cataplasma, idq; toti uentri admoueto.

Hydropicis re-  
media ab Ar-  
chigene scrip-  
ta.

**A**ut elaterii, staphidis syluestris, hyssopi, fellis taurini, æquales omnium partes ficibus contusis excipiens, mulsaq; læuigans, similiter applicato.

**A**ut ueratrum nigrum, fel taurinum, nitrum, piperq; ex æquo mista, melleq; excepta, per semihoræ rempusculum uentri imposito. Per omne autem curationis tempus, Cotyledonis, scillae aridae, sing. drach. j. in uino mulso diluto quotidie exhibe.

**A**ut corticis rad. ari, similiter drach. j. Aut radicem calaminthæ coctam propina. Ad hæc hydropicos diutius ad solē, sed



**Hydropicos** esse sub ardenti sole fricandos oleo salugino so, perfundendosq; muria: necnon talos illis scarificandos.

confecto capite inungito ex oleo, cui multum salis admistum sit: ex multaq; perfundito salugine calida. Inflatos uerò maximè locos, uescicis magnis probè inflatis quotidie continenter pulsato. Incisis item, aut scarificatis ipsoꝝ talis, & uulnuscule impactis, in ferculo ipsos aut lectica circumuehito. Summè etiam faciunt Theriacæ omnes urinam cientes, insuperq; potiones aquam ducentes.

De pharmacis dolorem sedantibus, anodynis & colicis appellatis.

**Anodynis** uti quibus de causis soleamus.

**H**uiusmodi pharmacis, ob dolores ingentes, aut uigilias, aut ne per uolentam tussum lancinemur, uti consueuimus. Ad quas quidem affectiones, si modicæ sint, confectiones ex seminibus, priuatim tusculares dictæ, sufficiunt: quæ & ipsæ aliquid ex soporiferis seminibus possident, uerùm modicum inter multa adeò semina, quæ odorata, & tenuiū partiū, ac urinam mouētia existūt. Cuiusmodi sunt cuminū, daucum, selsi, apiumq; & anisum.

**Philonis** antidotus ad graues interaneorum cruciatus conferens.

Philonis Antidotus, ad omnes graues dolores uiscerum, ad aliaq; multa conueniens. Croci, drach. v. pyrethri, euphorbii, spicæ nardi, sing. drach. j. piperis albi & hyoscyami, utriusq; drach. xx. opii drach. x. Melle Attico excipito. Etenim

**Opium** uires.

opium ualidissimum est inter ea quæ sensum stupefaciunt, atq; soporem conciliant. Operatur autem hæc, etiam solum sapa dilutum, tomentoq; exceptum, ac sediditum, necnon illitum fronti & naribus. Si uerò

**Opium** miscēda qualia esse debeant medicamenta.

**Compositio** medicamentorum opio cōstantiū optimū scopum tria sibi proponere.

cum alio quopiam uim ipsius moderante misceat, moderatius hæc facit. Verùm quæ admiscuntur ipsi, aut concoquant, aut mitigent dolorificam affectionē oportet, aut humores affectionem gignentes discutiant, aut dissecant, aut attenuent, aut iuxta totam substantiam alterent. Quum igitur optimus cōpositionis scopus, tria sibi proponat: nimirum ut & sensus stupefiat, & nullū in posterum circa particulam inde detrimentum rema-



neat, amplius q; ut affectio ipsa inde iuuetur: ad hec omnia respiciens Philo, prædictum composuisse uidetur pharmacum: ex opii quidem, hyoscyamiq; mistura soporem, sensu triticiq; facultatis stuporem inducere uolens. Quo uero hæc citius distribuere, & totā affectuum partium penetrarent profunditatem, calfacientia admiscuit, pyrethrum, euphorbiū, & piper, quæ nocentes humores discutere possunt, extergere uiscidos, incidere crassos, ac deniq; flatulentos attenuare & dissoluere. Est aut, non modica concoctoria uis omnium frigidarum affectionum in nardo sita: quæ aut Indica, aut Celtica inicienda est. At crocus humorum crudorum est concoctorium, atq; item affectionum uirulentarum.

Colica medicamina Andromachi. Anisi drach. vi. seminis apii, drach. xij. nardi, drach. iiii. castorii, drach. iii. petroselini drach. iiii. piperis albi & longi, utriusq; drach. v. myrrhæ drach. vi. iunci odorati, drach. iii. succi papaueris drach. vi. croci drach. iii. Melle excipito. Datur ad summum nucis regię parua magnitudo ex aquæ calidę cyathis. iii. minimū nucis ponticę magnitudo. Aliud admirabile colicū ad uoluuolos, & sterCUS per os reddentes. Piperis albi, sem. hyoscyami, utriusq; drach. xl. opii drach. xx. croci drach. x. spice nardi, euphorbii, pyrethri, sing. drach. ij. Excipe melle cocto. Datur magnitudine fabæ in aquæ frigidæ cyathis iii. aut. iiii.

Colica Isotheos dicta, ad stomachicos, oculorum dolores, uteriq; labores, ex aqua mulsa, ubi ruta fuerit incocta. Croci sesquidrachmam. nardi drach. ij. myrrhæ drach. viii. costi, piperis albi & longi, chalbani, sing. drach. j. opobalsami, drach. iiii. cinnamomi, succi mandragoræ, castorii, sing. drach. ij. seminis dauci drach. iiii. S. sagapeni drach. iii. cassiæ drach. iiii. excipe melle Attico.

Alia non minus admirabilis. Succu centaureæ, castorii, scille assatæ, piperis albi & longi, myrrhæ, rutæ hortensis, hyssopi, labrotoni,

EEcc ii

Nardi facultas.

Croci facultas

Celtica medicamina Andromachi.



riidis Illyricæ, sing. drach. ij. croci, ammoniaci thymia-  
 matis, rad. acori, phu pontici, zingiberis, ueratri albi,  
 sing. drach. j. oxymelite excipito. Datur etiam drach-  
 ma. j. ex aceto mulso. Chariclis, ad coli inflationes,  
 remedium. Cumini Æthiopici, drach. vi. sem. apii, dra-  
 ch. v. seminis dauci Cretici, drach. ij. piperis albi, dra-  
 ch. j. Tusa & cribrata reponito. Datur cochlearia duo,  
 cum aquæ mulsæ cyathis tribus. Confectio Lin-  
 gonis colica, quæ data ex frigida, statim soluit dolores.  
 Sem. hyoscyami albi, drach. xx. opii, seminis dauci Cre-  
 tici, utriusq; drach. x. petroselini, drach. vi. croci, spi-  
 cæ nardi, pyrethri, sing. drach. iiii. euphorbii, opobalsa-  
 mi, cinnamomi, sing. drach. ij. Excipito melle cocto, ac  
 fabæ Ægyptiæ magnitudinem exhibeto, cum aquæ te-  
 pidæ aut frigidæ cyathis. iij. in irritationibus.

## De dysentericis.

Dysenterici ue-  
 ri sunt, quibus  
 est aliquod in-  
 testinum exul-  
 ceratum.

Dysentericis  
 remedia scri-  
 pta ab Andro-  
 macho,

**D**Einceps medicamenta scribemus, quæ uerè dy-  
 sentericis auxiliantur, quos nulla alia infestat af-  
 fectio, præter ulcus intestinorum, aut nudum, aut cum  
 putredine obortum, quam nomen appellant.

Quæ ab Andromacho ad dysenteriam scripta sunt.

Potio ad dysentericos & hæmoptoicos. Florum rosa-  
 rum, opii, acaciæ, gummi, sing. drach. iiii. balauſtii tan-  
 tundem. succi hypocisthidos tantundem. gallarum, se-  
 minis plātaginis, succi eius, sing. drach. ij. lycii Indici,  
 succi rosarum, sing. drach. j. Cōſice pastillos drachma-  
 les, & uariè utere. Ad dysentericos & celiacos  
 confectio ex fructibus. Mala punica integra, xx. cydo-  
 nia toridem. erui sextarium. j. prunorum syluestrium,  
 sextarios. ij. Sorborum Ephesinorum, tantundem. Rhois  
 Syriaci, sextar. iij. pira Terentiana. xx. Cestiana. xxx. si-  
 liquas xl. baccarum myrti nigrarum, sextar. iij. musti  
 aminæ ad tertias decocti sextar. xlviij. Coquito simul  
 ad mellis spissitudinem, & in figulino reponito.

Alia. Nardi, croci, utriusq; drach. viii. aloes, thuris,



MED. SEC. LOCA LIB. IX. 437

ſing. drach. ij. acaciæ, myrrhæ, ſucci hypocifthidis, roſarum ſiccarum, lycii Indici, tragacanthæ, opii, ſing. drach. iij. piperis drach. ij. Aqua excipito: paſtillos q; duarum drachmarum facito, et cum uino myrteo exhibeto.

Ad dysentericos, cœliacos, & hæmopticos, ex Cornelio medico. Myrrhæ, thuris, aloes, croci, opii, rhois Syriacæ & coriariæ, lycii Indici, acaciæ, malicorii, ſucci hypocifthidis, gallæ, balauſtiorū, ſing. par pondus in paſtillos cogito, & ad noctem febre carentibus ex uino: febrientibus uerò ex frigida propinato.

Potio Apollonii ad fluxum muliebrem ſiſtendum. Corallii, balauſtii, utriuſq; obol. iij. gummi obol. j. Excipe oui crudi candido: & dimidium totius cum aqua cyathis quatuor propina.

Infuſa Dysentericis cōmoda. Infuſum Athenæi ad recti inteſtini ulcera.

Omphacii, aluminis ſciſſilis, calcis uiuæ, ſquamæ grise, ſing. drach. vi. auripigmenti drach. viij. ſandarachæ, drach. iij. chartæ uſtæ drach. xv. cum uino myrteo paſtillos drach. iij. aut trium, formato. Infunde autem cū uini dulci cyathis. iij. & aque tepidæ cyathis duobus.

Infuſum Heræ. Chartæ uſtæ, cadmiæ, auripigmenti, ſing. vnc. j. calcis uiuæ extinctæ ſucco plantaginis, vnc. ſ. Omnia redigito in pollinem, & cochlearia. ij. cum decocto baccarum myrti, aut uino myrteo, inſundito.

Infuſum Nicoſtrati. Calcis uiuæ drach. j. gypſi, drach. viij. acaciæ drach. ij. omphacii, drach. j. ſtibi drach. iij. thuris drach. j. gallæ drach. iij. tragacanthæ, drach. ij. cum uino myrteo in paſtillos redigito.

Aſclepiadis ad dysentericos remedia. Rhois Syriaci, farinæ polentæ, uux paſſæ, ſing. drach. ij. malicorii ruſi & cribrati, drach. j. Excipito melle cocto, atq; myſtrum unum ante cibum porrigito, Aliud probatum. Gallarum redactarum in pollinē, cochleare unū. piperis albi, rhois rubri, malicorii tenuiſſimè triti, ſingul. tantundem. Omnia oui luteo excipito, & in uacuā

Hæmopticis  
medicamē  
Cornelii.

Fluxui mulie  
bri ſiſtendo po  
tio Apollonii.  
Clyſmi dysen  
tericis apti.

Dysentericis  
remedia ab Aſ  
clepiade ſcri  
pta.

EEee iii



mali punici testam conuicito, atq; obturato cum farina osculo ipsius, ad prunas torrefacta depurgata mali punici testa, cochlearium unum edendum dato. Pastillus Philippi ad dysentericos inueteratos, dolorem sedans, qui bibiturq; & infunditur Balauftii, acaciae, succi hypocisthidis, rhois, apii, thuris, myrrhae, baccarum myrti ingrarum, croci, gallarum, lycii, aloes, rhei pontici, malicorii, sing. drach. iiii. Excipito uino Italico, cogitoq; pastillos pondere obol. iij. ac porrigito non febrientibus quidem, ex uino: febrientibus uero ex mulla.

*Dysentericis  
epithema com-  
modum.*

Epithema coeliacis, dysentericisq;. Sem. hyoscyami albi, apii, utriusq; trientem. anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis, balauftii, rhois Syriaci, sing. sextantem. succi papaueris, croci, utriusq; vnc. j. Singula cum uino myrteo terito: dein mista in pastillos redigito, quos in umbra assiccato. Inde uero quantum sufficit tundens & cribrans, palmulis passis excipito, ac tandem linteculo imposita, uentri admouero.

#### De affectibus sedis.

*Sedis ulcera  
curantur aegre cura-  
tione recipiunt,  
& qualia phar-  
maca possunt.*

**S**edis uitia, ob ipsius partis sensum exquisitissimum, & ob crebrum per ipsam excrementorum decursum, aegre curationem recipiunt. Aptissima autem ipsis pharmaca sunt, quae absque aspredine astringunt: qualia maximè sunt, quae ex metallicis neque acris, neque acerbis existunt. Haec siquidem lota, citra mordacitatem (id quod requiritur) operantur.

*Sedis medica-  
menta ab An-  
dromacho scri-  
pta.*

Medicamenta sedis ab Andromacho scripta. Cerussae, lithargyri utriusq; drach. v. thuris, aluminis scissi, utriusq; drach. iiii. croci obolos. iij. Vini & rosacei quod sit satis. Conficito.

Aliud. Butyri, cere, utriusq; sescunciam medullae ceruinæ, cespiti, thuris, sing. vnc. j. aluminis scissi quadrantem. Lycii sextantem. Vini & rosacei, quod sit satis. misceto.

Aliud. Adipis anserini curati, cere, thuris, medullae cerui, florum rosarum, pompholygis, cadmiae, plumbi loti, sing. drach. iiii. cerussae drach. vii. cerebri



gruis drach. ij. succi papaueris sesquidrachmam. œsy-  
pi drach. v. succi seridis heminam. j. rosacei heminā. S.  
confundito.

Pinguis compositio ad achoras & pforas. Spumæ argenti, cerussæ, utriusq; drach. xxxij. atramenti sutorii, drach. xvj. sulfuris uiui, drach. viij.

Pforis utilis  
compositio.

Olei myrtei & aceti quod sit satis: misceto.

Ad prolabentem sedem. Recrementi plumbi, drach. viij. Rhois Syriaci, tantundem. floris rosarū drach. iij. myrrhe Minnæ drach. ij. Insperge siccū, ubi prælu-  
ris uino austero, aut uini decocto. Aliud. Gallæ  
omphacitidis, rhois coriarii, sing. drach. ij. plumbi usti,  
drach. iij. spumæ argenti, drach. viij. trita inspergito.

Sedis plapful  
remedium.

Hæmorrhoidibus extrahendis pharmaca ab Af-  
clepiade scripta. Piperis, nitri, utriusq; drach. j. teri-  
to admoueto q;. Aliud. Spumæ nitri, fellis tauri, sta-  
phidis syluestris, sing. drach. j. Trita, excepta q; modi-  
co melle, adhibeto. Postea uerò q; eminentes fue-  
rint, atq; in propatulo, accipe cerussæ vnc. j. spumæ ar-  
genti quincuncē, pompholygis vnc. j. olei myrtei bes-  
sem. Vini boni tantū dē, butyri vnc. j. Confundito q;  
& applicato. Cæterū ad arduos sedis dolores, oui  
assati uitellum uino albo terito, & cerato myrteo exce-  
ptum, illinito. Ad pudendorum affectus.

Hæmorrhoidi-  
bus ab Afcle-  
piade scripta  
remedia.

**E**Xulcerati pudendi cognitio, ex manifesto circa ip-  
sum dolore paratur: unā cum hoc, q; etiam circa  
mictiones excernitur quid ex corpusculis ulceri ipsi in-  
sidentibus. Discernuntur autem hæc ab ijs quæ ex ue-  
sica ferunt, q; statim ī ipso primo loci exitu appareāt:  
querò à uesica excernunt, deferant cū urinis pmissa.  
Cæterū ulcera pudendorum, & circa sedē citra inflā-  
mationem consistentia, resiccantibus ualde indigent  
pharmacis, qualia sunt, quod ex charta combusta con-  
stat, & anethum ustum, & cucurbita usta. Verū sic-  
cis & recentibus ulceribus, etiam aloë bonum est me-  
dicamē. Omnium autem maximè dolorem sedat, nec

Pudendorū vl-  
cera dignoscē-  
di ratio.

Pudendorū vl-  
cera valde re-  
siccantib; phar-  
macis indigēt.

Pudendorum  
ulceribus quæ  
pharmaca opi-  
tulentur.

EEee iij



Vlcera vesicæ  
uteriq; iisdem  
quibus puden-  
di vlcera medi-  
camentis indi-  
gent.  
Metrenchyte.  
Catheteres

Pudendo tume-  
scēti remedia

Pudendi fissu-  
ras, tubercula  
q; quæ sanent.

Pudendorū in  
flāmationibus  
quæ opitulent.

Priapismus est  
auctio colis p-  
manens, in lati-  
tudine, longitu-  
dinemq; citra  
rei venereę ap-  
petentiam.  
Priapismi cu-  
ratio.

ullo minus efficax est pompholyx. Si uerò humectio-  
ra sint ulcera, pinus cortex per se, & lapis hematites: ut  
si profunda, manna etiam prædictis addatur. Porro  
quæ circa uterum aut uesicam consistunt ulcera, eisdē  
medicamentis indigent, sed instrumētis insuper opus  
habent, quæ ipsa intromittant, ut sunt metrenchyte, &  
catheteres uocati. Aptiora itaq; sunt arida, qualis est  
crocus, pompholyx, & aloë, quæ faciliè plantaginis, aut  
alteri tali succo miscentur. Ad scroti & pudendi do-  
lores. Butyri & resinæ pari mensura utere. Aut se-  
men lini cum aqua coquito, & admista myrrhæ fermē  
decima parte, & resinæ tantundem, imponito. Ad  
pudendum intumescens. Foliorum uitis tenerorū dra-  
ch. j. cerussæ drach. v. trita cataplasmatibus uice impone.  
Aut lenticulā in aqua coquito, & cum mali punici cor-  
tice tritam imponito. Si uerò è sudoribus ulcera in  
scroto fiant, gallam tritam cum alumine inspergito.  
Ad tubercula in pudendis nascentia, piri semen insper-  
gito, & fel hircinum oblinito. Fissuras & rimas iuuat  
rosaceum, amyllum, & thus, paribus portionibus mi-  
sta. Aut foliorum hederę aridorum ustorūq; cinis,  
cum oleo in plumbeo mortario triti. Ad pudendorū  
inflammationes, farinam hordeaceam hydromelite in  
coquito, & uitis folia tenera cum polēta terito, simulq;  
omnia imponito. Excrescentem testiculorum car-  
nem cinis sarmenticius cum nitri & aqua subactus sa-  
nat, cataplasmatibus uice impositus.

#### De Priapismo.

**P**riapismus est auctio colis permanens, in longitu-  
dinem atq; orbem tumefacti, citra rei Venereę ap-  
petentiam. Cuius affectionis est causa flatulentus spi-  
ritus ex humoribus crassis & uiscidis genitus per mo-  
deratam caliditatem. Debent igitur refrigerari leniter  
partes per ceratum rosaceū in aqua maceratum, itēq;  
per chamæmelinum ceratum, tum pudendo ipsi, tum



lumbis impositum. Victus & pharmaca esse debent attenuatoria, citra manifestam calfactionem. Præterea nymphaea in potu est danda, & uiticis semē: nec non ruta uiridis obsonijs misceatur, post aliorum tenuantium usum. Quod si euacuatione uti libeat, administretur per uomitum. Ad eos qui se in somno permingunt, uesicam caprillam, aut ouillam ustam, ex posca bibendam dato: & ad uesperam siticulosos inire somnum iubeto. Facit & testiculus leporis in uino odorato seruifactus, atq; ita potus. Aut calamintham & myrrham in uino ante coenam bibendam dato. Oblinant autem pudendum cimolia tera cum perdicij succo.

Ad uteri affectus.

**I**n uteri suffocatione contingit sensus ac motus priuatio, & pulsus obscurus, & paruus, & penitus interceptus. In aliquibus uerò tum sensus, tum motus adest, ratioq; constat, cæterum uix respirant. Aliquibus etiam uox intercipitur. Alijs contrahuntur artus.

Fiunt igit uidiuis sensus, & motus, & respirationis interceptiones, ob frigiditatem: perspirantibus ipsis tunc per arterias totius corporis, neq; utētib; illa, quæ per os fit respiratione. Etenim quum prius probè repurgarentur, conciperent, atq; coirent uiris, uerisimile est, postea quum omnibus his priuantur, humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad uulua itaq; strangulatus conuenit agarici drach. j. in potu accepta cum uino: & plantaginis semē & succus cum uino: nec non acetum scillinum absorptum. Olfactu excitant strangulatas, bitumen, castorium,

chalbanum, pix liquida, cedria, pili usti, ruta, allium, cepa. Eandem in rem & cornu cerui suffitur: & ruta cum melle lana excepta in anum inditur.

*Mingentibus  
inter dormien-  
dum remedia.*

*Vteri suffoca-  
tiones quæ se-  
quātur sympto-  
mata.*

*Vteri suffoca-  
tione affligen-  
te, per arterias  
tantū fieri per-  
spiraiones.*

*Vteri suffoca-  
tionis causa.*


*Vteri suffoca-  
tionis remedia.*



# G A L E N I P E R G A M E N I , D E C O M P O S I T I O . N E M E D I C A M E N T O R V M S E .

cundum locos , Liber. X.

Nephriticorū  
medicaminum  
differentiæ.



Renum inflam  
mationib⁹ qua  
lia medicamē  
ta conueniant.

Calculosis con  
grua medica  
menta, omnia  
fere esse ama  
ra.

Vesicæ ulceri,  
& urinæ diffi  
cultati reme  
dium.

Sanguinē e ur  
sica fluentē re  
medium sup  
primens.  
Calculos fran  
gens medica  
mentum.

**E**X Nephriticis Antidotis, hoc est renali  
bus, quædam enim calculosos renes iu  
uant: quædam uerò inflāmatos & ulcera  
tos, quæ etiā ad uesicam affectam conue  
niunt. Maximè aut contrarij inter se sunt,  
predictorū pharmacorū facultates. Siqdem quæ ad in  
flāmatas et exulceratas affectiones cōponunt, mitiga  
torijs medicamētis indigēt. Cæterū quā impossibile  
sit hæc cito penetrare ad regionē renum, ob id ipsis mi  
scemus diuretica. At quæ calculosis opitulātur, unicam  
facultatem postulant, quæ secare & extergere est nata,  
cū conspicua caliditate. Sunt autem talia fere oia ama  
ra.

Confectiones Andromachi ad renum  
& uesicæ affectiones. Potio ad uesicā exulceratam  
& urinæ emittendæ difficultatem. Seminis lini, sem.  
papaueris albi, sem. cucumeris, tragacantæ, sing. drac.  
ij. amyli drach. iij. Cum aqua in pastillos redigito: ex  
hibetoq;.

Alia ad eadem, & uesicæ dolores. Cro  
ci, seminis rutæ syluestris, seminis maluæ syluestris,  
sing. drach. vj. sem. hyoscyami, drach. xij. opij drac. vj.  
sem. apij, drach. xij. nuces auellanas. xij. amygdalas. xx.  
sem. cucumeris drach. xij. mellis Antici, quod sit satis.  
Datur magnitudo ponticæ nucis cum uini mulsi cya  
this. iij.

Alia ad profluvia sanguinis ex uesica.  
Aluminis drach. j. tragacanthæ drach. ij. gummi obo  
lum. j. Dato ex passo quandoq; obolum. j. quandoq;  
duos.

Alia calculos frangens, ita ut non renascan  
tur. Cassiæ, piperis albi, sem. pastinacæ, anisi, sem.  
papaueris albi, spicæ nardi, sem. smyrnij, cyperij, sing.  
drach. ij. seminis apij, thuris, styracis, iridis Illyricæ,  
amygd. amar. asari, sing. drach. iij. myrrhæ minnæ,



drach. iij. Mellis Attici quod sit satis. Conficito & quotidie exhibeto nucis pōticæ magnitudinē ex aquæ cyathis tribus: idq; ieiuno, stomacho.

NEPHRITICAE cōpositiones ab Asclepiade con-  
scriptæ. Seminis satiui cucumeris tosti, drach. iij. se-  
minis maluæ, drach. v. nucum pinearum drach. vj. se-  
min. apij drach. vij. seminis lini drach. j amyg. amara-  
rum mund. drach. ix Excipe passo, & exhibe nucis pon-  
ticæ magnitudinem cum protropi cyatho. j. & aque ca-  
lidæ cyathis duobus. Alia. Maluæ syluestris & ru-  
tæ syluestris, & apij montani radices in uino coquito,  
& expressi liquoris cyathos. ij. cum pari aquæ portio-  
ne exhibeto. Alia. Seminis balsami, lapidis quī  
spongijs inest, pulegij aridi, seminis maluæ syluestris,  
ocymi aridi, sing pares portiones tunditō, incernitōq;  
& reponito. Propinato autem cochleare unum cum ui-  
ni diuti cyathis duobus. Pastillus ciens urinas,  
atq; expellens lapillos. Asari, petroselini, plu-  
Mei, singul. drach. iij. acori, sem anisi, sem. dauci, apij  
montani, carpobalsami, tragacanthæ, sing. drach. ij. Tra-  
gacantham passo dissolutam aridis adijcito, & pastil-  
los formato: indeq; obolos. iij. cum passi diluti cya-  
this. ij. exhibeto.

Nephriticæ cō-  
positiones ex  
Asclepiade.

De ischiade, podagra, & arthritide.

**E**X genere arthritidis est tum ischias, tum podagra.  
Quod enim in omnibus articulis est arthritidis, hoc  
in uno iuxta coxēdicem quidem, ischiada, iuxta pedem  
uerò, appellant podagram. Incipit igitur plerunq; po-  
dagræ generatio ex uno articulo, temporeq; in omnes  
progreditur. Communem habēt hi tres affectus re-  
dundantiam humoris. Cæterum aliquādo irruens hu-  
mor sanguineus est: ut plurimū autem pituitosus: aut  
ex pituitoso & bilioso mistus: quibus etiam interdum  
miscetur sanguis. Porrò ubi pituitosus humor, qui  
propriè appellatur crudus, in articulis delituerit diu-  
tius. crassior atq; uiscosior efficit, tofisq; aut callis di-

Arthritidis.  
Ischias.  
Podagra.

Articulorum  
morborum com-  
munes causæ.  
Tosorum gene-  
ratio fit a pitui-  
toso humore im-  
pacto in articu-  
lis: ob idq; sunt  
incurabiles.



ctis præbet generationem. Qui quidem postq̃ pro-  
ducti fuerint, non est q̃ speres illos posse exactè dis-  
soluti. Differentia affligentium humorum faciliè ex co-  
lore dignoscitur. Præterea biliosus sanguis multæ ca-  
liditatis sensum exhibet ægrotanti, à calorificis q̃; reme-  
dijs exacerbatur: quæadmodum remittitur rursus à fri-  
gidis. Curatio autem ipsa exordièda est ab euacuatione  
affligentis humoris: si quidem ex æquo humoribus re-  
dundarit corpus, uenæ sectione primo omnium admi-  
nistrata: dein purgatione, quibus accedat pharmaco-  
rum dicendorum conueniēs atq̃ opportunus usus: ita  
ut in manibus pedibus q̃; pharmacis repellētibz flu-  
xionem utamur: iuxta coxendicē uerò, ea minimè ad-  
ministremus. Quum enim iūctura ea in profundo sit  
sita, sanguis ex uicinis & ambientibus uasis à muscu-  
lis ad illā truditur. Mitigatorijs igitur in principio me-  
dicamentis utendum est ad dolores coxendicū, & que  
nec refrigerent multum, nec fortiter calfaciant. Exacer-  
bantur enim per ipsa fluxiones, caliditate nimirū plus  
attrahente ipsas, q̃ impediente. Rarò itaq̃ fit coxendi-  
cum dolor ex sanguinis multitudine, citissime q̃; cura-  
tur, uenis circa poplitē aut malleolos pertusis. Quem-  
admodum autem sola sæpe sanguinis euacuatio suffi-  
ciens auxilium existit, sic cōtra in omni dolore coxen-  
dicū, & præsertim eo, qui ex humorum copia est exor-  
tus, si quis ante euacuationem totius corporis acerbis  
pharmacis circa affectam partem utatur, affectū ægrè  
curabilem reddet, copia uidelicet indissolubiliter ibi-  
dem condensata. Ob id q̃; ab euacuatione incipiendum  
est, nō solum à cruribus, sed à cubito etiam sanguinis  
detractione facta. Auxiliantur etiam uomitus ipsis is-  
chiadicis, magis utiq̃ q̃ euacuationes per uentrem: ut  
qui reuellant humorem repentem deorsum. Mouen-  
di itaq̃ sunt uomitus in principio ab accepto cibo: po-  
stea uerò, etiam per uomitoria medicamenta, initio à  
mediocribz factis. In quibus autem uehemens hu-

Articulares do-  
lores a quibus  
gignantur hu-  
moribus, quæ  
notæ indicen-  
t.

Articularis  
morbi curatio.

Repellentibus  
quidem uten-  
dum esse, si hu-  
mores fluāt ad  
articulos redū  
aut manu: mi-  
nime autem, si  
in coxendicem  
irruant

Ischiadi? qua-  
lia remedia in  
principio con-  
ueniant.

Ischias raro ori-  
tur a sanguine:  
facillimeq̃ cu-  
ratur tunc po-  
plitis uenis aut  
malleolorum  
incisis.

Ischiade urgē-  
te acerbis me-  
dicamentis non  
est utendū, ante  
totius corporis  
euacuationem.  
Ischiadicis con-  
fert uena secta  
in cubito, uo-  
mitusq̃.



morum densatio, quæ ægrè dissolui possit, à medicis intempestiuè utentibus acerbis pharmacis facta est, ijs maximè cucurbita affixa auxiliatur, & purgatio per clysmos efficaciores, qualis est qui ex colocynthide constat.

COMPOSITIONES ab Andromacho scriptæ ad ischiadicos. Emplastrum è profundo extrahens humores affligentes coxendicem. Seminis rutæ syluestris, silphij, spumæ nitri, baccarum lauri, abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi, animi, singul. drach. iij. rutæ uiridis, minx octauam partem. Quidam horum singulorum drach. xx. accipiunt: nec non picis, adipis taurini, terebinthinæ, myrræ, ceræ, sing. tantundem. chalbanî, ammoniaci thymiamatis, utriusq; drach. vj. opopanacis, sulfuris uiui, sing. drach. iij. Conficito, & admoueto. Aliud ad coxendicum, capitisq; dolores, atq; ad alios omnes antiquos. Ceræ drach. xxiiij. ammoniaci thymiamatis drach. vij. terebinthinæ tantundem. succi thapsiæ, drach. viij. olei cyathum unum. Aliud. Ceræ drach. C. uisci quercini, drach. xvj. myrrhæ drach. vj. terebinthinæ drach. xxv. chalbanî drach. vi. iridis Illyricæ tantundem, ceræ heminam. S. Cyprini tantundem.

ASCLEPIADIS Malagmata ad ischiadicos. Myrrhæ stactæ, bdellij onychis, medullæ ceruinæ, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sing. lib. ij. opopanacis, chalbanî, styracis, mastiches, floris lapidis Asij, succi sycomororum, canchryos, piperis albi, sing. lib. j. ceræ, terebinthinæ, utriusq; lib. v. Tundendum est pharmacum ita, ut qui tundit, faccē unguenti irini adhibeat, quo mollius reddatur. Aliud mirè iuuans ischiadicos, discutensq; omnem duritiē. Ceræ, uisci quercini, terebinthinæ, iridis siccæ, myrrhæ, chalbanî, sing. drach. xlviij. Olei cyprini, aut unguenti Aegyptiaci, quod sit satis. Conficito. Aliud. Picis liquidæ brutæ, lib. iij. facis aridæ ustæ, lib. ij. nitri rubri, lib. j. S. resing pini, ceræ, staphidis syluestris, sulfuris

Ischiadis induratae curatio.

Ischiadicis cataplasmata descripta ab Andromacho.

Ischiadicis malagmata ab Asclepiade scripta.



ris uiui, sing. lib. j. pyrethri, lib. S. cardamomi sext. j. Picem, ceram, atq; resinam, soluito: arida tundito, cribratoq; & liquefactis committito. Porro DAMOCRATES, Archigenesq; plurimum ad ischiadicos commendant malagma ex iberide herba (quani nasturtium syluestre uocant) cum adipe porcino tusa confectum: quod sanè imponi iubent ad horas tres, indeq; ad balneum accedere.

De podagricis & arthriticis affectionibus.

**S**Copus in hisce affectibus est, si quidem adhuc fluant humores, ipsos per astringentia repellere: si uerò amplius non influant, discutere qui sunt iam impacti.

Arthriticis cō-  
gruentia epithe-  
mata ab Ascle-  
piade scripta.

**EPITHEMA ASCLEPIADIS**, ad arthriticos, mirè dolorem sedans. Succu papaueris, drach. iij. croci drac. j. cum lacte bubulo, caprillo uel & panis medulla contundito, læuigatoq; ac deniq; ex rosaceo emolliens, conficito cataplasma. Aliud. Styracis drach. ij. opij drach. j. Confice, utereq;.

Aliud tofos & duritias discutiens. Farinæ fœnigræci, floris lapidis Asij, lomenti fabæ nigræ, farinæ lupinorum, sing. sextar. j. Omnia mixta & aqua subacta calida, imposito. Pastillus podagricus. Aloes lib. j. succi centauri sexuncem. Thuris masculi trientē. myrræ tantundem. floris lapidis Asij, opij, succi mandragoræ, aluminis scissi, sing. sextantem: passo excepta in pastillos redigito. Vsu expetēte, lacte dissolutos cum penna illine, & supra illitionem linteolum passo imbutum impone. Aliud, quod auxiliatur confestim. Visci, terebinthinæ utriusq; lib. j. adipis taurini, floris lapidis Asij, calcis uiuæ, mannæ, sing. quadrātem. cyprini lib. j. Conficito, utitorq;.

✱ F I N I S. ✱

Ex industria omisimus libellum de facilibus paratu remedijs, q̄ omnia quæ in illo habentur, reperiuntur in hisce commentariis longè cumulatora.



ILLVSTRI ADMODVM, ATQVE

Ornatissimo Viro, D. D. Ario Gonz=

zalo, Comiti Pugni in Roſtro: An=

dreas Lacuna, Secobiensis,

Doctor Medicus, Mi=

les . S. Petri.

Salutem.



ALENI COMMENTA=

rios de Theriaca & de antido=

tis hoc nomine dicare tuæ Digna

tioni statui, Vir citra controuer

siam Splendidissime, ut genero=

sum istum animum tuum, ex tam

longa lite & controuersia defa=

tigatum, uaria eorum lectione, dulcissimaq; , oblecta=

rem: contra iudiciariasq; molestias, atq; ingentes dif=

ficultates ( quæ optimorum ingeniorum ueluti delete=

ria & exitialia uenena existunt ) salutari alexiphar=

maco communirem, atq; corroborarem. Quanquam

hercle adeò inuicta, insuperabilisq; tua ista est animi

magnitudo, ut nullis tormentis succussa possit unquam

euerti, aut quoquomodo labefactari. Nam tametsi ua=

rij fortunæ fluctus, acerbissimaq; procellæ, & quæ

uel fortissimum quenq; prosternere minimo negotio po=

tuiſſent, iam ante multos annos in te maximum im=

petum fecerint, adeò tamen fortiter sustinuisti omnes

eius insultus: tam heroicè restitisti afflictionibus undiq;

tua moenia circūuallantibus, ut ob nullam tempesta=



tem ingruentem, uultum unquam, aut colorem, muta-  
 ueris. Quam sanè tam insignem constantiam, animiq;  
 raram serenitatem, non aliunde q̃ à philosophia com-  
 parasti: cuius nimirum amator longè indulgentissi-  
 mus es. Siquidem præter alias uirtutes quibus te exor-  
 nauit Deus Optim. Max. etiam insecuit tibi ardentis-  
 simum quendam omnium disciplinarum amorem, quo  
 accensus, adeò illis perpetuò indulges, ut ab ipsis re-  
 uocari non possis. Id quod ipse exploratum habens,  
 non posse me Dignaioni tuæ rem ullam gratiorem  
 facere existimaui, q̃ si ad eam mitterem hosce com-  
 mentariolos Galeni, ut mole exiguos, sic plenos eru-  
 ditione, uarijsq; naturæ misterijs auctos. Tuum  
 igitur fuerit, Vir Clarissime, hoc nostrum  
 quantulumcunq; munusculum, illius fer-  
 uentissimi amoris, quo Optimus  
 pater meus prosequabatur  
 olim totam familiam  
 uestram, offi-  
 cijq; mei  
 in  
 Tuam Amplitudinem, futurum  
 ueluti monumentum quod-  
 dam perenne, æqui bo-  
 niq; consulere.  
 Vale.

Venetijs. Calen. April. M. D. XLVIII.

Galen



**GALENI PERGA-**  
**MENI, DE THERIACA**  
 ad Pisonem, Liber vnus.



**EDICAMENTVM** Ex  
 uiperis meritò est apud homi-  
 nes inter alia omnia celebratis-  
 simum, Optime Piso, & q̃ uim  
 habeat efficacissimam, & q̃ ne-  
 minem promissis frustratur. Si  
 quidem nullū à feris commor-  
 sum, hac statim epota antidoto,  
 perijisse, memorie proditum est. Nullus etiam, eadem  
 præsumpta, uel si paulo post impeteretur morsu, in-  
 terijt: id quod indies experiuntur prætores, in homi-  
 nibus capitali supplicio damnatis. Cæterum, si epo-  
 ta theriaca non purgetur qui hausit medicamentum  
 purgans, id tibi erit indicium, antidoton præstantis-  
 simam esse, quæ sæpissimè solet adulterari. Porro Di-  
 uus Marcus Aurelius, qui legitimè aliquando gesit  
 habenas imperij, affatim & ueluti alimento quodam  
 hoc utebatur medicamento: primusq̃ fuit, qui ipsius  
 existimationem, fidemq̃ auxit. Verum illius quidem  
 principis tempore, ad familiariū tantum noticiam,  
 theriaces perueniebat opus: sub hisce autem monar-  
 chis maximis, usus eius prodijt in publicum. Siqui-  
 dem nobis omnibus licet eorum bonis probè uti, li-  
 beraliterq̃ alijs mederi, alio ab alio medicamentum  
 capiente: quum non solum hoc nomine cæteris om-  
 nibus antecellat, q̃ imperium à Dijs sint adepti, sed  
 q̃ etiam uniuerſa bona cunctis libenter impartiant,  
 ac non secus q̃ Dijs ipsi, tantum ex æquo gaudij con-  
 cipiant, \* quantum illi qui ab ipsis seruantur: quum  
 nimirum censeant maximam regni esse partē, com-

Theriaces cō-  
 mendatio.

Theriaca per-  
 fecta purgan-  
 tium pharma-  
 corum opera-  
 tionem suppri-  
 mit.

Marcus, Aure-  
 lius Imp. auxit  
 fidem Theria-  
 ces.

Seuerū & Lu-  
 cium eiusdem  
 imperij mode-  
 ratores, colle-  
 gasq̃, magnifi-  
 ce commendat  
 Galenus.

Regni maximā  
 esse partē, com-  
 munem omniū  
 salutem.

Tomus. IIII.

FFff



munem omnium salutem. Quo sanè regio candore præditi, adèd exquisitè & diligenter theriacem præparant, ut ipsi quidem nihil prorsus omittant; antidotus autem, admiranda opera exhibeat. Igitur morbi cuiusq; natura comperta, differentiaq; simplicium pharmacorum penes temperamentum, cognita, singulis morbis quod congruum sit, medicamen compositum præparabimus. At simplicium medicaminum vires sensu & experientia cognoscimus, quibus postea rationem iungentes, eamq; ceu ducè sequentes, hallucinari non possumus. Etenim quum cernamus liquidò, scammoniam bilem flauam educere: epithymum, atram bilem; ac deniq; coccū gnidium, pituitam: nec credamus medicamenta ipsa purgantia, in suam naturam humores trāsmutare & conuvertere (id quod Asclepiades somniauit) sanè persuasum habemus, quemedmodum magnes trahit ferrum, sic medicamēta singula, sua insita facultate, conuenientem sibi succum attrahere: nimirum id ratione comprehendentes, quod proprietatem facultatis naturæ cuiusq; pharmaci uerè \*testari atq; exprimere potest. Medicamentorū itaq; alia per totas substantias agūt: alia in substantia sua miscellaneā facultatem sortiuntur: adèd ut sæpe in corpore effectus maximè contrarios producant. Siquidem lapathi folia comesta subducunt aluum, quam sumptum eius semen astringit. Similiter & succus brasicæ, & uetulorum gallorum ius, & cochlearum marinarum cremores, uentrē commouent: olus autem ipsum, atq; illarum carnes comestæ, eundem comprimunt. Aloe, squamaq; æris, excrecentes ulcerum carnes astringunt: assumpta uerò per os, uniuersum corpus expurgant. Lac ubi à nobis diuiditur, contrarias facultates ostendit. Nam serum ipsius bibitum, uētre rem soluit. Caseus ingestus, ipsum cohibet exactè. Trifolium herba, decocta, in-

*Simplicium vires cognosci sensu, experientiaq; quibus adiuncta sit ratio. Scammoniū trahit flauam bilem.*

*Epithym<sup>9</sup> atram bilem expurgat.*

*Coccus gnidius soluit pituitam.*

*Medicamenta singula propriū sibi succum attrahere.*

*Medicamenta plura, secundū diuersas sui ipsorum partes, uarios effectus producere.*

*Lactis substantiæ diuersæ.*

*Trifolii affli-*



posita q; ferarum moribus auxiliatur: quæ si sanæ pti affricetur, non secus q; ferarum morsus eam affligit.

Cicuta sturnos quidem, alit: nos autem è medio ollit. Veratrum coturnicibus cibus, homines malè perimit. Nonnulla præterea partes quasdã certas corporis uitiant. Nam lepus marinus, pulmonem exulcerat. Cantharis uescicam peculiariter afficit.

Econtrario, affecto iecinori sæpe fuit herba eupatora ex usu. Myrobalanus lienem adiuuat. Sarxiphagon, & Betonica, renes optimè afficiunt. Quum igitur ueteres illi Medici reputarent secum, inuitabiles esse noxiarum ferarum morsus: necnon deleteriorum pharmacorum symptomata esse omnino letalia: quumq; etiam perpenderent, hominum naturas differre inter se plurimum, aliudq; aliq medicamentum idoneum esse, meritò ipsius theriacis accuratã, exquisitam, & uariam, sunt moliti preparationem, ut hoc nomine ipsa in omnibus suũ finem assequeretur, & ob usus necessitatem magno studio eam mortales omnes expeterent. Nihil siquidem inter uitæ incommoda difficilior mihi uidetur deleterijs medicamentis, ac feris noxijs. Primum autem qui antidoto contra ferarum morsus immiscuit feras, fuisse perhibetur Andromachus, Vir me hercules memorabilis, nec multo ante nos natus: q;ppe qui Neroni (cuius affecula fuit) ipsius uires atq; compositionem dicarit. Summa autem descriptionis habet in hunc modum.

Andromachi senioris, Neronis Archiatri, Theriace ex uiperis, cui nomen est Galene, maximè salutaris ad serpentium atq; omnium ferarum icus, pharmaca deleteria, affectiones uentriculi, anhelationes, dolores colicos, morbum arcuaturn, hydropa, phthisin, omnimodam conuulsionem, pleuritidem, uescicæ ulcera, suppressiones urinæ, cruciatus renum, pestiferos morbos, ac deniq; canis rabidi morsus, si pondere fabæ Aegyptiæ

git sanas particulas:

Cicuta sturnos

alit: nos pimit.

Veratrum alit

coturnices: ho-

mines enecat.

Lep<sup>us</sup> marinus

pulmonè exul-

cerat.

Cantharis ues-

cam afficit.

Difficilior i uita nihil reperi-  
ti posse deleterijs medicamentis, ferisq; uiris eiaculantibus.

Andromachi commendatio.

Theriace quibus conueniat affectibus.



Artis scorū the-  
riacorum præ-  
paratio.

Pastillorū scil-  
linorum præpa-  
ratio.

Theriaces anti-  
doti secundum  
Andromachū  
compositio.

sumatur, cū ternis aquæ calidæ cyathis. Igitur captas uere ineunte uiperas, ceruices illis atq; caudas præci-  
dito, quantum arcta pygmæi manus extenditur: nam utraq; parte uenenum gerūt. Postea uerò excoriatas, euisceratasq; ab ipsisq; omni adipe amoto, in fictile uas conijcito, affundēs aquæ quod satis esse uideatur, addensq; germen anethi, ac pauxillum salis recentis, & finito coqui, donec facile à carne ipsæ spinæ amo-  
ueantur. Tunc itaq; carnes ipsas exemptas, cum suffi-  
cienti ad pastillos fingēdos medulla panis purissimi, contundito & læuigato, affusoq; iusculi quod satis esse uideatur, manibus opobalsamo intinctis, conficito or-  
biculos, eosq; in umbra reponito ad totius antidoti compositionem. Dein fermento illine scillam recen-  
tem, non admodum magnam, eamq; in furno uel in patina coque, ut torreātur omnes eius partes ex æquo. Id ubi factum fuerit, partes eius internæ & tenerimæ cum pari portione optinæ farinæ eruinæ contundan-  
tur & læuigentur, atq; in orbiculos digerātur. Verūm Andromachus duplicem portionem eruinæ farinæ adijciendam censeret: quum tamen æqualis modus fin-  
gendis pastillis sit optimus. Hæc ubi facta fuerint, ac-  
cipies pastillorū Theriacorum drac. xxiiiij. pastillorum scillinorū, drach. xlviij. piperis longi, succi papaueris, magmatis, hedyochroi, sing. drach. xxiiiij. rosarū siccarū, iris Illyricæ, glycyrrhizæ, seminis napi syluestris, quem buniada appellant, scordij, opobalsami, cinna-  
momi, agarici, sing. drach. xij. myrrhæ, costi, croci, ca-  
fig, nardi, schoeni, idest iunci odorati, floris, thuris, pipe-  
ris albi, & nigri, dictamni, prasiij, rheu, stœcados, pe-  
troselini Macedonici, calaminthæ, terebinthinæ, zin-  
giberis, quinque folij radice, sing. drach. vj. polij, cha-  
mæpityos, styracis, amomi uux, meu, nardi Gallicæ  
Lēniæ sphragidis, phu pontici, chamædryos Creticæ  
foliorum malabathri, chalcitidis tostæ, Gētiang, anisi,



THERIA. AD PISO. LIB. 453

hypocisthidis succi, carpobalsami, gummi, marathri  
seminis, cardamomi, fefelis, acaciæ, thlaspi, hyperici,  
sagapeni, ameos, sing. drach. iij. Castori, aristolochiæ  
tenuis, dauci seminis, bituminis Iudaici, opopanacis,  
centauri tenuis, chalbani, sing. drach. ij. mellis lib. x.

Vini falerni quod sit satis. Conueniebat tamen prius  
hedychroum unguentum describere, cuius apud Ma-

Hedychroum  
guenti præpa-  
ratio.

gnum talis est præparatio. Aspalathi radiculae cor-  
ticis, calami aromatici, schoeni floris, plu, costi, asari,  
xylobalsami, sing. drach. vj. cinnamomi drach. xxiiij.  
amomi tantundem. amaraci drach. xx. nardi Indiciæ

drach. xvj. foliorum malabathri, drach. vj. myrrhæ  
drach. xxiiij. mastiches drach. vj. Croci drach. xix. Ex-

cipiuntur uino falerno, manibusq; opobalsamo intin-  
ctis, in pastillos coguntur, & assiccantur. Elegit por-

ro Andromachus ex alijs feris solas uiperas ad huius  
præparationem antidoti, q; hæ minus alijs tabificam

uim obtineant. Nam basiliscus, belua sufflaura, & tripli-  
ci frontis apice munita, uel si cernatur tantum, aut si

bilus eius audiatur, actutū hominem perimit. Quod  
si ex cæteris animalibus aliquod attigerit animal à ba-

silisco extinctum, subito etiam exanimatur. Dryinus  
serpens, tam esse perniciosus proditur, ut si qui ipsum

per imprudentiam calcarint, eis pedum plantæ exco-  
rientur, totaq; crura intumescant, periclitenturq; etiam

illorum manus, qui ipsis auxilium tulerint. Hæmor-  
rhus, & hæmorrhoids, adeo inimici sunt homini, ut qui

ab ipsis percussus fuerit, sanguine per os & nares, ac  
per uniuersum corpus effuso, uita fungatur. Cōmorfi à

dipsade, conficiuntur caufonide. Nam & inexpugna-  
bili siti, & æstu uehementi cruciari, interdum & disru-

pri, diem obeunt. Acontias serpens, ubi se multū ex-  
tenderit, ceu iaculum quoddam insiliens corporibus,

ita perimit. Inter aspidēs nominata Pryas, ceruicem  
exporrigens, longitudinemq; interualli metita, uene-

Viperas alijs  
feris minus ob-  
tinere tabificæ  
facultatis: ob-  
idq; ad antido-  
tum ab Andro-  
macho electas.  
Basiliscus con-  
spectus, audis-  
tus ue hominē  
perimit.  
Dryinus ser-  
pens.

Hæmorhus.  
Hæmorrhoids.

Dipsas sitim in-  
fert iexpugna-  
bilem.

Acontias ser-  
pens ut pimat.

Pryas uenenū  
corporibus in-  
spuit.

FFff iiij



**Aspidum** tres  
species.

**Cleopatra** post  
uictum Anto-  
nium, ne uiua  
duceretur Ro-  
mam a Cæsa-  
re, aspide sibi  
mortem cōsci-  
uit.

**Polyxenā** de-  
disse operā, ut  
eū decoro iam  
moribunda ca-  
deret.

**Viperā** ore ex-  
cipere genitu-  
ram a mare,  
ei<sup>9</sup> q̄ caput ab-  
scindere post se-  
men exceptū.  
Viperā pro-  
lem iniuriæ pa-  
ternæ uindictæ,  
matris uētre  
pericindere, at-  
q̄ sic nasci.

num corporibus inspuit. Etenim harum ferarum una  
(tres quippe aspidū sunt species, hæc uidelicet, & cher-  
sea, necnon chelidonia) perhibēt reginā Cleopatram,  
quum uellet latere custodes, citra suspicionē sibi mor-  
tem subitō consciuisse. Nam quum Augustus deuictō  
Antonio eam capere incolumen uellet, ac uiuere, stu-  
diosius q̄; (sicut par erat) seruare, ut Romanis tam insi-  
gnem mulierem in triumpho ostenderet, hæc, re in-  
tellecta, optauit regina adhuc ex humanis potius de-  
cedere, q̄; priuata Romanis cōspici. Quo cōsilio duas  
mulieres fidissimas, Naeram nēpe et Carmionē, quas  
ad pulchritudinem corporis mundo subministrādo ha-  
bebat, ad se uocauit: eis q̄; ius sit ut ferā uuis ficibus q̄;  
tectam importarēt quo (ut dixi) custodes falleret, prius  
factura periculum in ipsis mulieribus, an subitō peri-  
mere posset. Quæ quidem quum actutum periissent,  
ferunt ipsam postea sibi exitium pariter conciliasse:  
fuisse q̄; tandē inuentam, manu dextra capiti admota,  
& diadema, sicut est consentaneum, tenente, ut uel eo  
usq̄; spectatoribus uideretur esse regina: quemadmo-  
dum Polyxenā scribit Tragicus, quæ & ipsa moriēs,  
accuratē tamē dedit operam, ut cum decoro caderet.  
Qua ex re Augustum uehementer fuisse attonitū me-  
morāt: partim ob ancillarum erga reginam amorem,  
ut cum ea mori non dubitarint: partim, q̄ illa genero-  
sam potius mortē maluerit oppetere, q̄; uiuere in ser-  
uitute. Recitauī hanc historiam, ut ex ipsa intellige-  
remus, q̄; subitam id genus feræ nobis pernitiē concī-  
lient. Cæterū uipera inter reliquas omnes feras ca-  
put habet ad inferendum exitium, promptius. Aiunt  
autem ipsam os aperire ad excipiendam genituram  
à mare: qua excepta, illius caput abscindere: atq̄; hunc  
ipsis esse prauī complexus modum: deinde prolem ex  
semine genitam, matris uētre erodere, foras q̄; erum-  
pere, ac sic iniuriæ paternæ uindices, propriā matrem



**THERIA. AD PISO. LIB. 455**

perimere. Mirum autem esse nō debet, si capiribus & caudis præcisīs, reliquæ uiperarum partes, efficacius medicamentum reddant: præcipuè carnes ipsarū, quibus ad seruandum facultas quædam est insita: quum reliquorum animalium etiam pleræq; partes, multis morbis opitulentur. Nonnullis quippe murium capita usta, ex melleq; illita, alopeciam sanare possunt. Milui quoq; caput absq; plumis combustum, si quis ex eo quantū tribus digitis comprehendi potest, bibat, aiūt podagræ opitulari. Cameli cerebrum arefactum, potumq; ex aceto, comitialibus morbis medetur: & mustelæ similiter. Hirundinis cerebrum ex melle, ad suffusiones oculorum conducit: ut ouillum, ad dentitiones infantium. Taurini cornu rasura cum aqua pota, sanguinis eruptionem cohibet: femoraq; combusta, etiam sanguinem supprimunt, ut sæpenumero aluum solutam. Ceruini cornu ramentum adustū, & cum uino tritum, circunlitumq; uacillantes dentes cōfirmat: id quod bouis talus etiā facere perhibetur: qui etiam ex lacte potus, educit rotundos lumbricos, ex oximelite lienem consumit, & leucas tollit illitus, mediocriterq; uenerereus existit. Testiculi castoris poti, conuulsionibus auxiliantur. Stercus bubulum, aridū, combustumq;, trium cochlearium mensura iuuat hydropicos. Muscerda ex aceto trita, alopecias persanat: in potu autem sumpta, lapides uesicæ comminuit. Adeps anserinus inflammationibus cum rosaceo medetur. Cerui medulla mitissimum medicamen existit. Vaccini lactis potus dysentericos adiuuat. Fel hyænx, uisum exacuit. Hippopotami cutis usta, & laxuigata ex aqua, illitaq;, digerit phymata: quemadmodum pellucula uiperæ redacta in pollinem, alopecijsq; imposita, mirè pilos regenerat. Exuuium aspidis ex melle tritum, illitumq;, acutissimum uisum conciliat. Cancer fluuiatilis tritus, illitusq;, spicula & surculos extrahit.

Murium capita.  
Milui caput.

Cameli cerebrum.  
Hirundinis cerebrum.

Cornu taurini

Cornu ceruinum.

Castorium.  
Stercus bubulum.

Muscerda.

Lac uaccinum  
dysentericos  
sanat.  
Viperæ pellucula  
mirè pilos  
regenerat.

Cancer fluuiatilis.

FFff iiiij



**Cantharis.**

Cantharis similiter læuigata, cum bryoniæ radice pota, educit uermes. Scorpius assus, atq; ex pane comestus, uesicæ lapides conterit. Terræ intestinum ex ui-

**Terræ intestinum.**

no assumptum, idem molitur. Tritum & ex melicrato bibitum, arcuatum morbum explodit. Ex rosaceo cerato impositum, podagricis inflammationibus conuenit. Accipiter in susino unguento decoctus, hebetudini oculorum medetur. Scarabæus in oleo frictus, auriq; instillatus, doloribus ipsius auxiliatur. Alauda uita si

**Alauda.**

edatur, mirificè colicos iuuat. Multa etiam, uel conspecta duntaxat, uim suam ostendunt. Stellio quippe ui-

**Stellio uisus ab scorpionibus, eos perimit.**

sus ab scorpionibus, susstringit ipsos & perimit. Amphibenam si quæ mulier grauida supergrediatur, facit

**Amphibena.**

aborsum. Itaq; non est mirabile, si uiperarum cor-

**Viperæ solæ morib; ab ipsismet factis epitulantur.**

pora, amputatis partibus illis, auxiliandi etiam robur obtineant: imò nec si moribus ab ipsismet factis, solæ uiperæ succurrere possint, uel si nobis inimicissimæ sint. Traditur siquidem nonnulla animalia, si sanguinem quidem humanum ex uulnere manantem contingant, commorsos occidere: si uerò uorètur, nec sanguinè degustarint, uulneratos seruare incolumes posse: quæadmodum & de Helenio etiam proditum est: quo nimirum Dacas, Dalmatasq; aiunt cuspides telorum imbuere: quod uidelicet postquam sanguinem uulneratorum attigerit, ipsa occidere possit: quum ab ipsis tamen citra ullam noxam edatur, ceruiq; à sagittarijs per contactum eius enecti, tutò etiam comedi possint.

**Helenii succo infectas sagittas esse letales.**

Iam uerò à crocodilo oblectis, ipsius adipem uulneri impositum, summo esse præsidio nouimus: murisq; aranei morsus equè letales, ab ipso redacto in puluerem, superpositoq; citra dolorem iuari. Similiter qui à uipera sunt percussi, effugiunt periculum, si trita ipsarum corpora uulneribus imponantur. Etenim si quid ueneni in uiperea carne est relictum, id multiplex ea præparatio delet: plurimum autem illi facultatis auxiliatricis

**Muris aranei puluis sanat ab ipso emorsos.**



# THERIACE AD PISONEM. 457

largitur. Cantharis nāq; sola exhibita, uesicam exulce-  
rat, & inimicum est ipsi medicamentum, sæpenume-  
roq; sua facultate uehementi, hominem iugulat: mista  
uerò quibusdam alijs, salutaris uesicæ reddit, urināq;  
uehementer prouocat. Succus etiam papaueris, q̄ po-  
tus per se, admodum perniciosus existat, latere nemi-  
nem arbitror: sin autem cum nonnullis alijs sit præpa-  
ratus, ægros ita subinde iuuat, ut maximè salutiferum  
esse ipsis medicamentum uideatur. Itaq; phrenitico-  
rum deliria sæpe generosè curauit: destitutosq; robore,  
ob diuturnas uigilias, concilians illis somnum, manife-  
stè restituit. Quin etiam ab araneis cōmorsos, ipsi ara-  
nei triti, & cum uino poti, malo liberant. Si igitur solū  
uinum feris mistum, à periculo reddit securos, nimirū  
theriaca maximè salutare medicamē existet, utpote ex  
tot talibusq; confecta pharmacis, quorum, qualitates  
totæ per totas miscentur, & alterantur, conspirantesq;  
in unam eādēq; naturalem temperiem, communem  
quandam facultatem atq; naturā adquirunt, ab ea di-  
uersam, quæ antea singulis inerat. Eligenda tamē sunt,  
explorandaq; singula medicamenta, prius q̄ antido-  
to indantur: solent quippe à fraudulentis hominibus  
q̄ creberrimè adulterari. Vnius autem cuiuspiam, ui-  
tium, subinde uniuersa contaminat. Porrò quum ua-  
rii uariè hanc antidotum preparent, nos compositione  
Andromachi, ceu omnium præstantissima uimur: in  
regiosq; usus eam preparamus. Venari autem oportet  
uiperas initio ueris, quū latebris relictis, foras in apri-  
cum prodeunt, & non adhuc uirus tam exitiale reti-  
nent. Intus nanq; delitescences, quum nulla ex parte  
diffsentur, magis sunt perniciosæ. At egressæ, exu-  
uium, crassum, tegumentum, solent deponere. Qua-  
re non statim ipsas capere oportet, sed permitttere,  
ut aere aliquandiu fruantur, consuetōq; uescantur ci-  
bo, hoc est herbis, buprestibus, cantharidibus, & pi-

Cantharis per  
se, uesicā exul-  
cerat, alijs autē  
admista saluta-  
re illius reddi-  
tur medicamē.  
Papaueris suc-  
ci facultas

Aranei triti po-  
tiq; ex uino,  
morsos ab ip-  
sis, afferunt,  
Theriace cō  
stituentiū phar-  
macorū quali-  
tates, totas per  
totas misceri,  
conspirareq; i  
naturale quan-  
dā cōmuneq;  
omnium tem-  
periem.

Theriace An-  
dromachi præ-  
fertur cæteris.  
Viperæ qñ ve-  
nandæ.



Viperæ quales  
sunt deligendæ

Viperæ fœmi-  
næ masculiq;  
discrimina.

Theriaces con-  
ficiundæ ratio.

Theriace repo-  
nendi ratio.

Theriace duo-  
decim annis  
ad perfectionē  
cōcoqui effect;  
validam vsq;

tyocampis. Eligendæ autē sunt colore sufflauæ, \* exi-  
mia quadam agilitate mobiles, ceruices admodū extē-  
sas habentes, oculos q; tum inflammatos, tum impu-  
dentes, atq; adeò intuentes ferinum. Sint etiam latiore  
capite, corpore autem atq; uentre crassiori, meatum q;  
habeant magis ad extremum caudæ locatum: quæ nō  
inuoluta, sed potius conuersa esse debet: ac deniq; tran-  
quillum incedant: qua sanè re à masculo distinguit fœ-  
mina: q; q; caninos dentes habeat plures duobus. Iam  
uero si caudis capitibus q; amputatis, exanguia proti-  
nus, imobilia q;, ac prorsus mortua, ipsa animalia cer-  
nantur, ad medicaminis compositionē non conferunt.  
At si motum, sanguinem q; cōseruare aliquandiu pos-  
sint, tunc eas, ceu præstantissimas coques ad conficien-  
dos trochiscos, quatenus dictum est. Porro medicamē-  
ta reliqua, contundere, cribro q; incernere q; subtilissi-  
mo oportet: nam leuia insigniter admodum mihi iuuau-  
re uidentur, q; facilius apponantur corporibus. Quæ  
conspergenda iæuiganda q; sunt, ea uino Phalerno iæ-  
uigentur & conspergantur. Deinde omnibus in hunc  
modum contritis, Hymettii mellis mediocriter cocti,  
libras denas adijcies. At resinam chalbanum q;, scor-  
sum prius eliquata, in mortario postea ipsi medicamē-  
to immiscebis: omnia q; tandem manibus modicè opo-  
balsamo intinctis, simul atq; accuratè confundes: atq;  
itaq; antidotum in uitreis aut argenteis uasis repones.  
Non autem uehementer ipsa replebis, sed relicto quo-  
dam spatio, quo medicamentum perspiret. Quare fre-  
quenter operculum detrahes, ut & liberius exhalet, &  
maturior tibi ipsius usus contingat. Quippe haud mo-  
dico tempore ad concoctionē indiget, ut quando usus  
postulet, antidotus probè sit cocta. Concoquitur autē  
plurimum duodecim annorum spatio. Cæterum qui  
uigentiore ipsa uti uolūt, etiam quinto anno, septimo q;  
eam exhibent: præsertim ijs qui à uirulentis bestijs



# THER. AD PISONEM 459

& à cane rabido sunt commorſi: nec non in medicamē  
tis letalibus. Eſt autem potens medicamentum aduſq;  
triginta annos. Nam in alijs affectibus, ubi tanta noxe  
cauſa nō eſt, ſufficere uidetur, quum uſus exigit, etiam  
ſexagenarium. Etenim ubi huius antidoti facultas eſt  
ualida, ſi ſumatur poſt pharmacum purgans, eius ope  
rationem ſupprimi; ſi uerò imbecilla, minimè purga  
tionem impedit. Iuxta differentias autem affectuum,  
ipſius medicamenti quantitatem metimur, congruumq;  
miſturæ modum adminiſtramus. Siquidē præter affe  
ctus dictos, capitis diuturnos dolores atq; uertigines  
ſanat, auditusq; difficultatem, & oculorum hebetudi  
nem corrigit. Comitialibus etiam opitulatur, reſcien  
tesq; ſanguinem plurimum iuuat, ſi quis ipſam cum  
ſymphyto decoctam, dilutamq; ex aqua exhibuerit. In  
super inteſtinorū uermes exterminat, hepaticos & lie  
noſos reſtituit, dyſenterias, lenterias, uoluulosq; præ  
fertim quum inteſtina uacant inflāmate, perſanat.  
Præterea quum corpus multis & copioſis ſudoribus  
diffluit, ipſiusq; robur eſt exolutum, nec morbus uini  
potionem admittit, theriace epota ſudorē ſiſtit, & col  
lapſas uireis corroborat. Iam uerò in mulieribus etiā  
menſes educi, & uteri ſedisq; ſuppreſſas hæmorrhoi  
das ſubinde aperit. Nam quum uaria miſtaq; ſacul  
tate ſit prædita, ideo alia diffundens, extenuansq; co  
git ut excernantur: alia ob uirtutis imbecillitatem præ  
ter modum fluentia, ſolet, uires inſtaurans, cohibere.  
Quinetiam uniuerſis articularibus morbis auxilio eſt,  
quum præterierit augmenti tēpus, uigorisq; ſtatus ac  
ceſſerit. Tunc nāq; fomentis dolorem leniens, antido  
tum ppinabis: quæ ſanè fluxiones inſarctas diſcutiet,  
& irruētes arcebit. Prodeſt theriace & ſanis, ſi crebro  
ipſam aſſumant. Hoc auxilio uſi ſæpe ſuccurrimus ele  
phlāticis. Nec uerò corporis tantum, ſed animi quoq;  
affectibus auxiliatur. Quippe melancholicis uitijſ, ſi

ad, annos. trigi  
ta, iuuareq; et  
ſexagenarium

Theriace pro  
bandæ ratio.

Theriace qui  
bus opituletur  
affectibus.

Theriace cor  
poris & animi  
affectibus au  
xiliatur



Quartanæ fe-  
bris curatio.

Aquæ pauoris  
omniū morbo-  
rū pessimi de-  
scriptio.

Canis rabidi  
notæ.

Morsus a rabi-  
do cane contra  
cui, curatio.

Morsum rabi-  
di canis esse  
conseruandū.  
apertū, ut mi-  
nimum quadra-  
ginta dies.

Theriace etiā  
admotā vulne-  
ri, auxiliari ca-  
nis rabidi mor-  
sui.

sæpe exhibeatur, medetur, ipsam atram bilem exhau-  
riens: quare pulchrè ad febrem etiam quartanam con-  
uenit, quādoquidem ab atra bile trahit ortum. Ego igitur  
multos laborantes quartana, hoc præsidio facillè li-  
beraui. Nam uomitu prius secundum cibum ipsos eua-  
cuans: deinde in sequenti die succū absynthij exhibēs,  
ita horis duabus ante accessionem, ppino antidotum,  
protinusq; æger frequenter liberatur ab accessione.

Aquæ etiam pauorem, omnium morborum pessimū,  
qui morsos à cane rabido sæpe inuadere solet, tollere  
hoc medicamen consuevit. Quo quidem morbo corre-  
pti, aquam timent, ac propter multam ariditatem, hu-  
midi desyderio tenentur: cæterum à potu abstinēt,  
quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non con-  
syderant. Proinde fit, ut aquam fugientes, inarescāt, &  
conuellantur; ob febrem qua intus uruntur: miserrimi-  
moq; tandem mortis genere intereant. Canem porrò  
furentem & rabidum, ab eo qui nihil tale perpeßus sit  
facillè dignoscere licet. Siquidem si audieris gracilem  
corpore, siccum, oculis inflāmat, cauda demissa, spu-  
mante ore, lingua exerta, eaq; bilis colore infecta, ob-  
uium quemq; infilijße, citraq; rationem cucurrisse: de-  
inde rursus subito uolentem consistere, furore quodā  
insano percitum, momordisse non sibi antea præuisos:  
hæc inquam si in eo sic habere intellexeris, statim rabi-  
dum esse canem intelliges. Quare uulnus ab ipso illa-  
tum longè uastius efficies, carne multo interuallo orbi-  
culatim præcisa, ne facillè ad cicatricem perueniat: sed  
foramen diu, quadraginta ut minimum diebus, pates-  
cat, ut per ipsum canis uirus emanet. Cauterijs igitur  
admodum candentibus locū solemus adurere, et alijs  
uti medicamentis, quæ extrahendi uim obtinent. Ego  
uerò antidotum ipsam rosaceo mistam aliquando in  
uulnus indidi, ut cucurbitulæ instar exugeret, ab altoq;  
uirus ipsum extraheret: ut quæ nō modò epota, sed etiā



admota extrinsecus rabidorum moribus presentaneū  
remedium existat. Sed neq; ad pestilentem luem (quæ  
& ipsa ueluti fera quædam existens, ab aeris putredine  
exorta, per inspirationes insiliens, haud unum aut alte-  
rum hominem, sed plures quoq; ciuitates depascit, ua-  
stat, & populat) reperire est aliud efficacius remediū.  
Nam quemadmodum cōstat Diuum illum Hippocra-  
tem, per solam alterationem aeris, discussisse olim ab  
Athenis pestilentem eius cōstitutionem, nimirum per  
totam urbem ex aromaticis lignis, & suauissimis flori-  
bus, uarijs pyris extructis, ut aerem purum hoc modo  
redditum, inspirarent homines in mali subsidium: si-  
mili ratione theriace, ceu ipsa quoq; ignis quidam pur-  
gatorius existat, præsumentes quidem ipsam in pesti-  
lenti aeris statu, neutiq; malo corripī sinīt: correptis au-  
tem mederi potest, malitiam inspirati aeris inalterās,  
nec ipsam amplius grassari permittēs. Quare in pro-  
spera quoq; ualitudine, ut crebro utaris hac antidoto,  
consulo, sed præcipuē dum per horridam hyemē iter  
facturus es. Iam uerō antidotus hæc sensus omnes cō-  
firmat, acuit mentem, adeoq; ob uarietatem miscellæ,  
ab iniurijs corpus securum facit, ut ne à deletherijs qui-  
dem euinci possit: ut fertur de Mithridate, qui non the-  
riace (ut quæ nōdum erat) sed alia antidoto, quam Mi-  
thridation appellauit suo nomine, præmunitus, nō po-  
tuit ueneno interire. Quum enim à Pompeio uictus,  
in extremis cogeretur sibi sano per uenenum mortē  
conciscere, medicamento copioso epoto, ipse quidem  
ob presumptam antidotum, defungi uita non potuit: si-  
liæ autem, quæ ob eximium erga patrem amorem, op-  
petere cum eo mortem uolentes, idem medicamētum  
hauserunt, subito animam exhalarunt. Quod Mithri-  
dates sentiens, Pysto suo familiari iniūxit, ut ipsum iu-  
gularēt: qui pharmaci opus absoluens ferro, eum mo-  
ri uiolenter coegit. At uerō theriace utendum est post

Pestilētē luē  
esse ueluti fe-  
ram quādam,  
ab aeris putre-  
dine exortam,  
eiq; nihil effi-  
caciū theriace  
Pestilentiā ab  
Athenis abe-  
git Hippocra-  
tes, per totā vr-  
bē varias py-  
ras ex materia  
aromatica ex-  
truens.

Theriaca, ceu  
ignis purgato-  
rius existit

Mithridates p-  
munitus anti-  
doto, uinci a  
ueneno nō po-  
tuit, ac proin-  
de opus medi-  
camenti perfe-  
cit ferro.



Theriace vten  
dum esse post  
absolutam co-  
ctionem,

Theriaces pro  
pinandæ quan-  
titas.

Theriaces v-  
sus qbus atati-  
bus & tpiibus  
congruat, et q-  
bus minime.

Theriace cor-  
pora puerorū  
dissoluit.

Aurum iudica-  
ri per ignem.

Ferum igne  
mollescere.

Viperas cōbu-  
stas, salutare  
ab igne reddi,

absolutam coctionem, interdum quidem instar Aegyptiæ fabæ, cum binis aquæ cyathis, ubi exiguum ad coctionem ipsius intervallum erit: interim uerò auelanæ nucis magnitudine, ex tribus aquæ cyathis, quū plus temporis ad pharmaci distributionem es habiturus. Cæterū per æstatem neutiq; id pharmacum capere consuluerim. Similiter ætate florentibus, calidis si misq; naturis, nec multum, nec sape id exhibendum censeo: ijs uerò qui iam inclinant, & plurimum, & crebrò, non ex aqua, sed ex uino, ut propinetur, suadeo. In pueris omnino uitandum id medicamen est: ut quod facile corpora eorum dissoluat. Memini siquidem aliquando puellum ex intempestiuo usu antidoti dissolutum fuisse.

#### De salibus theriacis.

**S**ales theriaci ad prædictos etiam affectus faciunt, modicè tamen ac longo tempore. Neq; enim euanescit ipforum facultas, tametsi ex cōbustis uiperis cōficiantur. Multa siquidem euadunt ignis commercio meliora: aut latentem naturam edunt. Aurum quippe iudicamus per ignem: adulteratumq; igne coarguitur: ac flamma exacte purgatum, esse probū apparet. Ferrum igne mollescit, flexūq; nobis ad multos uitæ usus est aptum. Nunquid etiam plurima quæ ingeruntur in corpus, nutriendis nobis ignis beneficio idonea redduntur? Etenim (ut alia præteream) uinum statim ab uuis præssum, est crudum: a Solis autem igne concoctum, suauissimū & maximè potabile reddit. Chalcitis etiā, cruda quidem corpora exurit: cocta uerò cicatricem inducit corporibus. Lapis phrygius crudus, acerrimus est: ignitus & cum alijs quibusdam tritus, fit oculorū præsentaneum remedium. Spongiæ combustæ cinis, sanguinis fluxionem potenter inhibet. Viperæ itaq; simul omnes integrèq; combustæ, insitam prauitatem deponunt: ab igneq; salutare redduntur. Peculiariter



# THER. AD PIOSONEM 463

autem sales medentur maximè affectibus per summā cutem obortis, leucis enim dico, lepræ, atq; agresti im petigini: abiguntq; pedunculos, propriè ex corruptio ne enascentes. Præterea dentes optimè abstergunt, erodiq; ipsos nō permittunt, ac flaccidas gingiuas con densant, earumq; fluorem atq; putrilaginē reprimunt.

Sales Theriaci quibus auxiliē tur affectibus.

Præparatio autem eorum est talis. Vipera prædi ctis similes, & eodem tēpore captæ, numero quatuor, non biduo post uenationem sumuntur. Præstiterit ta men si eodem die quo sunt captæ, ijs utaris. Dein salis ammoniaci, uel cōmunis, colore albi, & leniter splen dentis, modius Italicus. Cum quo tunduntur minuta tim, Gentianæ Creticæ, lib. j. S. aristolochiæ rotundæ, tantundem. Centaurij tenuis come, lib. ij. cardamomi, Armeniaci præsi, sing. vnc. vj. Scordij mōtani, selini, chamædryos Creticæ sing. lib. j. rutæ satiuæ seminis, tantundem. Melle Attico hæc uniuntur: & selibra ip sorum in ollam fictilē uacuam coniicitur. Postea qua tuor serpentes uiuæ: mox scillæ teneræ, admodumq; recentes, quinque numero, conciduntur minutim: ita re liqua aliorum pars dimidia adijcitur: atq; ubi coope rueris ollam, lutoq; diligenter obliueres, quatuor fora minibus ipsam pertundes, ut per eam uapor coctionis mensuram indicet. Nam primūm fumus copiosus, ob scurus, turbidusq; expirare uidebitur, notans ignem iam inuasisse bestias: quē quidem ne inspires ipse, tibi summè cauendū est. Postea ubi uapor cessauerit, et te nuem quandam flammam per foramina exhibere con spexeris, tunc ipsa exquisitè esse cocta censeto: atq; ita ollam ab igne tollito, tota eam die ac nocte refrigerās. Deinde exemptos carbones, diligenter eos tundo, & cum his quæ subdam, incernito. Rutæ agrestis semi nis, hyssopi Cretici, sing. vnc. ix. agrestis fœniculi se minis, nardi Celticæ, stachyos Scythicæ, sing. vnc. vj. petroselini Macedonici, vnc. iij. amomi uuæ, vnc.

Sales Theria cos præparandi ratio.



iij. origani heracliotici summitatum, vnc. ix. hormini se-  
 minis torrefacti, vnc. iij. thymi Attici summitatū, vnc.  
 ix. Malabathri Indici fol. vnc. iij. baccarum iuniperi  
 Laconici carnis, lib. ij. coriandri satiui sem. vnc. vj. pi-  
 peris albi & nigri, sing. vnc. ij. silphij rad. vnc. x. zingi-  
 beris, lib. ij. satyrj sem. uel rad. pulegij montani, seselis  
 Massaliotici rufi, tortili montani seminis, mēthe, sing.  
 vnc. vj. cassiæ optimæ vnc. ij. cinnamomi vnc. j. Rur-  
 sus omnia contundito, concernitoq; & reponito in ui-  
 treis uasis: neq; utaris ipsis nisi post dies ferè denos.  
 Porro ego sales ipsos aliàs preparauī, non uiperas, sed  
 earum loco, tantundem theriacorum pastillorum, unā  
 cum alijs medicamentis comburens: qua industria ip-  
 sos longè præstantissimos feci.



F I N I S.



Quæ habentur in libello de theriaca ad  
 Pamphilianum, ea omnia huic qui  
 ad Pisonē inscribitur insunt  
 lōge cumulatiora. Qua  
 illum ex industria  
 reliquimus.

Galenī



469

**G A L E N I P E R G A**  
**M E N I D E A N T I D O T I S**  
**L I B E R P R I M V S .**



**M**EDICAMENTA quæ nō extrinsecus corpi imposita, sed intra ipsum assumpta, affectibus auxiliantur, antidotos Medici appellant. Tres autem in uniuersum differentiæ ipsarū existunt. Nonnullæ siquidem letaliū medicamentorum gratia offeruntur: quædam contra uirulentas feras opitulātur: aliæ affectibus ex praua uictus ratione obortis succurrunt. Sunt quæ tres hosce polliceantur usus, ut theriace ab Andrcmacho præparata, quæ Mithridation dictam ab usu hominum relegauit. Siquidem quum theriace haud exiguam uiperarum carnem contineat, hoc nomine ad uiperarum morsus præstantior q̃ Mithridation existit. Ad alia uerò Mithridation nihilo minus ualet: imò est etiam in quibus præstantius se exhibeat. At non easdem uires obtinent ipsæ antidoti, & post noxia medicamenta, & ante eadem assumptæ. Nam quæ ipsarum quantitas, quum p̃sumuntur, sufficit ut hoīem illegsum custodiat, ea quadruplo, aut quicuplo aucta, quum post uenenū datur, auxilio est: idq; non semel quotidie, sed bis. Quod si quis etiam singulis diebus, quemadmodum nostro sæculo Imperator Aurelius Antoninus, uel ut ipse Mithridates, medicamentum capiat, omnino à deleterijs uenenis erit securus: ut Mithridatem ferunt, quum exitiali hausto medicamento, potius mortem oppetere, q̃ subijci Romano Imperio, elegisset, nihil reperisse, q̃ perimere ipsum potuerit. Porro Antoninus summo studio, singulis diebus ex ipsa theriace, instar fabæ Aegyptiæ, deglutiebat citra ullum liquorē: à qua postea,

Antidoti quæ dicantur.

Antidotorum tres differentiæ.

Theriace, Mithridatium ab usu expulit.

Antidotos dū post uenenum dantur, liberius esse exhibendas, q̃ si p̃sumerentur.

Mithridates cōmunitus antidoto, perimere se ueneno non potuit. Antonin⁹ Imp. singulis diebus utebatur theriace, instar Aegyptiæ fabæ.

Tomus IIII.

G G g g



quum in quotidianis actionibus premeretur sopore, detraxit papaueris succum. Rursus autem quum cruciaretur uigilijs, coactus fuit ex Theriace inueterata, ceterum ex opio confecta, aliquantulum addere. Quippe

*Antidoti vetustiores, papaueris lachrymam longe mitiorem possident.*

*Galenus medicamentorum conquirendorum gratia, uarias plurimas regiones explorandi ratio, Mel optimum quale nam esse debeat.*

eiusmodi medicamenta, si uetustiora sint, ipsam papaueris lachrymam longè mitiorem obtinent. Danda autem maximè opera est, ut medicamenta ex quibus huiusmodi antidoti præparantur, quæ exploratissima sint: quandoquidem passim solent adulterari. Quæ quidem ut exquisitissima haberem, ipse inuisi alias tum Cyprum, tum Palestinam Syriam nauigauimus; in Lemnum. Porro in quo singula medicamenta alijs gustu aut odore præstant, in illo sanè, id quod ualidum est, principè inter similia specie, sibi uendicat locum. Sic enim mel dicimus præstantissimum esse, quod dulcissimum & acerrimum inter omnia alia fuerit: quodque colore pallidum, media sit consistèntia, defluensque sensim, suam cōtinuitatem tueatur. Danda autem opera est, ut quod uinum hisce medicamentis miscetur, ualidum atque firmissimum sit, ita ut non immutetur amplius. Etenim imbecillima & aquatissima uina, aut uehementer austera, maximèque omnium uinorum acescentia (hæc enim sunt alba & tenuia) ubi præuenerint primis annis acescere, reliquo tempore permanet. Hæc autem ut caput minimè feriunt, sic nec corpus manifestè calfaciunt, nec concoctioni in uentriculo & uenis quicquid perspicuè conferunt, nec alendo corpori subministrant: quauis inter omnia uina celerrimè inueterentur: hoc est, promptè in ueterascentium qualitatem mutantur: quæ qualitas, acrimonia est cum perspicuo calore: postea uerò, amaror, in quem acrimonia mutatur. Ceterum ut uina ipsa uel acorem, uel amaritudinem contrahant, locus in quo asseruantur reposita, confert. Qui quidem optimus initio est frigidus: postea uerò calidus, aut e contrario, calidus per initia. Nam tepidus, facillè ipsa in aco-

*Vina, quæ celerrime oium inueterentur.*

*Veterascentium uinorum qualitas est acrimonia cum perspicuo calore, cui postea succedit amaritudo.*

*Vina reponendi ratio.*

*Tepidus locus uina in acore uertit.*

reponendi ratio. Tepidus locus uina in acore uertit.



rem uertit. Nonnulla autē sunt adeò imbecilla & aquo-  
sa, ut ne initio quidem frigus tolerant. Ac talium custo-  
diēdorum gratia, Pater meus stœbe copiosa calidaq;,  
in calidissimam domum coniecta, uasa repleta occul-  
tabat: qua industria usus, nunq̃ habuit acidum uinum,  
sed celerrimè omnia ueterascentia. Quo autem nunq̃  
ab scopo aberraret, uasis infundebat uinum non nouis,  
sed ex quibus aliquod iam uetus uacuasset: curabatq;  
ut furni, fociq; in proprinquo ipsi thecæ uinariæ essent:  
qua ratione etiam in multis Italiæ locis uinum calfie-  
ri intellexi. Verū quæ in hunc modum parantur  
uina, ut firma durabiliaq; sunt, sic capitis dolorem con-  
ciliant, propter fumi qualitatem quam contraxerunt.  
Itaq; eiusmodi omnia uina in medicamentis compo-  
nendis, quæ intra corpus sumenda sunt, euitabis. In  
emplastris uerò, & alijs quæ extrinsecus imponuntur  
medicamentis, etiam talibus uti, si meliora desint, nihil  
prohibet. Ad antidotos ergo Phalernum uinum, quod  
nondum præ uetustate amaricet, optimum est. Præ-  
stat autē ad theriacem deligere id quod dulcius fuerit,  
gratia gustus gratoris: cuius sollicitudo in medicamē-  
tis quæ deglutuntur, habenda est. Iam uerò mel om-  
ne uetustum, redditur ex coctione amarum: neq; id mi-  
rum est, quum uel citra cocturam, tēpore amarius ex  
dulciori reddatur. Quare quod fuerit inueteratum, fu-  
giendum ad antidotos est. In uniuersum autem, Me-  
dicum debere esse peritum omnium stirpium, aut plu-  
rimarū, oportet. Siquidē compositorū medicaminū uir-  
tus uires simplicium sequit̃: exigua quadā, in ipsa con-  
posituræ ratione differentia obueniente. Differentiæ  
autem stirpium sunt, arbores, frutices, herbe, sping, uir-  
gulta. Porro theriaces compositio quam descripsit car-  
mine Andromachus, habet in hunc modum.

Stœben cōdu-  
cere ad celerē  
concoctionem  
uinorum.

Vina quæ ma-  
turuerunt præ-  
sidio ignis, ca-  
pitis dolorem  
conciliant.

Vina antido-  
tis emplastris,  
q̃ commoda,  
qualia esse de-  
beant.

Mel uetustum  
ex coctione a-  
maricat, id qd̃  
tēpore uel ci-  
tra cocturam  
perpetitur.

Compositorū  
virtus, vires  
simplicium se-  
quitur.

Stirpiū differē-  
tiæ quæ sunt.

Hinc recitat Galenus carmina Andromachi, ac de

GGgg ij



inceps rationem conficiendæ Theriaces explicat, quæ omnia cōsultò reliquimus, q̄ sint prorsus eadem quæ habentur in cōmētario ad Pisonē. Itaq; ea tantū anno tabimus impræsentiarum, quorū in illo non meminit.

Galenus.

Viperas venā  
di ratio.

**Q**uod pertinet ad uiperarū capturas, neq; iuxta marina loca, aut aquas falsuginosas uenandæ sunt. Quippe antidotum ex huiuscemodi compositum uiperis, s̄tim conciliat. A foetis etiam est abstinēdum. Iam uerò, dum coquuntur, salis inijci debet, si quidem conuenienti tempore uiperas cœperis, modicum: sin

Artifcos The-  
riacos conficiē  
di ratio.

autem æstate, nihil. Panis ad conficiendos artifcos so-  
leo miscere ipse uipereis carnibus quartam, aut quin-  
tam partem. Qui nisi probè sit tostus, uerēdum est, ne  
pharmacum ipsum acescat. Satius autem est ut multo  
citius siccentur, aridum panem cum ipsis carnibus ac-  
curatissimè læuigare, ac sic tenues orbiculos fingere:  
q̄ si etiam brodium uiperarum affundas. Reponi autē  
debent ubi assicati fuerint, in uase stanneo, uitreo ue,  
aut aureo. Cæterū uitreum quidem & aureum, nul-  
lum dolum admittit: stanneū uerò, adulteratur plum-  
bi mistura. Tale igitur uitare conuenit in uniuersis an-  
tidotis: ueluti & quod argento non purgato cōfectum  
est. Celerrimè nāq; & huic ærugo oboritur. Durat ui-  
gor ipsorum orbiculorum, si curiosè sint resiccati, & re-  
positi, tribus & quatuor annis. At scillini trochisci,  
ex tribus scillæ optimè toste ptibus, & duabus tenuis-  
simæ farinae crui, similiter conficiuntur.

Vasa vitrea  
vel aurea nul-  
lum dolum ad  
mittere, stānea  
aut adulterari  
plūbi mistura  
ac p̄inde able-  
ganda ab an-  
tidotis.

Scillonorum  
confectio.

Post hæc subdidit Gale. descriptionem magmatis  
Hedychroi, quam habes in commentario de theriaca  
ad Pisonem.

Galenus.

Piper longum  
adulteratū affu-  
sa aqua soluit.

**E**X medicamentis quæ theriacem constituunt, lon-  
gū piper solet adulterari. Cæterū adulteratum



quidem, affusa aqua soluitur: quod uerò adulterio caret, insolubile permanet. Contra autem, uerum sagapenum, statim aqua rigatum soluitur: quod non tale est, eliquescit minimè. Sciendum autem est, chalbanipartem, in sagapenum degenerare. Similiter etiā optima cassia in cinnamomum transit. Nec secus in optima myrrha opocalpason reperitur, ab ipsa myrrha diuersum. At opocalpason est letale: multisq; ob inscitiam myrrhæ, quæ opocalpason continebat, conciliauit exitium. Nam de industria nonnulli antidotum præparatum, ipsam ut laudatissimam iniecerunt: quod collyrijs inditam, optimum esse medicamentum uiderent.

Quemadmodum igitur in pueris gemellis inuicem similibus, qui quidem nō eis assueuerunt, alterū ab altero nequeunt discernere: ijs autem qui unā uixerunt, facillima est ipforum dignotio: ita qui inter singula medicamenta est uersatus, facilè uel minimas eorum differentias cognoscit, quæ latent illos, qui ipsa semel tantum, aut bis, conspexerint. Rosæ ad theriacem eligendæ sunt alijs omnibus rubentiores, atq; odoratæ magis. Vnumquodq; siquidem præstantissimū est, quod proprium generis sui odorem ualentissimū possidet. Præstant etiam in quolibet genere, nō rugosa, neq; exilia, sed quæ probè nutritam, solidamq; consistentiam sortiuntur. Scordium optimum, ex Creta nobis aduehitur, quod quidem cadauera supra ipsum iacētia, diutissimè tueri à putredine proditur. Opobalsamum aduultera plurimis modis, quos premo, ne quis sorte doctrina mea abutatur. Quare neq; eos probo, qui scripturas letaliū medicamentorū inuulgant. Porro cinnamomum optimū debet odoratissimum esse, gustāti calidū, colore aut tale, ut si quis lactis colorē fusco admiscuerit, cum coerulei pauxillo. At agaricum (quod sanè adulterium nullum admittit) laudatissimum est quod leuissimum: ut densum, graue, & lignosum, deterrimū.

Sagapenum aqua rigatum soluitur.

Chalbanipars transit in sagapenum.

Cassia in cinnamomum conuertitur.

Opocalpason est letale, reperiturq; in myrrha.

Præstantissimum esse medicamentū quod propriū generis sui odorem ualentissimum possidet.

Scordium cadauera incorrupta tueri,

Letaliū medicamentorum doctrinam inuulgandam nō esse.

Cinnamomi optimi notæ. Agarici optimi notæ.

GGgg iij



**Croci optimi  
notæ.**

**Carpesij fa-  
cultas.**

**Spica nardi ra-  
dix est, sed ob  
similitudinem  
quam cum spi-  
cis habet, sic  
appellatur.  
Rheon adulte-  
randi modus.**

**Rheon esse ve-  
hementer astrin-  
gens gustui.**

Crocus optimus est, qui flauissimus, odoratissimusq; existens, longo tempore in uigore perdurat. Iam uero in cinnamomi penuria, duplicata cassiæ portio inijcienda est. Carpesio etiam sæpe loco phu utimur. Est enim similis genere cum eo facultatis, sed ualentioris: nonnihilq; odoratum refert. Sunt enim tenues festucae, surculis cinnamomi persimiles. Nardus Indica, quæ radix quidem est (licet ob similitudinem formæ quâ cum spicis habet, spica nardi uocetur) nō est emenda elota. Vnguentarij quippe, coquentes prius eam, ut ad alia ipsius decocto utantur, postea inutilem uendunt. Rheon quoq; ipsum adulteratur. Quâdoquidem statim in regionibus ubi gignitur, recens nonnulli capientes ipsum, decoquunt, donec totum cremorē reddat: quem postea cremorem, ubi accuratius percoxerint, ceu purum, atq; ab aquæ mistura alienum, ad nos transmittunt: sicuti & rheon ipsum siccatum, tanq; neq; id prius cocturam fuerit expertum. Cognoscetur tamen facilè dolus: nam eiusmodi rheon nec densam, compactam ue substantiam possidet, ut quod integrū est, sed rarius apparet, astrictionemq; aut obscurā, aut planè nullam gustanti exhibet: quam tamen rheon uigens ualidissimam possidet.

Deinceps Galenus modum præparandæ Theriacæ tradit: qui quidem iam expositus est, in commentario ad Pisonem. Subiungit etiam cōpositiones eiusdem antidoti, à Damocrate, atq; etiam Critone proditas, quas quidem (quia descriptionem Andromachi unicè cōmendat Galenus, eiq; esse inhærendum censeret) studiosi breuitatis ommittimus.



471

# GALENI PERGA

## MENI DE ANTIDOTIS,

### Liber Secundus.



**Q**VANDOQVIDEM de the-  
riace toto priore libro tractauimus,  
in præsenti de cæteris antidotis disse-  
ramus, ab ijs quæ Andromachus de-  
scripsit, exorfi.

Antidotus Mi-  
thridatia, ad letalia peculiariter effi-  
cax, ad omnesq; internos affectus. Dulcis radiculae,  
drach. viij. S. obolos. iij. opij drach. iij. obol. ij. castorei,  
drach. vj. polij, drach. v. obol. ij. costi tantundem. spice  
nardi, drach. vj. obol. ij. casia drach. v. obol. ij. thuris  
drac. vj. seseleos drach. v. obo. ij. hypocisthidis succi,  
drach. vj. achori drach. ij. scordiij drach. vj. obol. ij. fo-  
lij drach. iij. salis drach. vj. cypheos. drach. vj. obol. ij.  
myrrhæ drach. vj. croci drach. viij. obol. ij. cinnamomi  
tantundem. styracis drach. v. obol. iij. dauci seminis  
drach. vj. obol. ij. zingiberis drach. vj. obol. ij. phu Pō  
tici drach. ij. petroselini, drach. iij. obol. ij. nardi Gal-  
licæ, sceniculi seminis, nardi Indicæ, sing. drach. iij. hy-  
perici, acaciæ, utriusq; drach. ij. gentianæ drach. iij. ani-  
si, drach. iij. Thlapsi drach. vj. obol. iij. meu athaman-  
tici drach. iij. rosarum siccarum, cardamomi, sing. dra-  
ch. iij. gummi, drach. ij. iunci odorati rotundi. drach. vj.  
obol. ij. opopanacis tantūdem. opobalsami drach. vj.  
obol. iij. chalhani drach. viij. scinci drach. ij. obol. ij. re-  
sinæ terebinthinæ drach. vj. obol. ij. uini Chii. quod sit  
fatis, mellis Attici cocti quantum sat esse uideatur.

Conficito. Antidotus Aelii Gaii, ad letalia & ui-  
rulenta omnia: quæ, si inspergatur ubi frequentant ser-  
pentes, eos fugat. Facit ad omnem oculorum fluxum,  
& reliquarum partium. Discutit omnes molestias ani-

Antidoti Mitri-  
datiæ descri-  
ptio.

Antidotus  
Aelii fugans  
serpentes, ad  
cōpluresq; af-  
fectus p̄ utilis.

GGgg iij



mi, febresq; longas & circuitu repetentes perfanat. Adhæc, menses, foetusq; absq; difficultate educit, auxiliaturq; phthificis, auellanae nucis instar epota, cū aquæ cyathis quaternis. Ad uipereos tamen morsus, ex uino exhibetur. Myrrhæ drach. xij. croci, nardi, utriusq; drach. xij. iunci odorati rotundi, drach. xij. cinnamomi drach. ij. amomi drach. iij. chalbani drach. ix. resinæ terbinthinæ drach. v. piperis albi drach. x. longi drach. xxxij. costi drach. viij. thuris drach. xij. lachrymæ papaueris tantūdem. scordii, drach. L. polii drach. iij. hypocisthidis succi drach. xij. petroselini drach. viij. seselis drach. xiiij. dauci seminis drach. xvj. opobalsami drach. xij. opopanacis tantūde. castorei, drach. viij. mellis Attici, sextar. ij. Conficito.

Antidotus ex  
sanguinibus a  
Damocrate  
scripta.

Damocratis Antidotus ex sanguinibus ad uenena. Sanguinis anserini, & marinæ testudinis, & anatis, & hædini, siccorū omnium, sing. drach. ij. Myrrhæ stillatitiæ, spicæ nardi, sing. drach. x. cinnamomi drach. vj. rosæ fol. sic. drach. viij. iunci rotundi, thuris, costi, sing. drach. j. amomi, piperis albi, utriusq; drach. iij. piperis longi, drach. j. S. croci drach. xij. castig. drach. viij. trifolij radices, drach. v. polii tantūdem. opobalsami drach. iij. petroselini, drach. iij. baccarum iuniperi, acori, rheu pontici, meu, dictāni, phu, ammoniaci thymiamatis, fœniculi, sing. drach. ij. agarici drach. ij. S. saxatilis rutæ, drach. iij. dauci, drach. ij. anisi, asari, ameos, cumini, sing. drach. j. S. sem. napi syluestris, drach. iij. scordii Cretensis, drach. v. mellis optimi duplum omnium. Detrita omnia, coctoq; melle excepta, uasis indito.

Rosaceorū pa-  
stillorū confe-  
ctio ex Damo-  
crate.

Rosacei pastilli confectio ex Damocrate. Rosæ uirentis foliorum, lib. iij. iunci rotundi, drach. xx. myrrhæ drach. xij. croci drach. viij. Contusis rosis atq; per setaceum transmis- sis, addantur reliqua cōminuta: ac postea rursus simul tundantur, rediganturq; in prægrandes orbiculos.

Crocomagma-  
tis preparatio.

Crocomagmatis preparatio Croci Cilicij drach. C.



myrrhæ pinguis, rosarum siccarū, amyli, gummi sing. drach. L. Omnia uino odorato, marinæ aquæ exper- te, excipiātur & læuigētur, ac deniq; in trochiscos frin- gantur.

Antidotus præfagiens nomine: qua ebi- bita, uenenum cum cibo sumptum, prorsus reddetur uomitu. Lemniæ terræ, drach. j. obol. ij. baccarum iu- niprri, drach. ij. læuigentur exactè cum olei dulcis pau- xillo. Propinatur ex mulsa, nucis ponticæ magnitu- do.

Asclepiadis ad eos qui letalia biberunt, re- media. Papaueris lachryma epota, confert mouere uomitum ex hydrelæo calente, uel ex oxycrato calido: aluum q; clysmis subducere. Opio epoto, merū copio- sius, statim bibitum iuuat: aut piper cum uino. Condu- cit etiam lac asininum haustum; atq; clysmi mitiores. Sumpto aconito, iuuat manipulum rutæ, leuigatum ui- no meraciori, ebibere. Si altercū nocuit, lac asininum, uel quoduis aliud, cum mulsa calida opitulatur. Si ui- ride coriadrū, auxiliatur uinum meracum potum, & pinguius gallinarū. Lepore marino assumpto prodest lac asininū bibere: sin minus, uaccinū, aut caprillum. Si toxium potum sit, uinum dulce adiuuat, oleum rosa- ceum, sanguis caprillus, semen q; napi cōtritum ex ul- no. Quibus fungi obsunt, dari debent raphani crudi q̄ plurimi: item uinum meracum, & cineris sarmenta- riū lixiuium: præterea nitrum aceto dilutum, aut fæx ui- ni combusta, trita q; cum aqua: aut absynthium ex ace- to, aut deniq; ruta ex aceto trita, exhibetur. Si ixiā fue- rit ingesta, succurrit absynthium potum cum uino, ca- storeo, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & uomitio- nes ciere. Buprestis assumpto, passi plurimi potus, ac dein uomitus opitulatur: necnō lac calidum bibitum, decoctum q; ficuum in potu datum. Si cātharides hau- stæ sint, conducit passum ex oleo bibere, plurimum q; etiā lactis haurire, & plures nucleos pini esse: aut can- tharidum alas, pedes q; cum melle detritos linctū assu-

Antidotus quæ  
præfagientem  
nominant.

Remedia ab  
Asclepiade scri-  
pta ad eos qui  
letalia biberūt



mere. Psilothro hausto, prodest calentis olei portio, & uomitio excitata: necnon lac caprillum, & maluæ coctæ succus, si cū oleo hauriatur. Spuma argenti pota, auxiliatur piper, apium, myrrha, cum uino laxigata, bibitaq; . Gypso ingesto, dari debet potui, cineris sarmentarij l'xiuium, & thymus ex aquæ tritus. Lacte in grumos coacto, iuuat aceti potio. Item coagulum ex aqua fontana bibitum. Vel sulfuris, silphijq; equalis portio, laxigata ex posca, bibitaq; . Hirudinē deuorata, alij muria, alij niuis, alij aceti potu expellere tentant. Asclepiades spongiam teneram frigida imbutam faucibus demittere iubet, ut hirudo spongie infixa extrahatur. Qui cerusam hauserint, ijs confert, olei calidi potus, uomitusq; : necnon lactis asinini haustus. Quum autem ignoratur species deleteriorum quæ aut comesta, aut bibita sunt, aquam afflatim calidā cum oleo propinare conuenit, ad uomitūq; incitare. Vtile etiam fuerit, & circuncidere somnum: subscriptisq; confectionibus uti. Apollonij pharmacum præseruatuum ueneni. Rutæ folia. xx. nuces iuglandes. ij. salis grumus unus. caricæ duæ. Offerantur simul ieiuno stomacho: noxam quippe à letalibus prohibent. Aliud, Baccarum iuniperi, drach. ij. lemnij sigilli, drach. ij. & obol. ij. trita exceptaq; oleo reponito. Porrigitur ex hydromelite instar auellang nucis. Hac antidoto Nicomedes Rex utebatur: si quando eorum qui inuitassent ipsum, habebat fidem suspectam. Antidotus Mithridatis, Athanasia dicta, ad letalia medicamenta, & cuiuslibet uirulenti ictum. Auxiliatur etiam uentriculo, in quo cibus acescit: necnon sanguinem spuentibus, diuturna tussi infestatis, ac breuiter iecorarijs & lienosis, uesicæq; & uteri affectibus. Piperis albi, grana. xl. costi, meu, asari, acori, dauci Cretici seminis, petroselini, nardi Indicæ, lapidis Nestoritis, sing. drach. iij. croci, myrrhæ, singul.

Antidot° Apol  
lonii a ueneno  
præseruans.

Athanasia Mi  
thridatia.



# ANTIDOTIS, LIB. II. 475

drach. viij. cinnamomi, cassiæ, singul. drach. xñ. mellis Attici cocti, quod sit satis. Datur nucis auellanae magnitudine, ex mulso temperato.

Antidotus Zopyria uocata, ad prædicta omnia, ad aliosq; affectus efficacissima. Opobalsami, drach. iij. nardi, Indice, myrrhæ Troglodyticæ, iunci rotundi floris, cinnamomi, characij, costi recentis, piperis longi, hypocisthidis, polij, piperis pereatici, scordij, meu Cretici, cardamomi, singul. drach. iij. thuris masculi, carpobalsami, dictamni, singul. drach. vj. petroselini, cassiæ rubentis, sing. drach. vij. croci Corycij, drach. viij. mellis Attici quod sit satis. Datur nucis auellanae instar, si febris abest, ex uino: febrientibus, ex hydromelite.

Mithridatis Theriace, qua Rex Mithridates utebatur perpetuo, ut se à letali ueneno assereret. Quum itaq; à Romanis captus esset, nec bis epoto ueneno mori posset, gladio sibi ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum. Pastillorum scillinorum, drach. xlvij. pastillorum theriacorum, piperis nigri, hedychoi magmatis, lachrymæ papaueris nigri, sing. drach. xxiiij. rosarum siccarum, iunci rotundi odorati floris, polij, scordij, seminis napi, iridis Illyricæ, agarici, cinnamomi, dulcis radiculae succi, opobalsami, sing. drach. xij. roris marini, drach. viij. myrrhæ, croci, zingiberis, rheupontici, quinque folij radicis, nepitæ mōtanæ, marrubij, petroselini, stœcados, costi, piperis albi, thuris, sing. drach. j. obol. ij. cassiæ nigrae, drach. iij. piperis nigri, drach. j. longi tantundem. meu, asari, acori, dauci seminis, anserini sanguinis sicci, anatis sanguinis, sing. drach. iij. Excipiantur melle Attico, & cocto.

Theriaca Aelij admodum efficac. Bryoniæ radicis drach. xvj. trifolij seminis, opopapnaxis, sing. drach. viij. aristolochiæ tenuis, drach. xij. roris marini radicis, iris Illyricæ, Zingiberis, opij, singul. drach. viij. rutæ syluestris seminis, drach. xij. cumi-

Antidotus Zopyria.

Mithridatis regis Theriace, qua præmunitus, quum postea ueneno extingui nō posset, sese gladio premit.

Theriace Aelij.



ni Aethiopici, drach. xvj. myrrhæ, casfiæ, castorei, se-  
felis, eryngij radice, serpylli, lachrymæ Cyrenaicæ,  
sing. drach. vj. Medicæ, drach. xij. sagapeni drach. vj.  
croci drach. v. erui farinæ drach. xxiiij. Finguntur pa-  
stilli ex aqua triobolares, danturq; cum uino.

Theriace, Eu-  
clidis.

Theriaca Euclidis, ad internos dolores, aspidū mor-  
sus, pleuritidesq; & quartanam febrem, si post uomi-  
tum, instar auellang nucis sumatur. Castorei drac. vj.  
opopanacis, sagapeni, sefelis, cachreos, chamedryos,  
chamæpityos, marrubij, sing. drach. xvj. styracis, bitu-  
minis Iudaici, myrrhæ, sing. drach. vij. lachrymæ pa-  
paueris, drach. viij. mellis lib. j. Conficito. Alia ad  
febres omnes repetētes per circuitus, Harpalo autho-  
re. Myrrhæ drac. iiij. piperis longi, uel albi, opij, sing.  
drach. ij. castorei obol. iiij. S. cardamomi, drach. iiij. sa-  
gapeni drach. ij. Trita cum aqua in pastillos coguntur,  
qui obolos duos pendeant. Propinentur singuli cum  
cyathis duobus Adriani uini, & aquæ fontanæ coctæ,  
quaternis. Si febris urgeat, cum hydromelite.

Morsui rabidi  
canis potio  
Cratippi.

Candidum Ba-  
phulli.

Potio Cratippi ad morsus rabidi canis. Cancrorum  
ustorum, drach. xx. myrrhæ drach. ij. croci drach. j. S.  
gentianæ drac. j. piperis albi, grana. x. uini quod ad ex-  
cipienda sit satis. Datur drachma. j. cum uini cyathis  
tribus temperati. Album Emplastrum Baphul-  
li, quod rabidorum moribus commodissimè extrinse-  
cus admouetur: daturq; etiam catapotium ex eo nucis  
auellanæ instar, ad dies. xl. Est autem alternis diebus  
amouendum à uulnere, ac rursus, ubi elueris sordes,  
imponendum. Ceræ pōticæ, lib. ij. spumæ argenti, ce-  
rusæ, sing. lib. olei ueteris, sextarium. myrrhæ, medul-  
læ ceruinæ, utriusq; drach. ij. thuris drachma. Argenti  
spuma oleo coquitur, & quum mutata fuerit, cerusa in-  
spergitur, ac cera miscetur. Vbi tam spissum euaserit,  
ut manus non inficiat, ab igne sublato, medullā, myr-  
ram, & thus inijcito. Diophanti medicamentum,



ad scorpionum ictus, & phalangiorum morsus. Aristolochiæ drach. iij. piperis drach. ij. opij drach. j. pyrethri drach. iij. Fingatur pastilli, fabæ Aegyptiæ magnitudine: danturq; duo deglutiendi, & uini meraci cyathi duo.

Aliud ad periculosos scorpionum & phalangiorum ictus. Rutæ syluestris seminis, erucæ seminis, pyrethri, styracis, sulfuris uiui, sing. drach. vj. castorei drach. ij. Excipito testudinis sanguine, ac ternos obolos ex meraco uino exhibeto. Aliud ad eadem optimum, conferens etiam parturientibus ægrè.

Myrrhæ, castorei, styracis, singulæ drachmæ. Opij, drach. ij. chalbani drach. iij. Apij seminis acetabulum: Anisi tantūdem. Piperis grana. xxx. Fingitur ex uino, daturq; drachma una, ex uini hemina. Epithema ad phalangiorum ictus, & omnis serpentis: qđ etiam in potu auxiliatur. Sulfuris uiui, chalbani, utriusq; denarij. iiii. Liquoris libyci, nucum auellandarum purgatarum, sing. drach. ii. uino di. soluta, & melle excepta imponuntur.

Ad uiperarum morsus optimum pharmacum ab Apollodoro compositum. Cumini syluestris seminis, acetabulum. testudinis marinis sanguinis drach. iiii. coaguli hinnuli, uel leporini, drach. iiii. hœdini sanguinis, drach. iiii. Omnia mista, uinoq; optimo excepta, reponito: atq; o liuæ magnitudinem, ex uini optimi cyatho dimidio, dum usus postulabit, porrigito.

Heræ antidotus, qua Marcus Cathegetes est usus. Trifolii bituminosi seminis. aristolochiæ rotundæ, rutæ syluestris, erui insolati, sing. drach. vi. Vino excipiuntur, fiuntq; pastilli drach. iiii. daturq; unus ex uino & oleo. Alia ad letalia, iecinorosos, inflationes uentris, & incipientes aquæ subter cutem suffusiones efficacissima. Myrrhæ drach. v. nardi Syriacæ, drach. v. S. iunci rotundi floris, drach. ii. S. cassiæ drach. iiii. cinnamomi drach. iiii. piperis albi sesquidrach. thuris drachma & obolus. costi drachma. Excipiuntur

Diophantis medicamentū ad scorpionum & phalangiorum ictus.

Parturientibus ægrè, medicamē conueniēs.

Viperarū mor-  
sibus.

Apollodori  
pharmacum.



Attico melle, fingunturq; nucis auellanæ instar: ac dan-  
tur ex mulso uel aqua.



FINIS.



Complura alia ad eisdem affectus, ex diuersis au-  
thoribus congerit Galenus remedia. Nos uerò ex om-  
nibus ea in tuam gratiam, Cādide Lector, elegimus,  
quæ & præstantissima uidebantur, & facilius parari  
possunt. Habes itaq; omnes commentarios Galeni, in  
compendium enchiridionq; redactos, excepto forte  
uno uel altero, ex quibus nihil succi exprimi potuit.  
Nam quod pertinet ad cōmentaria in Hippocratem,  
quicquid in eis continetur cremoris (nisi fatalia decre-  
ta consiliū nostrum hoc intercipient) hoc est uni-  
uersas sententias, instar indicis atq; alpha-  
beti digestas, breui in lucem edemus.

Tuum igitur est, illis bene pre-  
cari, qui in hoc sunt toti, ut  
tuis commodis ser-  
uiāt, recteq; tuis  
studiis con-  
sulant.



## AD ORNATISSI-

MVM VIRVM, D. D. GASPAREM

de la Hoz, Canonicum Secobiensem, Scripto-

rem Apostolicum, ac bonarum literarum

cultorem maximum, Andreæ La-

cunæ, Secobiensis, Militis San-

cti Petri, de ponderibus

et mensuris medici-

nalibus cōmen-

tarius.



ETVS Prouerbum, et  
 querissimū est, mi Gaspar,  
 Vir Ornatisime, optimam  
 esse mensuram in rebus om-  
 nibus: quum nimirum om-  
 nia quæ in uita et sunt et  
 geruntur, ab ea suam abso-  
 lutionem, suam lucē, suumq;  
 ornamentum sortiantur: ni-

hilq; iustum, rectum, aut inculpabile sit, quod mensura  
 (quæ sola uirtus inest omnibus rebus) destituatur. Quā-  
 obrem, si exquisitè expendamus singula, quæ cœlesti il-  
 la machina ambiuntur, quæq; supra cœlos consistunt,  
 omnia certè inueniemus, exactam quandam mensuram,  
 commodationemq; à suo conditore accepisse: quā per-  
 petuò tuentur, dum naturæ leges non transgrediuntur.  
 Quippe uniformes illæ orbium cœlestium lationes, pe-



rennes astrorum cursus, ordinatæ uicissitudines temporum, conspirationes elementorum, generationes deniq; omnium quæ supra terram & subter illam fiunt, non aliunde q̃ à symmetria quadã, quæ in accurata partium mensura consistit, proficiscuntur. Iam uerò, q̃ sanitas quidem corporũ, aliud sit nihil, q̃ debita & absoluta mēsuræ eorum ex quibus conflantur: morbus aut, ab hac symmetria recessus quidam & lapsus, quis ambigit? Nemini etiam est dubium, decreta & leges Reip. mensuras quasdam existere, quæ singulis suum ius dispensant. Vt autem ipsius mensuræ summam efficaciam & uim, exemplo familiarissimo exponam, poemata optimis documentis & sententijs exculta, si metro claudicent, hoc est, mensura non constent, confestim stomachum mouēt, nauseamq; & fastidium gignunt. Contra uerò, quæ symmetra existunt, etiam si pudicitiam offendant, moresq; iuuentutis corrumpant, magnificè ab omnibus celebrantur: tantum authoritatis uendicare sibi uidetur emmetron. Cæterum quum in alijs omnibus humanis actionibus, si rectè perfici debeant, mensura quædam exquisita desideretur, tum uel maximè in arte Medica ea ipsa requiritur: ut in qua, uel minima à pondere ac mēsuræ aberratio, soleat semper ægris perniciosa & piacularis existere. Nam quum generatio nostra, incolumitasq;, miscellæ quatuor elementorũ debeatur, certa quadam mensura confluentium & conspirantium in unam eandemq; temperiem: sanè si quando rhythmus huius soluatur, necessum est ad recuperandum habitum pristinum, reducamur eo, iusta etiã, exploratissimaq; mensura eius, quod  
lapsus



lapsus corrigere possit, administrata. Qua neglecta, si quis-  
 piam admoliat, praesidia corpori, morbi seminarium augebit,  
 aut affectum alium maligniorem inducet: ita ut non minus ca-  
 uendum à tali medico sit, quàm à morbo ipso. Quum igitur inter alia  
 Galeni opera, redegissem nuper in succinctam Periochen com-  
 mentarios illos de compositione medicamentorum κατὰ γένει  
 καὶ κατὰ τόπον, ditissimos naturæ humanæ thesauros: per-  
 suasum quæ haberem, neutiquam ex eorum lectione percepturos ali-  
 quid frugis, qui in ratione ponderum & mensurarum non es-  
 sent admodum exercitati: sed potius occasionem capturos, qua  
 sibi ignominiae notam: aegris conciliarent summam internicio-  
 nem: precium operæ me facturum existimaui, si quæ ueteribus,  
 ac præcipue Galeno, circa pondera & mensuras medicinales  
 conscripta sunt, aggerans, ea omnia paucis exposita, sub præsa-  
 tione nominis tui, in publicam studiosorum commoditatē æde-  
 rem: ut uel ex hoc argumento, amicitia nostra, & nunquam peritu-  
 ra necessitudo, omnibus innotesceret: tibi autem, si quis hinc fru-  
 ctus ab aliquo hauriendus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec  
 uerò collectanea hæc de mensuris cuiquam aptius quam tibi nuncupari  
 potuissent, qui (ut ceteras ingenuissimas tui animi dotes impræ-  
 sentiarum sub ticeam) diu noctuque astronomicis studiis indulgens,  
 in eisque felices tuas horulas, haud oscitante collocans, non modo  
 plagas has inferiores, sed cælos etiam ipsos metiris, mentemque su-  
 pra illos eueheris: contra quam faciunt plerique alij, qui ubi semel  
 quæ pertinent ad cutem curandam sunt nacti, adeo ingenuarum  
 artium, bonorumque omnium institutorum infelices obliuiscun-  
 tur, ut ne inesse quidem sibi animam recordentur: ac pinde obruti,  
 demersi que cœno suarum cupiditatum, corporisque mole depressi,  
 eam, quocumque tandem irruat, sequantur: tantum abest ut (exem-



pro tui) cœlum unq̃ suspectent, aut in meditatione rerū pulcher-  
rimarum asininas suas cogitationes exerceant. Hi tamen manci-  
pia umbilici sunt: à quorum ingenio tam abes ipse, q̃ qui longis-  
simè. Quippe ita utris fortunæ bonis, quæ tuo Marte acquisi-  
ta, tibi q̃ largissimè suppetunt, ut eorū quidem quæ ex usu sunt,  
nihil desit corpusculo, amicisq; omnia communia fiant: animus  
autem ipse, minimè ab eis præpediatur, sed ad altiora aspirans,  
excolatur atq; locupletetur alijs ornamentis & opibus, quæ  
tanto illis splendidiore & augustiores sunt, quanto mens no-  
stra corpori dignitate antecellit. Quo sanè tam admirabili amo-  
re sapientiæ accensus, & si fluctibus negotiorum nunquam non  
obruaris, quæ maxima cum dexteritate administras: semper ta-  
men philosophiæ studijs incumbis, in eisq; tam foeliciter pro-  
moues, ut Diuinum istud ingenium tuum sæpenumero admira-  
ri compellar. Ne autem huic nostro commentariolo contingat,  
quod patriæ utriusq; nostrum communi Secobiæ accidit, cuius  
quidē suburbia sunt ciuitate ipsa ampliora, non agam hic tecum  
pluribus: quum tēpestiuum iam sit, ut promissis satisfaciamus.

**E**orum quæ metiri homines solent, quædam solida, cor-  
pulenta, graua & sibi cōtinua sunt, ut lapis, cera, lignū, &  
ferrū: quædam solida quidē & sicca, sed dissoluta & mi-  
nutula, qualia accumulare consueuimus: ut hordeū, oriza, &  
triticum: quædam dæmum in liquidis fluidisq; consistunt: è  
quorum numero est oleum, uinum, & mel. Quæ igitur sub  
prima differentia cōprehenduntur, grauitate dijudicantur:  
cui negotio statera est inuenta. Quæ uerò humidā consisten-  
tiam possident, uasculi cauitate expendunt. At ea quæ quum  
sint arida, aggerari in cumulū possunt, medio genere ambi-  
gunt: modò quippe ipsa librare: modò uasculis mensurare  
consueuimus: quemadmodum liquores fluentes. Quanq̃ hi  
quoq; sæpenumero reuocantur ad staterā. Liquida qppe om-



nia quę corp̃i administrantur, uniuersi serè iam ponderant, si Hispanos pharmacopolas excipias. Hi nanq̃; non ponderē, quęadmodū in Italia, Gallia, Germania, & Anglia mos est, sed uasculi cavitare liquida medicamenta metiuntur: id quod eodem probare ullo modo non possum. Nā quum ex liquoribus, hi quidē grauiore sint: illi autem leuiore, atq̃ tenuiū partium: certē necessum est, dum eos omnes ex quo pari uasculi cavitare dispensant, grauisimē interdum hallucinentur, capitaliq̃; errore labātur. Nemini siquidem in ambiguo est, quę crassarum sunt partium, ea contracta & exigua mole plurimum continere substantiæ: ut pauxillum sub tumore laxiori, quę raram consistentiam sortiūtur. Etenim si accipias unam heminam olei: uini aliā: ac tertiam deniq̃ mellis: cōperies planē, oleum quidem ipsum, uncias. ix. pendere: uinum autem. x. Mel tredecim cum dimidia: ita ut hoc ad uinum sit sesquiplum. Quod uerò aiunt, se non una eademq̃; mensura, oleū, mel, atq̃ uinum metiri: sed eorum liquorum singulis habere suā destinatam: id illos non reddit à culpa immunes. Nā quum in generibus singulis non paruum discrimen sit penes grauitatem & leuitatem (omphacinum enim oleum, exempli gratia, quod oliuæ immaturæ fuderūt, hyoscyaminum uē, tenuitate partiū & leuitate, multis numeris ab irino relinquitur) contingit sanē, ut dum cuiusq̃; indiuidui unciam unā sese administrare arbitrātur, alterius quidem plus: alterius autem longē minus exhibeant: ac sic artis præcepta euertant. Deberent itaq̃; aut liquores uniuersos librare: aut singulis eorum speciebus, mensuram peculiarem præscribere: quam quidem inuestigare, esset nimis operosi negotij.

Porrò mensura olei erat Galeni tēpore apud Romanos cornea, pellucidaq̃; & lineis quibusdam orbicularibus, quibus uncia discernentur, incisa. Sunt autē innumera ponderum ac mensurarum genera, secundū uarietates regionum ac morū. Quamobrē ea describemus impræsentiarū duntaxat, quę urbi Romæ, antiquissimæ totius orbis Metropoli,

HHhh ij



semp fuerunt familiarissima: quū præsertim Galenus uniuersas ferè pharmacorū cōpositiones, ad mēsuras Romanorū, ponderaq; reduxerit: cū qbus, ubi exposita fuerint, facillimū cuiq; erit, q̄ apud alias ciuitates in usu habent, cōferre.

De ponderibus.

**N**omina pōderum medicinaliū, in quē medici passim incidunt, sunt, mina, libra, vncia, drachma, Scriptulus, obolus, siliqua, & granū. Romana igitur mina continet libras. xx. Nam Aegyptia, & Attica. xvj. tantū constant. Libram autē xij. vnciæ constituunt, quarū singule ex drachmis octo constant. Porro drachmam Galenus idē esse uult cum Romano denario: q̄uis contendat aliqui, eam esse partem septimam vnciæ. Constat autē drachma scriptulis tribus, quę à Græcis γράμματα, scrupuli à neotericis, corrupta uoce, appellātur. Quorū quisq; duos obolos continet: ut horum singuli, siliquas tres, quę & ceratia dicūtur. At uerò unaquęq; siliqua, grana quaternapendet. Reperiuntur etiā creberri-  
mē inter nomenclaturas ponderū, faba Græca & Aegyptia: ac præterea nux iuglans, & Pontica. E quibus Græca quidē faba, duos obolos pēdit: Aegyptia autem drach. j. S. At iuglans nux, siliquas. lxxij. ut Pontica. xviij. Quæ omnia ordine resolutorio explicata, facile ex hac tabella discernes.

Mina Aegyptia.	vnc. xvj.
Mina Romana.	vnc. xx.
Libra Romana.	vnc. xij.
Vncia.	drach. viij.
Drachma, siue denarius, siue olca.	script. iij.
Scriptulus, siue scrupulus.	obolos. ij.
Obolus	siliquas. iij.
Siliqua	grana. iij.
Faba Græca,	obol. ij.
Faba Aegyptia	drach. j. S.
Nux iuglans.	siliquas. lxxij.
Nux Pontica.	siliquas. xviij.



Si igitur ubiq; locorum & gentium, libræ, uncia, & drachmæ, essent inter se eadē,liceret profecto nobis,iuxta Galeni dogmata, in quauis orbis plaga & regione, medicamenta citra discrimen præscribere. Quum autē euariant passim ea pondera, certē nisi quis omnia illa ad tabellā præscriptam reuocet, singulaq; ad usus suos expēdat, priusq; alicui, pharmacum catharticum porrigat, fieri ullo modo non potest, qn ab scopo aberret, uidelicet aut plus q̄ sit ex usu, propinans: aut minus q̄ morbus postulet. Equidem experiētia didici Hispanicam unciam Romana esse obolis duobus maiorem. Parisiensem, ferē integra drachma. Colonienſis, Bruxellensis, atq; Antuerpiensis uncia, sunt similes: quarū singulæ Romanam tribus obolis superant. Ab hac, uncia Veneta (quā experiundi gratia, nuper in officina quadā libraui) propemodū sesquidrachma relinquitur. Siquidem Veneta libra medicinalis Romanæ libræ uncias. x. cum dimidia, plus minus, pendet. Pro ratione itaq; harum differentiarum possem ipse iam in singulis horum locorum, numerum drachmarū intrepidē & augere, & detrahē: id quod mihi non perinde liceret absq; summa egrotantium clade, si proportionem ponderum quam habent inter se mutuo, accuratē prius non explorassem. Quam quum haberem per spectam, cuidam adolescenti, quem in ædibus Illustrissimi D.D. Ioannis à Mendoza, Cæsariei apud Venetos Oratoris Splendidiss. suscepi curandum, unciam unam soluentis pharmaci exhibui: cuius in urbe Roma propinare drachm. vii. ausus non fuisset.

De notis ponderum quibus Medici in officinis utuntur.

**V**T autem Græcorum characteres, quibus pondera exprimunt, in præsentiarū prætereant, ceu nihil ad nos pertinentes: Medici recentiores pro uncia, hanc notam.  $\text{℥}$ . usurpant: quemadmodū hanc,  $\text{℥}$ . pro drachma: similiterq; illam.  $\text{℥}$ . pro scriptulo: subdentes postea numerū quem expedire arbitrantur. Vt si ori uentriculi confirmando huiusmodi unguen instituerimus.  $\text{℞}$  olei absinthij, & cydonio.



rum, anā 3.ij. Nardini, vnc. S. ceræ elotæ, drach. v. pulu. corallij, & mentæ, anā 3.ij. perinde sonāt ac si scribamus. Olei absinthij & cydoniorum, singulorū vnc. ij. Nardini unciā dimidiam. ceræ elotæ drach. v. pulueris corallij & mentæ, singulorum scriptulum unū &c. Quippe uox (anā) quæ aliquando etiam in Galeni cōmentarijs occurrit, cuiusq; ptes equas significat. Præstaret autem medicamenta ipsa, quæ in se humani generis uitam, necemq; gerunt, minimè quidem notis aut numeris, sed literis extensis exprimere. Quñquidem iota unum sublatum aut additū, imò uerò ēt apiculus unus, sæpe ægros ipsos in exitium atq; internicionem adegit. Porro ut flores solent dispensari pugillis, sic manipulis herbæ. Cōmuniter autem uolunt esse pugillum, q̄tum tribus digitis apprehēdi possit: manipulum uerò, q̄tum tota manu. Ac pugillum quidem, hac nota P. manipulum autem, hac. M. nostri Medici exprimunt.

Græcæ liquidorum mensuræ (quæ maximè sunt in usu etiam apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex cōmentarijs Iacobi Syluij, Medici hac nostra ætate Clarissimi, excerptæ.

**CADVS**, siue Ceraunium, capit choas, hoc est Romanos congios. xij. uel libras mensurales. cvij.

**CHOA**, siue Congius, sextarios sex capit, seu Atticas cotylas. xij. seu libras. ix.

**SEXTARIVS** cotylas. ij. seu libram unā & dimidiam, seu cyathos. xij. continet.

**COTYLA**, quam nonnulli heminam appellant, quartarios ij. seu uncias mensurales. ix.

**SEMICOTYLA** recipit acetabula. ij. uel uncias. iij. cum dimidia, existens quarta sextarij pars.

**ACETABVLVM** (Græci ὀξύβαλον uocant) sesquicyathum, seu uncias. ij. & drach. ij. pendet.

**CYATHVS** conchas. ij. seu mystra. iij. seu chemas. v. seu cochlearia. x. seu fescunciam.

**CONCHA** mystra. ij. seu chemas. ij. cū dimidia, seu drac. vj.



# ET MENSVRIS.

487

**MYSTRVM** chemē unam, & quartam eius partem, seu cochlearia.ij. cum dimidio, seu drach.iiij.

**CHEME** cochlearia.ij. seu drach.ij. script. j. & grana.iiij. & quatuor quintas grani.

**COCHLEARIVM**, drachmam. j. scriptulū dimidium, grana.ij. & duas quintas grani.

Porro uinum nona parte pōdus olei excedit. Mellis autem ad uinum proportio est sesquipla: hoc est tertia parte mel ipso uino est grauius, ut liquet ex tabella subdita.

Ceraunium Ita- licum habet }	Olei lib. xc.	Vini lib. c.	Mellis lib. cl.
Congius	lib. viij. & semissem.	lib. viij. unc. iiij.	lib. xij. & semissem.
Sextarius,	unc. xv.	unc. xvj. drach. v. script. j.	lib. ij. vn- cia. j.
Cotyla	unc. viij. drach. iiij.	unc. viij. drach. ij. script. ij.	libra. j. drach. iiij.
Oxybaphum	selescunciam drach. iiij.	uncias. ij. script. ij.	unc. ij. drach. j.
Cyathus	drach. x.	uncia. j. drach. iiij. siliquas. iiij.	unc. ij. script. ij.

Mensuræ aridorum quibus Medici maximè utuntur.

**MEDIMNVS** capit choenicas. xlvij.

**CHOENIX** cotylas. iiij. uel sesquiseptarium, seu libras. ij. & quadrantem. j. & unc. iiij.

**SEXTARIVS** cotylas. ij. seu unc. xiiij.

**COTYLE** oxybapha. iiij. seu unc. ix.

**OXYBAPHVM**, sexquicyathum, seu unc. ij. & drach. ij.

**CYATHVS** cochlearia. x. seu selescunciam.



COCHLEARIVM drach. j. script. S. grana. ij. & duas quintas grani.

Crebro autē usurpat Galenus hanc uocem Bessēm: quæ quotiescunq; occurrerit, pro vncijs octo accipiat.

*Hæc sunt itaq; Vir Ornatisime, quæ sub tuo nomine uolui ut omnibus fierent communia studiosis: quare pro tua feceris dignitate, si ea contra uiligatorum morsus defenderis. Vale foeliciter, plurimumq; saluta meo nomine communes utriq; nostrum amicos, atq; integerrimos Viros, D. Berrocalem, Scriptorem Apostolicum: necnon. D. Falconeum à Gueuara, Iuris prudentiæ licentiatum absolutissimum.*

*Venetijs. iij. Idus Aprilis. M. D. XLVIII.*

## SERIES CHARACTERVM.

Aaaa Bbbb Cccc Dddd Eeee Ffff Gggg  
Hhhh Iiii Kkkk Llll Mmmm Nnnn Oooo  
Pppp Qqqq Rrrr Ssss Tttt Vuuu Xxxx  
Yyyy Zzzz.

AAaa BBbb CCcc DDdd EEee FFff  
GGgg HHhh.


Omnes sunt quaterni, præter HHhh, qui est duernus.

V E N E T I I S


*Apud Hieronymum Scotum.*

I S 4 8











11